1 – INTRODUCTION À LA CHIMIE ORGANIQUE ET À LA BIOCHIMIE

Plan du chapitre

1 Introduction	2
1.1 Qu'est-ce que la chimie organique?	2
1.2 Origine des molécules organiques	2
1.3 Pourquoi faire de la chimie organique?	2
2 Présentation des molécules organiques	3
2.1 Valence des atomes et multiplicité des liaisons	3
2.2 Hydrocarbures et squelette carboné des molécules organiques	3
2.3 Groupes fonctionnels	6
3 Principales familles de molécules en biochimie	10
3.1 Glucides : oses et osides	10
3.2 Acides aminés, peptides et protéines	12
3.3 Lipides	13
3.4 Nucléosides, nucléotides et acides nucléiques	15
4 Annexes	18
4.1 Les acides α -aminés courants	18
4.2 Les nucléosides courants	19
Exercices	20
Travaux dirigés	23

Programme officiel – Premier semestre – **Thème C – constitution et transformations de la matière**

C.1.3 Constitution et caractérisation spectroscopique d'entités chimiques organiques et intervenant dans la chimie du vivant.

NOTIONS	CAPACITÉS EXIGIBLES
<p>Familles d'entités chimiques organiques</p> <p>Familles fonctionnelles en chimie organique : amine, amide, cétone, aldéhyde, alcool, thiol, ester, acide carboxylique, hémiacétal et acétal, anhydride phosphorique.</p> <p>Familles d'entités chimiques intervenant dans la chimie du vivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sucres (ou oses) et autres glucides ; • acides gras, triglycérides, phosphoglycérides et autres lipides ; • acides aminés, peptides et protéines ; • nucléosides, nucléotides, acides nucléiques. 	<p>Reconnaitre et nommer les familles fonctionnelles présentes dans la représentation d'une entité chimique.</p> <p>Reconnaitre et nommer la famille à laquelle appartient une entité chimique intervenant dans la chimie du vivant.</p>

Protégé par la licence Creative Commons

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr>

1 Introduction

1.1 Qu'est-ce que la chimie organique ?

- Chimie organique : chimie des composés hydrocarbonés, c'est-à-dire comportant du carbone et de l'hydrogène lié au carbone.
- Composés carbonés non organiques : CO_2 , CO , CS_2 , les ions carbonate CO_3^{2-} et hydrogencarbonate HCO_3^- , l'ion cyanure CN^- .
- Éléments impliqués : toujours C et H, extrêmement souvent O et N, souvent S et P, parfois des halogènes (Cl, Br, I), occasionnellement des métaux : Na, Mg, Hg, Zn, Cd, Pb ou des éléments non métalliques : B, Si.

1.2 Origine des molécules organiques

- Molécules organiques naturelles (synthétisées par au moins un organisme vivant) ou artificielles (inconnues dans le monde vivant).
- Molécules biosourcées (extraites de plantes, d'animaux ou de micro-organismes) ou de synthèse.

strychnine

paracétamol

1.3 Pourquoi faire de la chimie organique ?

- Identifier et comprendre les réactions ayant lieu dans le monde vivant.
- Synthétiser des molécules naturelles ou artificielles ayant une utilité thérapeutique (médicaments, tissus artificiels) ou technologique (textiles, matières plastiques, matériaux émetteurs de lumière ou conducteur de l'électricité, etc).

2 Présentation des molécules organiques

2.1 Valence des atomes et multiplicité des liaisons

- La valence d'un élément est le nombre de liaisons que cet élément engage avec ses voisins. Certains éléments peuvent avoir plusieurs valences possibles : P (3 ou 5), S (2, 4 ou 6).
- Un atome peut porter un (ou plusieurs) doublet(s) d'électrons non engagé(s) dans une liaison, appelé(s) doublet(s) non liant.
- Les liaisons peuvent être simples, doubles ou triples.

C tétravalent	H monovalent	O et S divalents	N et P trivalents	halogènes monovalents
$\begin{array}{c} \\ -\text{C}- \\ \\ =\text{C} \\ / \backslash \\ \equiv\text{C}- \end{array}$	$-\text{H}$	$-\ddot{\text{O}}-$ $\ddot{\text{O}}=$	$\begin{array}{c} \\ -\text{N} \\ \\ =\ddot{\text{N}}- \\ \\ \equiv\text{N} \end{array}$	$-\ddot{\text{Cl}} $

2.2 Hydrocarbures et squelette carboné des molécules organiques

- Les hydrocarbures sont composés exclusivement de carbone et d'hydrogène.
- Les hydrocarbures saturés ne comportent que des liaisons simples (alcane), les hydrocarbures insaturés comportent des liaisons multiples (double liaison C = C ou triple liaison C ≡ C).
- Les hydrocarbures peuvent être acycliques ou cycliques

2.2.1 Représentation des alcanes acycliques

Les alcanes acycliques ont pour formule générale $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$, avec n un entier.

- Représentation développée : on indique toutes les liaisons.
- Représentation semi-développée : on « compacte » la représentation en regroupant des atomes.

Représentation semi-développée

Représentation topologique (encore plus compacte) :

- l'enchaînement des liaisons entre atomes de carbone est représenté par une ligne brisée ; chaque segment représente une liaison, dont on précise la multiplicité (simple, double ou triple) ;
- chaque sommet de la ligne représente un atome de carbone ;
- les atomes d'hydrogène liés aux atomes de carbone sont omis, ainsi que les liaisons correspondantes ;
- les groupes fonctionnels, s'il y en a, sont explicitement représentés.

2.2.3 Nomenclature des alcanes acycliques

- Trouver la chaîne carbonée la plus longue et le nom de l'hydrocarbure correspondant.
- Identifier les ramifications liées à cet hydrocarbure et donner un nom à chacun d'eux ; placer ces noms dans l'ordre alphabétique, avant le nom de l'hydrocarbure.
- Numéroté les atomes de carbone de la chaîne principale en partant du bout de la chaîne le plus proche d'un substituant ; préciser la position de chaque substituant en le faisant précéder du numéro du carbone de la chaîne principale auquel il est rattaché et d'un tiret.
- Quand il y a plusieurs substituants identiques, on les nomme ensemble, en faisant précéder le nom du substituant par les préfixes *di*, *tri*, *tétra*, etc ; on précise ensemble les numéros de chaque substituant, en les séparant par une virgule.
- Si les substituants sont eux-mêmes ramifiés, ils sont numérotés à partir du carbone lié à la chaîne principale, et sont nommés selon les mêmes règles que le squelette carboné.

n	formule de l'alcane	nom de l'alcane	formule du substituant	nom du substituant
1	CH ₄	méthane	CH ₃	méthyle
2	C ₂ H ₆	éthane	C ₂ H ₅	éthyle
3	C ₃ H ₈	propane	C ₃ H ₇	propyle
4	C ₄ H ₁₀	butane	C ₄ H ₉	butyle
5	C ₅ H ₁₂	pentane	C ₅ H ₁₁	pentyle
6	C ₆ H ₁₄	hexane	C ₆ H ₁₃	hexyle
7	C ₇ H ₁₆	heptane	C ₇ H ₁₅	heptyle
8	C ₈ H ₁₈	octane	C ₈ H ₁₇	octyle

Nomenclature

Application 2 : nommer les composés A et D apparaissant dans l'application 1

2.2.4 Hydrocarbures cycliques saturés ou alcanes cycliques

- Une molécule est cyclique si son squelette est refermé sur lui-même.
- Les alcanes cycliques (cyclanes) ont pour formule C_{*n*}H_{2*n*}, avec *n* un entier.

cyclopropane

cyclobutane

cyclopentane

cyclohexane

méthylcyclohexane

2.2.5 Hydrocarbures insaturés

- Les hydrocarbures avec une double liaison $C = C$ sont les alcènes (oléfines) de formule : C_nH_{2n} avec n un entier (s'ils sont acycliques).
- La double liaison $C = C$ est indiquée par la désinence -ène en nomenclature.

Nomenclature des alcènes

Application 3 : nommer les composés B, C, E et F apparaissant dans l'application 1

- Les hydrocarbures avec une triple liaison $C \equiv C$ sont les alcynes de formule : C_nH_{2n-2} avec n entier (s'ils sont acycliques).
- La triple liaison $C \equiv C$ est indiquée par la désinence -yne en nomenclature.

2.3 Groupes fonctionnels

2.3.1 Définition

- La substitution d'un atome d'hydrogène par un groupe d'atomes comportant des hétéroatomes introduit un groupe fonctionnel (= une fonction chimique).
- En écriture topologique, on précise intégralement les atomes des groupes fonctionnels.
- La formule brute d'une molécule indique le nombre de C, puis de H, puis de tous les autres éléments dans l'ordre alphabétique.

Groupes fonctionnels et formule brute de la sérine

Application 4 : écrire en notation topologique

proline

threose

glucopyranose

uracile

Déterminer la formule brute

G

H

J

tryptophane

2.3.2 Groupes fonctionnels usuels

La **valence** d'une fonction chimique est nombre d'atomes d'hydrogène qu'elle remplace dans l'alcane correspondant.

Dans le tableau suivant, R désigne un groupe commençant par un carbone, et X désigne un halogène (chlore Cl, brome Br ou iode I).

fonctions monovalentes				
	alcool	thiol	étheroxyde	thioéther
	amine primaire	amine secondaire	amine tertiaire	phosphate

	halogénoalcane	organomagnésien	alcène	
fonctions divalentes				
	aldéhyde	cétone R = alkyle	hémiacétal R = alkyle	acétal R = alkyle
	imine	alcyne		
fonctions trivalentes				
	acide carboxylique	ester	amide	nitrile
fonctions tétravalentes				
	carbonate	urée		

Application 5 : identifier les groupes fonctionnels

Faire l'identification pour les composés **G**, **H** et **J**, ainsi que pour la proline, le thréose et le glucopyranose.

2.3.3 Nomenclature

- Les règles de nomenclature des hydrocarbures s'appliquent.
- On remplace la désinence *-ane* dans l'alcane de même squelette par celle du groupe fonctionnel.
- S'il y a plusieurs groupes fonctionnels différents, celui correspondant à la fonction de plus grande valence donne son nom à la molécule ; les autres sont traités comme des substituants.

fonction	nom en tant que fonction principale	nom en tant que substituant
halogénoalcane	halogénoalcane	halogéno-
alcool	alcanol	hydroxy-
étheroxyde	alcoxyalcane	-alcoxy-
amine	alcanamine	amino-
alcène	alcène	-èn-
aldéhyde	alcanal	-oxo-
cétone	alcanone	-oxo-

fonction	nom en tant que fonction principale	nom en tant que substituant
alcyne	alcyne	-yn-
acide carboxylique	acide alcanoïque	
ester	alcanoate d'alkyle	

- Si nécessaire, on précise le numéro du carbone qui porte le groupe fonctionnel avant la désinence correspondante.
- On numérote les atomes de carbone de la chaîne de sorte à attribuer le plus petit numéro possible à la fonction principale.

Nomenclature

Application 6 : nommer les composés

2.3.4 Hétérocycles

Les hétérocycles sont des cycles dont l'un des atomes n'est pas un carbone. L'hétéroatome est le plus souvent O ou N, mais peut aussi être P ou S.

furane

tetrahydrofurane

pyridine

pyrrole

pyrrolidine

3 Principales familles de molécules en biochimie

On trouve un très grand nombre de molécules dans les organismes vivants qu'on peut classer en 5 catégories :

- les glucides servent de réserve d'énergie (sucre, amidon) mais ont aussi un rôle dans la structure des organismes (cellulose) ;
- les protéines catalysent les réactions du métabolisme mais ont de nombreux autres rôles (transport, structure, etc) ;
- les lipides forment les membranes des cellules, mais servent aussi de transmetteurs chimiques d'information et constituent un mode de stockage d'énergie ;
- les acides nucléiques servent au stockage de l'information génétique ;
- et le reste (vitamines, coenzymes, pigments, etc).

3.1 Glucides : oses et osides

3.1.1 Les oses

Les oses sont des molécules :

- ayant une chaîne carbonée d'au moins 3 atomes de carbone qui porte un groupe carbonyle (= une fonction aldéhyde ou cétone) et au moins 2 groupes hydroxyle (OH),
- et les molécules qui dérivent des précédentes par oxydation de l'aldéhyde (en acide carboxylique) ou par réduction du groupe carbonyle en alcool.

Dans la nature, il existe de nombreux oses caractérisés par la nature de la fonction carbonyle et la longueur de la chaîne carbonée.

- Les aldoses (fonction aldéhyde) et les cétooses (fonction cétone).
- Les trioses (3 carbones), les tétooses (4 carbones), les pentoses (5 carbones), les hexoses (6 carbones), les heptoses (7 carbones) etc.

Dihydroxyacétone et glucose

Application 7 : préciser le type d'ose

3.1.2 Pyranoses et furanoses

- Dans l'eau, les pentoses et les hexoses existent quasi-exclusivement sous forme cyclique, par réaction spontanée entre leur groupe carbonyle et un de leurs groupes hydroxyle pour former un groupe hémiacétal.
- Les **furanoses** ont un cycle à 5 dont un oxygène, les **pyranoses** ont un cycle à 6 dont un oxygène.
- Dans les aldoses, la fonction hémiacétal est sur le carbone n°1 ; dans les cétooses, elle est sur le carbone n°2.

Formation du β -D-fructofuranose à partir du D-fructose

Pour voir la forme du β -D-fructofuranose : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Fructose#/media/Fichier:%CE%92-D-Fructofuranose.gif>

Formation du β -D-glucopyranose à partir du D-glucose

Pour voir la forme du β -D-glucopyranose : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Glucose#/media/Fichier:Beta-D-glucose-3D-vdW.png>

Application 8 : identifier les atomes qui se lient et numéroter les atomes de carbone dans le D-ribose cyclisé

De quel type de cycle s'agit-il ? Le nommer dans le cas du ribose.

3.1.3 Osides

- La fonction hémiacétal d'un ose cyclisé peut réagir avec un groupe hydroxyle OH d'un autre ose pour former une fonction acétal (« liaison osidique »).
- L'association de deux oses donne un dioside (= diholoside = dissaccharide).
- La nomenclature indique le numéro des atomes de carbone au niveau desquels la réaction a lieu.

Formation du saccharose

Pour voir la forme du saccharose : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Saccharose#/media/Fichier:Sucrose-3D-balls.png>

Application 9 : préciser la nomenclature du lactose, association d'un β -D-galactopyranose et d'un α -D-glucopyranose

Ne pas se préoccuper de l'arrangement spatial au niveau de la liaison osidique.

Les polyholosides sont des chaînes d'un grand nombre (10^2 à 10^5) d'oses : amylose et amylopectine (constituant de l'amidon), cellulose, etc.

3.2 Acides aminés, peptides et protéines

3.2.1 Les acides aminés

Les acides α -aminés sont des molécules portant sur le même atome de carbone :

- un groupe fonctionnel acide carboxylique,
- un groupe fonctionnel amine,
- un groupe carboné R variable.

Dans le vivant, il existe 22 acides aminés (dont 2 très rares), soit 22 groupes R possibles. La nature de R conditionne les propriétés de l'acide aminé (hydrophile ou hydrophobe, neutre ou chargé, acide ou basique). La liste complète est en annexe 4.1.

Quelques acides α -aminés

Application 10 : identifier le groupe R dans les acides aminés

3.2.2 Peptides et protéines

- Le groupe acide carboxylique d'un acide aminé peut réagir avec le groupe amine d'un autre acide aminé pour former une fonction amide (« liaison peptidique »).
- Les molécules formées sont des peptides : dipeptides, tripeptides, polypeptides (jusqu'à quelques centaines d'acides aminés).
- Les protéines sont des assemblages de polypeptides et de structures moléculaires variées (métaux, hème...).

Association de deux acides aminés

Application 11 : identifier les deux groupes R dans l'aspartame, un dipeptide

Dans ce dipeptide, le groupe acide terminal est sous forme d'un ester $\text{C}(=\text{O})\text{OCH}_3$.

3.3 Lipides

Les lipides constituent un groupe hétérogène de molécules ayant en commun d'avoir une longue chaîne hydrocarbonée les rendant très insolubles dans l'eau. On les classe généralement en 8 groupes, dont :

- les acides gras saturés ou insaturés,
- les glycérides et phosphoglycérides,
- les stérols,
- les pré-nols,
- liste non limitative.

Acides gras

Exemple d'acide gras saturé : acide myristique $\text{H}_3\text{C}(\text{CH}_2)_{12}\text{CO}_2\text{H}$.

Pour voir sa forme : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_gras#/media/Fichier:Myristic-acid-3D-vdW.png

Exemple d'acide gras insaturé : acide oléique $\text{H}_3\text{C}(\text{CH}_2)_7\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{CO}_2\text{H}$.

Pour voir sa forme : https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_gras#/media/Fichier:Oleic-acid-3D-vdW.png

Les triglycérides sont obtenus par estérification du glycérol par un, deux ou trois acides gras (monoglycérides, diglycérides, triglycérides), ou du glycérol-3-phosphate.

glycérol

glycérol-3-phosphate

Glycérides et phosphoglycérides

triglycéride
(tripalmitylglycérol)

phosphoglycéride
(un plasmalogène)

Les stérols sont des dérivés du stérane.

Le cholestérol est un stérol

Les prényls sont des alcools à longues chaînes d'unités isoprène (2-méthylbut-1,3-diène).

Le phytol est un prényl en C₂₀

3.4 Nucléosides, nucléotides et acides nucléiques

3.4.1 Nucléosides

Les nucléosides sont constitués de l'association du ribofuranose ou du désoxyribofuranose avec une base nucléique (= base azotée). Les bases nucléiques sont des molécules dérivées de la purine ou de la pyrimidine ; il y en a 5 principales (liste en annexe 4.2), et une dizaine avec des bases plus rares.

Les nucléosides ont un nom spécifique (on rajoute le préfixe désoxy si le sucre est le désoxyribose) :

- adénosine et guanosine,
- thymidine, cytidine et uridine.

L'adénosine (un ribonucléoside) et la désoxyadénosine (un désoxyribonucléoside)

Application 12 : identifier le sucre et la base nucléique puis donner le nom

3.4.2 Nucléotides

Un nucléotide est un nucléoside lié à un groupe phosphate, diphosphate ou triphosphate. Dans l'eau, chaque groupe phosphate porte une charge négative et une supplémentaire pour celui à l'extrémité de la chaîne.

L'énergie nécessaire aux réactions du métabolisme est fournie par l'hydrolyse de l'adénosine triphosphate (ATP) en adénosine diphosphate (ADP).

Interconversion d'ADP en ATP

3.4.3 Acides nucléiques

Les acides nucléiques sont issus de l'association d'un très nombre de nucléotides monophosphate.

- L'ARN (acide ribonucléique) est constitué d'un enchainement de ribonucléotides monophosphate, chacun portant une base nucléique parmi A, G, C et U.
- L'ADN (acide désoxyribonucléique) est assemblage de deux brins, constitué chacun d'un enchainement de déoxyribonucléotides monophosphate, chacun portant une base nucléique parmi A, G, C et T. Les deux brins sont associés l'un à l'autre selon une forme en double hélice.
- L'enchainement des bases azotées est le support de l'information génétique.

Structure d'un brin d'ARN et d'un brin d'ADN

Pour visualiser la double hélice de l'ADN :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_d%C3%A9soxyribonucl%C3%A9ique#/media/Fichier:DNA_structure_and_bases_FR.svg
et : https://en.wikipedia.org/wiki/DNA#/media/File:DNA_Structure+Key+Labelled.pn_NoBB.png

4 Annexes

4.1 Les acides α -aminés courants

chaîne latérale chargée				
arginine Arg	histidine His	lysine Lys	acide aspartique Asp	acide glutamique Glu
chaîne latérale non chargée polaire				
sérine Ser	thréonine Thr	asparagine Asn	glutamine Gln	
chaîne latérale apolaire				
alanine Ala	valine Val	leucine Leu	isoleucine Ile	méthionine Met
	phénylalanine Phe	tyrosine Tyr	tryptophane Trp	
autres cas				
cystéine Cys	sélocystéine Sec	glycine Gly	proline Pro	

4.2 Les nucléosides courants

<p>adénine</p>	<p>adénosine A</p>	<p>désoxyadénosine dA</p>
<p>guanine</p>	<p>guanosine G</p>	<p>désoxyguanosine dG</p>
<p>thymine</p>	<p>thymidine T</p>	<p>désoxythymidine dT</p>
<p>uracile</p>	<p>uridine U</p>	<p>désoxyuridine dU</p>
<p>cytosine</p>	<p>cytidine C</p>	<p>désoxycytidine dC</p>

1. Dans quelle famille peut-on ranger la partie gauche de la molécule (partie céramide) ?
2. Dans quelle famille peut-on ranger la partie droite de la molécule ?

Exercice 5 : la riboflavine

La riboflavine est la vitamine B2, dont la formule est donnée ci-dessous.

1. Quelles fonctions chimiques peut-on identifier dans la partie supérieure de la molécule (partie flavine) ?
2. À quelle famille de composés la partie inférieure appartient-elle ? Décrire la modification que ce composé a subi.

Exercice 6 : la salicyline

L'acide acétylsalicylique est le principe actif de l'aspirine. Il est obtenu par l'estérification de l'acide salicylique, un composé naturellement présent dans l'écorce du saule, avec l'acide éthanoïque. Le bilan d'une estérification est le suivant :

1. Identifier les groupes fonctionnels présents dans l'acide salicylique.
2. Quel est celui qui réagit avec l'acide éthanoïque pour réaliser une estérification ? En déduire la formule topologique de l'acide acétylsalicylique.

La salicyline est un composé qu'on trouve aussi dans l'écorce du saule blanc qui a des effets proches de ceux de l'acide salicylique ; en effet, dans l'organisme, il est métabolisé en acide salicylique.

3. De quelle famille de molécules biologiques la salicyline est-elle un dérivé ?
4. Par quel type de fonction chimique les deux parties de la molécule sont-elles reliées ?

acide salicylique

salicyline

Exercice 7 : la prostaglandine E₁

La prostaglandine E₁ ci-dessous est un principe actif servant dans le traitement des troubles de l'érection.

Comme toutes les prostaglandine de la série 1, elle est formée à partir de l'acide dihomo- γ -linoléique ci-dessous.

1. Dans quelle famille de composés biologiques peut-on ranger ces deux molécules ? Donner une réponse aussi précise que possible pour l'acide dihomo- γ -linoléique.
2. Donner le nom de l'acide dihomo- γ -linoléique en nomenclature systématique. On précise que l'alcane à 20 atomes de carbone s'appelle l'icosane.
3. Déterminer la formule brute de la prostaglandine E₁. Faire le lien avec l'acide dihomo- γ -linoléique.

Exercice 8 : l'acide ophtalmique

1. Donner le nom de l'acide α -aminobutyrique en nomenclature systématique.
2. À quelle famille l'acide ophtalmique appartient-il ? Donner une réponse aussi précise que possible. Identifier les trois molécules à partir desquelles l'acide ophtalmique est formé. Sont-elles toutes les trois classiques pour ce genre de composé ? À l'aide d'une table, identifier certaines d'entre elles.
3. Les liaisons reliant ces trois motifs sont-elles habituelles pour ce genre de composés ?

acide α -aminobutyrique

acide ophtalmique

Exercice 9 : l'acide pantothénique

L'acide pantothénique est la vitamine B5, dont la formule est donnée ci-dessous. Il est constitué de deux parties reliées par une fonction amide (liaison peptidique).

1. Écrire les deux molécules qui, par réaction l'une avec l'autre, forment la fonction amide.
2. Identifier celle qui correspond à l'acide pantoïque.
3. L'autre est un acide β -aminé, la β -alanine. En quoi un acide β -aminé diffère-t-il d'un acide α -aminé ?

Travaux dirigés

Exercice 1 : l'alanine et la carnosine

L'alanine est un composé indispensable au fonctionnement de tous les êtres vivants. La carnosine se forme lors de la digestion des viandes et aurait un rôle antioxydant ; elle est l'association de deux molécules.

1. À quelle famille de molécules l'alanine appartient-elle ?
2. Donner son nom complet.
3. Déterminer sa formule moléculaire.

L-alanine

carnosine

4. Écrire les représentations topologiques des deux molécules constitutives de la carnosine. Par quel type de liaison sont-elles associées ?
5. À l'aide d'une table, identifier la molécule constituant la partie droite de la carnosine. Identifier d'autre part la molécule constituant la partie gauche.

Exercice 2 : Le bombykol

Le bombykol est une phéromone sexuelle du bombyx, le mâle du ver à soie, dont le nom en nomenclature systématique est : hexadéca-10,12-diène-1-ol.

1. Dessiner le bombykol en représentation topologique. On précise que la désinence *hexadéca* correspond à une chaîne à 16 atomes.
2. À quelle famille de composés biologiques le bombykol appartient-il ?

Exercice 3 : détermination d'un nucléotide inconnu

L'analyse centésimale consiste à mesurer expérimentalement les pourcentages en masse de chaque élément dans une molécule inconnue. Par ailleurs, il est possible de mesurer expérimentalement la masse molaire d'une molécule sans connaître sa formule brute, grâce à différentes techniques.

On souhaite déterminer la structure d'une base azotée mineure, disponible sous la forme de son nucléotide monophosphate, qui est un dianion. La masse molaire mesurée est $M = 346,2 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, et l'analyse centésimale donne les pourcentages massiques suivants : 34,7% de C, 3,2% de H, 16,2% de N et 8,9% de P.

1. Représenter la structure schématique d'un nucléotide monophosphate.
2. Établir l'expression du pourcentage massique d'un élément dans la molécule en fonction de la masse molaire de la molécule, de la masse molaire d'un élément et du nombre d'atomes de cet élément présent dans la molécule.
3. En déduire la formule moléculaire du nucléotide monophosphate sous la forme : $C_xH_yN_zO_wP^{2-}$.
4. Déterminer la nature de la base azotée parmi la liste ci-dessous.
5. Le nucléotide monophosphate est-il un ribonucléotide ou un désoxyribonucléotide ?

hypoxanthine

7-méthylguanidine

pseudouracile

4-thiouracile

Exercice 4 : nomenclature

Donner les noms en nomenclature systématique des deux molécules suivantes.

Exercice 5 : formes cycliques des oses et des polyosides

1. Déterminer la forme ouverte du sucre ci-dessous à gauche. Préciser si sa nature (aldose ou cétose, triose, tétrose, etc).

2. Identifier les deux sucres constituant le dioside ci-dessus à droite, et préciser la nature de chacun d'entre eux.