TP/TD ENZYMOLOGIE BCPST 1.2

Séance du lundi 12/06/2022

Objectifs du TP :

Analyser et interpréter des données portant sur des cinétiques michaeliennes en présence ou non d'inhibiteurs

Interprétation du fonctionnement enzymatique en termes de structure moléculaire (avec Rastop)

Utilisation des techniques de chromatographie pour l'étude des protéines

Détermination de K_m et V_{max} avec un tableur.

Ce TP/TD se rapporte au chapitre SV-E-3 Les enzymes et la catalyse des réactions et SV-D-2-4 Acides aminés et protéines. Il s'agit d'appliquer les connaissances acquises sur la structure des protéines et sur le fonctionnement des enzymes :

Capacités exigibles en séances pratiques pour le chapitre SV-E-3

- Réaliser le suivi expérimental d'une réaction enzymatique :
 - Obtention d'une cinétique et détermination de la vitesse initiale ;
 - Construction d'une courbe $v_i = f([S]_0)$ et linéarisation en double inverse ;
 - Détermination de K_M , v_{max} et de l'efficacité catalytique.
- Relier la spécificité de substrat et de réaction à la structure tridimensionnelle et aux interactions du complexe enzyme-substrat.
- Exploiter des données de modélisation moléculaire.

1. Etude comparée de l'activité de deux enzymes (Géologie de Nancy 1998, modifié)

Le foie contient deux enzymes à cinétique michaelienne, l'hexokinase (HK) et la glucokinase (GK), toutes deux capables de catalyser la phosphorylation du glucose selon la réaction:

On sépare ces deux enzymes et leurs vitesses initiales V_1 pour HK et V_2 pour GK sont mesurées en fonction de la concentration en glucose. La concentration en ATP est maintenue saturante. Le tableau ci-dessous donne les résultats obtenus. Les vitesses initiales sont exprimées en unités internationales par gramme (g) de foie et on estime que la séparation des deux enzymes a été effectuée sans perte d'activité.

[Glucose] en mM.L ⁻¹	0,05	0,1	0,5	1	5	10	15	150	500	1500
V1	0,15	0,2	0,27	0,29	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
V2	0,01	0,01	0,03	0,06	0,25	0,40	0,50	0,91	0,97	1,00

- Expliquez pourquoi les biochimistes doivent travailler sur les vitesses initiales pour étudier l'activité enzymatique.*
- Déduire du tableau les K_m et V_m des deux enzymes sans calcul ni construction graphique. Justifiez votre démarche.*

Exercice 1

- La concentration en substrat est bien définie, l'enzyme est à l'état natif et la faible concentration de produit ne modifie pas la réaction.
- K_m est la concentration en substrat pour laquelle la vitesse est égale à $V_m/2$. Pour HK, $k_m = 0,05 \text{ mM. L}^{-1}$ et pour GK, $k_m = 15 \text{ mM. L}^{-1}$. HK est donc environ 300 fois plus affine pour le glucose que GK.

HK est présente dans les cellules de tous les tissus sauf les cellules parenchymateuses du foie. Elle catalyse une des premières étapes de la glycolyse.

GK n'est présente que dans les cellules parenchymateuses du foie qui mettent le glucose en réserve sous forme de glycogène après un repas. Elle catalyse la première réaction de la voie métabolique de cette mise en réserve.

- c. *Sachant que la masse molaire du glucose est de 180 g.mol^{-1} et que la glycémie des mammifères est d'environ $0,9 \text{ g. L}^{-1}$, sachant que la concentration intracellulaire hépatique de glucose est égale à la glycémie, les deux enzymes présentent-elles la même activité régulatrice de la phosphorylation du glucose ? Quel est l'intérêt biologique de cette différence ?*

Les mesures des vitesses sont maintenant effectuées en présence de glucose-6-phosphate ajouté au mélange réactionnel de départ contenant une des deux enzymes isolées. Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus.

Enzyme	Glucose 6-P	Km	Vmax
Hexokinase (HK)	$0,4 \text{ mM. L}^{-1}$	Constant	Diminué
Glucokinase (GK)	65 mM. L^{-1}	Augmenté	Constante

- d. *Interprétez les résultats obtenus.*
e. *Quel intérêt biologique pour la cellule présente le phénomène mis en évidence ?*

c. Une glycémie de $0,9 \text{ g.L}^{-1}$ représente $0,9/180$ soit 5 mM.L^{-1} . Le K_m de HK étant 100 fois plus faible que la glycémie, cela signifie que cet enzyme fonctionnera toujours à sa vitesse maximale (partie horizontale de la courbe). La phosphorylation du glucose sera donc permanente permettant ainsi aux cellules d'initier la glycolyse, assurant ainsi leur approvisionnement énergétique.

Par contre, le k_m de GK est 3 fois plus élevé que la concentration hépatique de glucose. L'enzyme travaille donc toujours à proximité de sa vitesses initiale (partie linéaire de la courbe). Sa vitesse dépendra donc de la concentration en glucose. Quand celle-ci augmente, la mise en réserve sera plus importante tandis que lorsqu'elle diminue, la mise en réserve sera atténuée. GK joue donc un rôle régulateur de la glycémie. L'intérêt biologique de cette différence est donc évident : HK permet l'approvisionnement énergétique optimal tandis que GK participe au contrôle de la glycémie.

d. Tableau résumé

Enzyme	HK	GK
Activité	<u>diminue</u>	<u>Cte</u>
Affinité	<u>Cte</u>	<u>diminue</u>
Type d'inhibition	Non compétitive	Compétitive

Il faut 162,5 fois plus de G6P dans le cas de GK ce qui suggère une moins grande sensibilité de cette enzyme à l'inhibiteur.

e. L'intérêt biologique peut s'appréhender à deux niveaux :

- ✓ Organisme : mise en réserve hépatique du glucose en cas d'hyperglycémie (glycogénogénèse) ou sa libération en cas d'hypoglycémie (glycogénolyse)
- ✓ Cellulaire : approvisionnement constant en substrat pour le métabolisme énergétique puisque la phosphorylation du glucose est l'étape d'engagement de la glycolyse qui se poursuit par la respiration mitochondriale en situation aérobie.

2. Etude de la phosphatase alcaline.

La phosphatase alcaline hydrolyse les monoesters de l'acide phosphorique. Le substrat utilisé pour cette étude cinétique est le p-nitrophénylphosphate de sodium (ou PNPP). La réaction est suivie en dosant spectrophotométriquement le p-nitrophénol (PNP) libéré par hydrolyse du substrat. La vitesse initiale de la réaction a été mesurée pour des concentrations différentes en substrat à 15°C et à pH 9,87. Trois essais ont été réalisés :

- 1^{er} essai : en l'absence d'effecteur.
- 2^e essai : en présence de β -glycérophosphate à la concentration de $2 \cdot 10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$.
- 3^e essai : en présence de cystéine à la concentration de $5 \cdot 10^{-6} \text{ mol.l}^{-1}$. Les résultats expérimentaux sont reproduits dans le tableau ci-dessous.

Concentration du substrat (en mol.l^{-1})	1 ^{er} essai Vitesse initiale (U. arb)	2 ^e essai Vitesse initiale (U. arb)	3 ^e essai Vitesse initiale (U. arb)
$1 \cdot 10^{-4}$	$83 \cdot 10^{-5}$	$51 \cdot 10^{-5}$	$58 \cdot 10^{-5}$
$2 \cdot 10^{-4}$	$132 \cdot 10^{-5}$	$88 \cdot 10^{-5}$	$91 \cdot 10^{-5}$
$5 \cdot 10^{-4}$	$200 \cdot 10^{-5}$	$154 \cdot 10^{-5}$	$138 \cdot 10^{-5}$

1. Représentez sur le même graphique de *Lineweaver et Burk* les courbes relatives à ces 3 essais. Vous prendrez une couleur différente pour chaque cas.
2. Déterminez les valeurs de K_m et de V_m à partir de ces courbes.
3. Comment se comportent le β -glycérophosphate et la cystéine vis à vis de l'enzyme ? Justifiez.

1/S	1/Vi Absence d'effecteur	1/Vi Présence de b- glycérophosphate	1/Vi Présence de cystéine
100 00	1204,8	1960,8	1724,1
500 0	757,6	1136,4	1098,9
200 0	500	649,4	724,6

On part de $1/V_i = K_m/V_{max} \cdot 1/[S] + 1/V_{max}$

Graphiquement $1/V_m = 310$ aux incertitudes près, donc $V_m = 322 \cdot 10^{-5}$ UA

$-1/K_m = -0,34 \cdot 10^4 \rightarrow K_m = 2,94 \cdot 10^{-4}$ mol/l

$1/V_m' = 440 \rightarrow V_m' = 227 \cdot 10^{-5}$ UA avec la cystéine.

$-1/K_m' = -0,2 \cdot 10^4 \rightarrow K_m' = 5 \cdot 10^{-4}$ mol/l avec le b glycérophosphate.

3- Donc le β glycérophosphate se comporte comme un inhibiteur compétitif puisque l'affinité diminue (K_m augmente) alors que la cystéine est un inhibiteur non compétitif qui diminue V_m sans modifier l'affinité de l'enzyme pour le substrat.

I. Compétitif

Si $[I]$ augmente, la courbe se redresse en pivotant autour de $1/V_M$

Il suffit d'augmenter $[S]$ pour lever l'inhibition, car alors toute l'enzyme est statistiquement engagée dans E-S

V_M ne change pas

$$K'_m = K_m \left[1 + \frac{[I]}{K_i} \right]$$

ce qui signifie que K'_m augmente avec $[I]$, et l'affinité diminue

I. Non Compétitif

Si $[I]$ augmente, la courbe se redresse en pivotant autour de $-1/K_m$

Il n'est pas possible de lever l'inhibition en augmentant $[S]$ car l'enzyme est modifiée par I. L'affinité de l'enzyme pour S ne change pas car il n'y a pas de compétiteur $\rightarrow K_m$ ne change pas

$$V'_m = \frac{V_m}{\left[1 + \frac{[I]}{K_i} \right]}$$

Si $[I] \uparrow$, alors $\frac{1}{V'_M} \uparrow$ et $V'_M \downarrow$

3. La cinétique enzymatique

Le tableau ci-dessous traduit la cinétique de la transformation d'un substrat S en l'absence et en présence d'une substance F.

[S] en mmol.dm ⁻³	1	1,5	2	3	4	8	16	20
mmol de S transformées/min	0,15	0,21	0,25	0,30	0,33	0,40	0,42	0,42
mmol de S transformées/min en présence de F	0,06	0,08	0,10	0,12	0,13	0,155	0,16	0,16

1. Sans construire la courbe, déterminer la vitesse maximale et la constante de Michaélis en l'absence et en présence de F.

On mesure la vitesse de transformation d'un substrat S en présence de 3 substances M, N et P. On obtient les courbes N° 2, 3 et 4 respectivement.

2. Déduire de ces courbes si M, N et P sont des activateurs ou des inhibiteurs. Justifiez.

Exercice 3

a : tableau résumé

	V_m (mmol.min ⁻¹)	$V_m/2$ (mmol.min ⁻¹)	K_m (mmol.dm ⁻³)
Absence de F	0,42	0,21	1,5
Présence de F	0,16	0,08	1,5
Inhibition non compétitive	Affinité non modifiée et V_m 2,5 fois plus faible		

b : Courbe 2 : inhibition non compétitive (V_m augmente, K_m ne varie pas) ; courbe 3 : activateur allostérique qui n'ose pas fixer sur le site actif ($1/V_m$ diminue donc V_m augmente mais $-1/K_m$ inchangé) ; courbe 4 : inhibition compétitive ($1/V_m$ ne varie pas, pente plus faible donc $-1/K_m$ plus faible i.e K_m plus grand donc affinité plus faible)

Courbe N° 4

$[P] = 2 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3}$

$[P] = 0 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3}$

$\frac{1}{v}$

0

$\frac{1}{[S]}$

$-1/K_m$

$-1/K'_m$

B. Etude de l'invertase : influence de la concentration en enzyme

L'invertase catalyse la réaction d'hydrolyse du saccharose : eau + saccharose = glucose + fructose.

On réalise une série d'expériences pour des concentrations croissantes en enzyme. Les autres conditions opératoires ($T^{\circ}\text{C} = 25^{\circ}\text{C}$, pH, concentration initiale en substrat) sont les mêmes pour chaque essai. Chaque essai est réalisé en introduisant dans un tube :

- 1 cm^3 de solution d'enzyme de concentration molaire CE mol.L^{-1} ;
- 1 cm^3 de solution tampon ;
- 1 cm^3 de solution de substrat en concentration saturante.

On dose le glucose apparu à intervalles de temps réguliers. Les résultats obtenus sont reportés dans le tableau page suivante.

CE = concentration d'enzyme en mol.L^{-1}	P = nombre de μmoles de glucose apparu par tube							
1.10^{-6}	0,8	1,5	2,5	3,3	4,1	5,0	5,8	6,6
$3,6.10^{-6}$	2,9	5,8	8,7	11,5	14,4	16,8	18,4	19,5
$5.6.10^{-6}$	5,0	10,0	15,0	17,8	19,5	21,0	21,7	22,0
Temps en minutes	2,5	5	7,5	10,0	12,5	15,0	17,5	20,0

- Tracez sur un même graphique les courbes représentatives de $P = f(t)$ pour chacune des concentrations en enzyme. Commenter l'allure de ces courbes.
- Déduisez des courbes précédentes la vitesse initiale V_i , de la réaction pour chacune des concentrations CE d'enzyme. La vitesse est exprimée en nombre de μmol de glucose apparu par tube et par minute.
- Tracez la courbe représentative de $V_i = f(\text{CE})$. Interpréter l'allure de la courbe.
- L'unité d'invertase est définie comme étant la quantité d'enzyme qui hydrolyse $1\ \mu\text{mol}$ de saccharose par minute à 25°C . Sachant que la masse molaire de l'enzyme est égale à $250\ 000\ \text{g.mol}^{-1}$, calculer l'**activité spécifique*** de l'enzyme.

* L'activité spécifique est la **quantité de substrat transformé par unité de temps et par masse de protéine** = l'activité enzymatique ramenée à une masse de protéine. L'activité spécifique est exprimée en UI.mgE^{-1} .

Une UI (Unité Internationale) est le nombre de μmol de P formé ou de S transformé par min.

Quantité de glucose apparu en μmoles au cours du temps pour trois concentrations d'enzyme en mol.L^{-1}

1.b : La V_i pour chaque concentration en substrat est donnée par la pente de la tangente à l'origine, c'est-à-dire la pente de la partie linéaire de la courbe (conditions initiales).

On divise les valeurs lues par 10 pour ramener à 1 minute

$CE = 1.10^{-6}$ mol. L⁻¹, $V_i = 0,33$ μmol de glucose. min⁻¹ par tube.

$CE = 3,6. 10^{-6}$ mol. L⁻¹, $V_i = 1,15$ μmol de glucose. min⁻¹ par tube.

$CE = 5,6. 10^{-6}$ mol. L⁻¹, $V_i = 1,78$ μmol de glucose. min⁻¹ par tube.

Vitesse initiale V_i en fonction de la concentration en enzyme

1.c : Les valeurs précédemment obtenues permettent de tracer la courbe représentative de $V_i = f(CE)$. On obtient une droite. En effet tant que la concentration en substrat est saturante, la V_i de la réaction enzymatique ne dépend que de la concentration en enzyme: $V_i = V_{\text{max}} [S] / K_m + [S]$ or $[S] \gg K_m$, donc $V_i = V_{\text{max}}$ qui est fonction de CE.

1.d : L'activité spécifique peut se calculer à partir de l'une des concentrations en enzyme CE, par exemple $5,6 \cdot 10^{-6} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, c'est-à-dire $5,6 \cdot 10^{-6} \times 250000 = 1,4 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$.

La masse d'enzyme utilisée dans le test est de 1,4 mg pour produire 1,78 μmol de glucose. L'activité spécifique est donc de $1,78 / 1,4 = 1,27 \text{ UI}\cdot\text{mg}^{-1}$.

Avec les autres valeurs de $[E]$, on trouve 1,32 et 1,28 $\text{UI}\cdot\text{mg}^{-1}$.

1.e : Activité de 1 ml d'extrait: $3,6/4 = 0,9$ UI. ml⁻¹.

300 mg d'enzyme pour 100 mL soit 3 g.L⁻¹ d'enzyme

Concentration molaire en enzyme: 3 g.L⁻¹ / $250\ 000$ g.mol⁻¹ = $12 \cdot 10^{-6}$ mol. L⁻¹.

Sur la courbe $V = f(CE)$, on a une concentration en enzyme égale à $2,6 \cdot 10^{-6}$ mol.L⁻¹ pour une activité de $0,9$ UI. ml⁻¹.

La masse en enzyme pure est $2,6 \cdot 10^{-6} \cdot 250\ 000 / 10 = 6,5 \cdot 10^{-2}$ g ou 65 mg. Le pourcentage en enzyme pure est donc de $[65/300] \times 100 = 21,7$ %.

On divise par 10 car on travaille sur 100 mL soit 1/10^e de litre

Vitesse initiale V_i en fonction de la concentration en enzyme