Exercice 1.

1. On pose $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + y - z = 0\}$.

(a) $(0, 0, 0) \in F$ car $2 \cdot 0 + 0 - 0 = 0$. $(1, 0, 2) \in F$ car $2 \cdot 1 + 0 - 2 = 0$

(b) Voir cours

2. Soit $G = \{(2x + y, x - y, 3y, 5x - 2y), (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$.

(a) $(2, 1, 0, 5)$ et $(1, -1, 3, -2)$ sont deux vecteurs non-colinéaires de G (obtenus en posant $(x, y) = (1, 0)$ puis $(x, y) = (0, 1)$).

(b) $G = \{x(2, 1, 0, 5) + y(1, -1, 3, -2), (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$. Donc, par définition, $G = \text{vect}((2, 1, 0, 5), (1, -1, 3, -2))$. Donc G est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ (puisque les vecteurs $(2, 1, 0, 5)$ et $(1, -1, 3, -2)$ appartiennent à $\mathbb{R}^4$ et que les combinaisons linéaires sont à coefficients réels).

3. Soit $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - y)(x + y) = 0\}$.

(a) $(1, 1)$ et $(1, -1)$ sont deux vecteurs non-colinéaires de H

(b) Représentation de H : c'est la réunion des deux droites d'équations $y = x$ et $y = -x$.

(c) Posons $u = (1, 1)$ et $v = (1, -1)$.

$u \in H$ car $(1 - 1)(1 + 1) = 0$. De même $v \in H$ car $(1 - (-1))(1 + (-1)) = 0$.

Mais $u + v = (2, 0) \notin H$ car $(2 + 0)(2 - 0) \neq 0$. Donc H n'est pas stable par combinaison linéaire.

Donc H n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

Exercice 2.

Partie I.

1. $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + 2y - 3z + t = 0\} = \{(x, y, z, -x - 2y + 3z) \in \mathbb{R}^4\}$

donc $F = \text{Vect}((1, 0, 0, -1), (0, 1, 0, -2), (0, 0, 1, 3))$. C'est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ et la famille

$\mathcal{B} = ((1, 0, 0, -1), (0, 1, 0, -2), (0, 0, 1, 3))$ en est une famille génératrice. Etudions sa liberté.

Soit $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \in \mathbb{R}^3$ tel que $\lambda_1(1, 0, 0, -1) + \lambda_2(0, 1, 0, -2) + \lambda_3(0, 0, 1, 3) = (0, 0, 0, 0)$.

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \\ -\lambda_1 - 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0. \quad \text{La famille est donc une base de } F \text{ et } \dim(F) = 3.$$

2. $G = \{(t, 2t, -t, 0), t \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, 2, -1, 0))$. C'est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ et la famille $\mathcal{C} = (1, 2, -1, 0)$ est une base de G donc $\dim(G) = 1$.

3. La famille $\mathcal{D}$ contient 4 vecteurs et $\mathbb{R}^4$ est un espace vectoriel de dimension 4. On va étudier la liberté de $\mathcal{D}$.

Soit $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4) \in \mathbb{R}^4$ tel que $\lambda_1(1, 0, 0, -1) + \lambda_2(0, 1, 0, -2) + \lambda_3(0, 0, 1, 3) + \lambda_4(1, 2, -1, 0) = (0, 0, 0, 0)$.

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_4 = 0 \\ \lambda_2 + 2\lambda_4 = 0 \\ \lambda_3 - \lambda_4 = 0 \\ -\lambda_1 - 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 0. \quad \text{La famille } \mathcal{D} \text{ est libre, donc c'est } \boxed{\text{une base de } \mathbb{R}^4}.$$

4. $u = 0(1, 0, 0, -1) + 0(0, 1, 0, -2) + 0(0, 0, 1, 3) + 1(1, 2, -1, 0)$

donc $\boxed{\text{les coordonnées de } u \text{ dans la base } \mathcal{D} \text{ sont } (0, 0, 0, 1)}$.

5. Soit (a, b, c, d) un vecteur de $\mathbb{R}^4$. Soit $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4) \in \mathbb{R}^4$ uniques tel que $\lambda_1(1, 0, 0, -1) + \lambda_2(0, 1, 0, -2) + \lambda_3(0, 0, 1, 3) + \lambda_4(1, 2, -1, 0) = (a, b, c, d)$.

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_4 = a \\ \lambda_2 + 2\lambda_4 = b \\ \lambda_3 - \lambda_4 = c \\ -\lambda_1 - 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = d \end{cases} \xrightarrow{L_4 \leftarrow L_4 + L_1} \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_4 = a \\ \lambda_2 + 2\lambda_4 = b \\ \lambda_3 - \lambda_4 = c \\ -2\lambda_2 + 3\lambda_3 + \lambda_4 = d + a \end{cases} \xrightarrow{L_4 \leftarrow L_4 + 2L_2} \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_4 = a \\ \lambda_2 + 2\lambda_4 = b \\ \lambda_3 - \lambda_4 = c \\ 3\lambda_3 + 5\lambda_4 = d + a + 2b \end{cases}$$

$$\xrightarrow{L_4 \leftarrow L_4 - 3L_3} \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_4 = a \\ \lambda_2 + 2\lambda_4 = b \\ \lambda_3 - \lambda_4 = c \\ 8\lambda_4 = d + a + 2b - 3c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = a - \frac{d + a + 2b - 3c}{8} = \frac{-d + 7a - 2b + 3c}{8} \\ \lambda_2 = b - 2 \frac{d + a + 2b - 3c}{8} = \frac{-2a + 4b + 6c - 2d}{8} = \frac{-a + 2b + 3c - d}{4} \\ \lambda_3 = c + \frac{d + a + 2b - 3c}{8} = \frac{d + a + 2b + 5c}{8} \\ \lambda_4 = \frac{d + a + 2b - 3c}{8} \end{cases}$$

Finalement, les coordonnées de (a, b, c, d) dans la base $\mathcal{D}$ sont :

$$\boxed{\left(\frac{-d + 7a - 2b + 3c}{8}, \frac{-a + 2b + 3c - d}{4}, \frac{d + a + 2b + 5c}{8}, \frac{d + a + 2b - 3c}{8} \right)}$$

Partie II. Plus généralement, soient F un sous-espace vectoriel de dimension 3 de $\mathbb{R}^4$ et soit u un vecteur de $\mathbb{R}^4$ qui n'appartient pas à F . On pose $G = \text{vect}(u)$.

1. F et G sont deux sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^4$ donc $0_{\mathbb{R}^4} \in F \cap G$ donc $\{0_{\mathbb{R}^4}\} \subset F \cap G$.

Soit $v \in F \cap G$. $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tel que $v = \lambda u$ (car $v \in G$).

Si $\lambda \neq 0$, alors $u = \frac{1}{\lambda} v$ donc $u \in F$. C'est absurde. Donc $\lambda = 0$ et $v = 0_{\mathbb{R}^4}$. Donc, $F \cap G \subset \{0_{\mathbb{R}^4}\}$.

Par double inclusion, $\boxed{F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^4}\}}$.

2. Montrons que la famille (v_1, v_2, v_3, u) est une famille libre :

Soient $x, y, z, t \in \mathbb{R}$ fixés quelconques tels que $xv_1 + yv_2 + zv_3 + tu = 0_{\mathbb{R}^4}$.

Alors $xv_1 + yv_2 + zv_3 = -tu$.

Le vecteur $xv_1 + yv_2 + zv_3$ appartient à F car c'est une combinaison linéaire de vecteurs de F . Par ailleurs, ce vecteur appartient à G car il est égal à $-tu$. Donc ce vecteur appartient à $F \cap G$.

Or $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^4}\}$. Donc $xv_1 + yv_2 + zv_3 = 0_{\mathbb{R}^4}$.

Or la famille (v_1, v_2, v_3) est libre (c'est une base de F). On en déduit que $x = y = z = 0$.

Puis : $-tu = 0_{\mathbb{R}^4}$, avec $u \neq 0_{\mathbb{R}^4}$. Donc $t = 0$.

Ainsi, $\boxed{\text{la famille } (v_1, v_2, v_3, u) \text{ est libre.}}$

3. C'est une famille libre de 4 vecteurs de $\mathbb{R}^4$ et $\mathbb{R}^4$ est de dimension 4. On en déduit que $\boxed{(v_1, v_2, v_3, u) \text{ est une base de } \mathbb{R}^4}$.