Dérivation

Exercice 1 (Correction très rapide)

1. Le faire.
2. Cela revient à justifier que f est dérivable en 0.
On trouve $f'(0)$ existe et vaut 1.
Une équation de la tangente est $y = x$.
3. On vérifie qu'on peut utiliser le théorème de la bijection et on l'utilise.
L'ensemble à déterminer est $] -1, 1[$.
Pour $f^{-1}(y)$ on trouve une expression qui dépend du signe de y .

Exercice 2 (Correction complète)

1. (a) On définit la fonction φ par :

$$\begin{aligned} \varphi : [0, +\infty[&\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x - \sin(x) \end{aligned}$$

Par les théorèmes opératoires, φ est dérivable sur $[0, +\infty[$.

Pour tout $x \in [0, +\infty[$, $\varphi'(x) = 1 - \cos(x) \geq 0$

On a donc le tableau suivant :

x	0	$+\infty$
$\varphi'(x)$	+	
φ	0	

Ceci prouve que, pour tout $x \in [0, +\infty[$, $0 \leq \varphi(x)$, c'est-à-dire $\sin(x) \leq x$.

$$\forall x \in [0, +\infty[, \sin(x) \leq x$$

- (b) On définit la fonction ψ par :

$$\begin{aligned} \psi : [0, +\infty[&\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x - \frac{x^3}{6} - \sin(x) \end{aligned}$$

Par les théorèmes opératoires, ψ est dérivable sur $[0, +\infty[$.

Pour tout $x \in [0, +\infty[$, $\psi'(x) = 1 - \frac{x^2}{2} - \cos(x)$.

Par les théorèmes opératoires, ψ' est dérivable sur $[0, +\infty[$.

Pour tout $x \in [0, +\infty[$, $\psi''(x) = -x + \sin(x) = -\varphi(x)$ (avec la notation de la question 1).

On a donc le tableau suivant :

x	0	$+\infty$
$\psi''(x)$	-	
ψ'	0	
$\psi'(x)$	-	
ψ	0	

Ceci prouve que, pour tout $x \in [0, +\infty[$, $\psi(x) \leq 0$, c'est-à-dire $x - \frac{x^3}{6} - \sin(x) \leq 0$.

$$\forall x \in [0, +\infty[, x - \frac{x^3}{6} \leq \sin(x)$$

(c) Soit $x \in] -\infty, 0]$.

On pose $X = -x$; ainsi, $X \in [0, +\infty[$.

Les résultats des questions précédentes s'appliquent : $X - \frac{X^3}{6} \leq \sin(X) \leq X$.

On transforme :

$$X - \frac{X^3}{6} \leq \sin(X) \leq X$$

$$\Leftrightarrow -x - \frac{(-x)^3}{6} \leq \sin(-x) \leq -x$$

$$\Leftrightarrow -x + \frac{x^3}{6} \leq -\sin(x) \leq -x$$

$$\Leftrightarrow x - \frac{x^3}{6} \geq \sin(x) \geq x$$

$$\boxed{\forall x \in] -\infty, 0[, x - \frac{x^3}{6} \geq \sin(x) \geq x}$$

2. (a) Tout d'abord, par les théorèmes opératoires, f est continue sur $\mathbb{R}^*$.

On étudie alors $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Soit $x \in \mathbb{R}^*$.

- Si $x > 0$

$$x - \frac{x^3}{6} \leq \sin(x) \leq x$$

$$\text{Donc } 1 - \frac{x^2}{2} \leq f(x) \leq 1.$$

Donc, par le théorème des gendarmes, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$.

- Si $x < 0$

$$x - \frac{x^3}{6} \geq \sin(x) \geq x$$

$$\text{Donc } 1 - \frac{x^2}{2} \leq f(x) \leq 1$$

Donc, par le théorème des gendarmes, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$.

Finalement, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$.

$\boxed{\text{On peut prolonger } f \text{ par continuité en } 0 \text{ en posant } f(0) = 1}$

(b) Par les théorèmes opératoires, f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

Pour étudier la dérivabilité en 0, on étudie : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$.

Soit $x \in \mathbb{R}^*$.

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\frac{\sin(x)}{x} - 1}{x} = \frac{\sin(x) - x}{x^2}$$

- Si $x > 0$.

$$x - \frac{x^3}{6} \leq \sin(x) \leq x$$

$$\text{Donc } -\frac{x}{6} \leq \frac{\sin(x) - x}{x^2} \leq 0$$

Donc, par le théorème des gendarmes, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 0$.

- Si $x < 0$, on raisonne de même.

Finalement, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 0$.

Donc f est dérivable en 0 avec $f'(0) = 0$.

Donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

(c) Par les théorèmes opératoires, f' est continue sur $\mathbb{R}^*$.

Reste à étudier la continuité en 0 ; on veut donc démontrer que $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0) = 0$.

Soit $x \in \mathbb{R}^*$.

$$f'(x) = \frac{x \cos(x) - \sin(x)}{x^2} = \frac{x \cos(x) - x}{x^2} + \frac{x - \sin(x)}{x^2}$$

Or :

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin(x)}{x^2} = 0$ (vu à la question 2b)
- $\frac{x \cos(x) - x}{x^2} = \frac{\cos(x) - 1}{x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{-\frac{x^2}{2}}{x} \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} 0$

C'est ce qu'on voulait.

Donc f est continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3 (Correction rapide)

1. f est continue de façon évidente sur $\mathbb{R}^*$.

La question revient à savoir si le prolongement par continuité a été fait correctement.

En utilisant le théorème des gendarmes, on démontre que la réponse est oui.

2. f est dérivable de façon évidente sur $\mathbb{R}^*$.

En 0, il faut passer par le taux d'accroissement.

On trouve que f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

3. f' est continue sur $\mathbb{R}^*$.

En 0, il faut revenir à la définition de la continuité.

On trouve que f' n'a pas de limite en 0.

Donc la réponse est non.

Remarque

Très intéressant d'interpréter graphiquement l'ensemble de ces résultats. Ci-dessous :

- En haut, la parabole d'équation $y = x^2$
- Au milieu, la courbe représentative de f
- En bas, la parabole d'équation $y = -x^2$

Exercice 4 (Grandes lignes)

On pose $f : x \mapsto \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$.

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$, et on trouve $f' = 0$.

Donc f est constante *sur chaque intervalle où elle est définie*.

Ainsi, f est constante sur $] -\infty, 0]$ (et $f(-1) = -\frac{\pi}{2}$) et f est constante sur $[0, +\infty[$ (et $f(1) = \frac{\pi}{2}$).

Exercice 5 (Correction très rapide)

1. Le seul problème éventuel vient de la racine qui n'est pas dérivable en 0.

Mais, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 + 1 > 0$.

Donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

2. *Pas de spoil... Mais il faut trouver une expression vraiment très simple.*

Exercice 6 (Correction très rapide)

1. Voir chapitre "Trigonométrie".

Il faut surtout faire attention aux intervalles de départ et d'arrivée.

2. On utilise le théorème de dérivation de la réciproque *en faisant bien attention à la condition de non annulation de la dérivée*.
3. Idem
4. Même méthode que l'exercice 4.

Exercice 7 (Grandes lignes)*Fait en classe.***Exercice 8 (Grandes lignes)**

On note $f : X \mapsto \exp\left(\frac{1}{X}\right)$, définie sur $\mathbb{R}^*$.

On fixe x au voisinage de $+\infty$.

On vérifie que le théorème des accroissements finis s'applique sur $[x, x+1]$ et on note c_x le réel associé.

On a alors : $f'(c_x) = \frac{f(x+1) - f(x)}{x+1 - x}$

C'est-à-dire : $-\frac{1}{c_x^2} \exp\left(\frac{1}{c_x}\right) = \exp\left(\frac{1}{x+1}\right) - \exp\left(\frac{1}{x}\right)$

D'où : $x^2 \left[\exp\left(\frac{1}{x}\right) - \exp\left(\frac{1}{x+1}\right) \right] = \frac{x^2}{c_x^2} \exp\left(\frac{1}{c_x}\right)$

Or : $x < c_x < x+1$ donc par théorème des gendarmes, $\frac{x^2}{c_x^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$

Et : si x tend vers $+\infty$, par comparaison, c_x aussi donc $\frac{x^2}{c_x^2} \exp\left(\frac{1}{c_x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left[\exp\left(\frac{1}{x}\right) - \exp\left(\frac{1}{x+1}\right) \right] = 1}$$

Exercice 9 (Très grandes lignes)

Exercice qui demande beaucoup d'initiatives, qui est fait pour être fait en classe... Et on ne le fera pas cette année.

L'idée est de poser :

$$g : [0, a] \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} \frac{f(x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

et de lui appliquer le théorème de Rolle.

Exercice 10 (Grandes lignes)

1. On raisonne par l'absurde : on suppose que $g(a) = g(b)$.

On vérifie que le théorème de Rolle s'applique (et c'est bien le cas).

On en déduit que g' s'annule, ce qui est faux.

Conclusion : $g(a) \neq g(b)$.

2. • Etape 1 : brouillon

On commence par transformer le problème pour comprendre quelle valeur de λ choisir.

On veut appliquer le théorème de Rolle à la fonction h (par monomanie).

On résout : $h(a) = h(b) \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \lambda = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$ (possible d'après la question 1).

• Etape 2 : au propre

On pose λ la valeur trouvée et h la fonction associée.

On vérifie que le théorème de Rolle s'applique à la fonction h (et c'est bien le cas).

Donc il existe $c \in]a, b[$ tel que $h'(c) = 0$.

On calcule $h'(x)$ pour $x \in]a, b[$ et on en déduit que l'égalité $h'(c) = 0$ est équivalent à l'égalité voulue.

3. On fixe provisoirement $x \in]a, b[$.

On montre qu'il existe alors $c_x \in]a, x[$ tel que : $\frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}$.

Or, quand x tend vers a , par encadrement, c_x tend aussi vers a .

D'où le résultat.

4. On trouve $\frac{1}{4}$.

Exercice 11*Fait en classe.***Exercice 12 (Grandes lignes)**1. • Pour f→ Phase de conjecturePour dériver plus facilement, on écrit $f(x) = (x-1)^{-1}$ et on utilise la formule de dérivation d'une puissance.

$$f'(x) = -1 \times (x-1)^{-2}$$

$$f''(x) = -1 \times (-2) \times (x-1)^{-3}$$

$$f'''(x) = -1 \times (-2) \times (-3) \times (x-1)^{-4}$$

On conjecture que : $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}, f^{(n)}(x) = (-1)^n n! (x-1)^{-(n+1)}$ → Preuve de la conjecture

On raisonne par récurrence

→ Conclusion

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}, f^{(n)}(x) = (-1)^n n! (x-1)^{-(n+1)}}$$

• Pour g

On procède de la même façon et on démontre que :

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, g^{(n)}(x) = (-1)^n n! (x+1)^{-(n+1)}}$$

2. Tout d'abord, on fait le lien entre h, f et g : $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}, h(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{-1}{x+1}$.

On en déduit que :

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}, h^{(n)}(x) = \frac{1}{2} (-1)^n n! \left[(x-1)^{-(n+1)} - (x+1)^{-(n+1)} \right]}$$

Exercice 13 (Correction complète)

Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé.

Tout d'abord, P est un polynôme donc P est infiniment dérivable sur $\mathbb{R}$.

• Phase de conjecture

Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$P^{(0)}(x) = x^n$$

$$P'(x) = nx^{n-1}$$

$$P''(x) = n(n-1)x^{n-2}$$

$$P'''(x) = n(n-1)(n-2)x^{n-3}$$

...

Dans les écritures précédentes, il est sous-entendu que $n-3 \geq 0$. En effet, si $k > n$, $P^{(k)}$ est le polynôme nul.

On conjecture finalement que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, P^{(k)}(x) = \begin{cases} \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k} & \text{si } k \leq n \\ 0 & \text{si } k > n \end{cases}$$

• Preuve de la conjecture par récurrence

- Initialisation : pour $k = 0$

D'une part, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $P^{(0)}(x) = x^n$

D'autre part, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\frac{n!}{(n-0)!} x^{n-0} = x^n$

La propriété est initialisée.

- Hérédité

On suppose qu'il existe $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ tel que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $P^{(k)}(x) = \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k}$.

Tout d'abord, comme $0 \leq k \leq n-1$, on a $1 \leq n-k$; $P^{(k)}$ n'est donc pas un polynôme constant.

On peut donc le dériver selon les règles de calcul habituelles.

Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} P^{(k+1)}(x) &= \frac{n!}{(n-k)!} \times (n-k) x^{n-k-1} \\ &= \frac{n!}{(n-k-1)!} x^{n-(k+1)} \\ &= \frac{n!}{(n-(k+1))!} x^{n-(k+1)} \end{aligned}$$

La propriété est donc héréditaire.

- Conclusion

$$\boxed{\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \forall x \in \mathbb{R}, P^{(k)}(x) = \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k}}$$

- Pour $k > n$

La formule précédente reste valable pour $k = n$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $P^{(n)}(x) = \frac{n!}{(n-n)!} x^{n-n} = n!$.

On en déduit que : $\boxed{\forall k \in \mathbb{N} \text{ avec } n > k, \forall x \in \mathbb{R}, P^{(k)}(x) = 0}$

Exercice 14 (Correction dans les grandes lignes)

On procède par récurrence, avec une variante. La propriété doit être vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$, il faut donc initialiser à $n = 0$. Mais on se rend compte lors de l'hérédité qu'on a aussi besoin de savoir que la propriété est vraie pour $n = 1$ pour réussir l'hérédité. On fait donc aussi l'initialisation pour $n = 1$.

- Initialisation : $n = 0$

D'une part, $(fg)^{(0)} = fg$

D'autre part, $\sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} f^{(k)} g^{(0-k)} = f^{(0)} g^{(0)} = fg$

La propriété est initialisée.

- Initialisation : $n = 1$

D'une part, $(fg)' = f'g + fg'$ d'après le cours du chapitre "Dérivées, primitives et intégrales".

D'autre part, $\sum_{k=0}^1 \binom{1}{k} f^{(k)} g^{(1-k)} = f^{(0)} g^{(1)} + f^{(1)} g^{(0)} = fg' + f'g$

La propriété est donc vraie pour $n = 1$.

- Hérédité

On suppose qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$.

On dérive alors :

$$\begin{aligned} (fg)^{(n+1)} &= \left((fg)^{(n)} \right)' \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left((f^{(k)})' g^{(n-k)} + f^{(k)} (g^{(n-k)})' \right) \quad \begin{array}{l} \text{(par linéarité de la dérivation} \\ \text{et en utilisant la formule pour } n = 1) \end{array} \end{aligned}$$

On termine alors les calculs avec les mêmes étapes sur la démonstration de la formule du binôme de Newton.

Exercice 15 (Correction rapide)

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 1 - \sin(x)$.

Ainsi, f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Mais f' s'annule une infinité de fois ; en tout x de la forme $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Exercice 16 (Correction complète)

1. La fonction $\ln$ est solution de (E).

2. Remarque : vue la formulation, la question 2 constitue l'analyse d'une analyse-synthèse.

(a) On pose $x = y = 1$.

Dans ce cas : $f(xy) = f(x) + f(y) \Leftrightarrow f(1) = 2f(1) \Leftrightarrow f(1) = 0$.

Ainsi, $f(1) = 0$.

(b) On fixe $x \in]0, +\infty[$. On prend alors aussi $h > 0$.

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{f\left(x\left(1 + \frac{h}{x}\right)\right) - f(x)}{h} \\ &= \frac{f(x) + f\left(1 + \frac{h}{x}\right) - f(x)}{h} \\ &= \frac{f\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{h} \\ &= \frac{f\left(1 + \frac{h}{x}\right) - f(1)}{h} \\ &= \frac{f\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{\frac{h}{x}} \times \frac{1}{x} \end{aligned}$$

Or, on sait que f est dérivable en 1.

$$\text{Donc } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(1) \times \frac{1}{x}.$$

Ceci prouve que : f est dérivable sur $]0, +\infty[$ et, pour tout $x \in]0, +\infty[$, $f'(x) = \frac{f'(1)}{x}$.

3. Remarque : il s'agit de maintenant de terminer l'analyse et de procéder à la synthèse.

- Analyse

Soit f une fonction solution du problème.

D'après les questions précédentes : $\forall x \in]0, +\infty[$, $f'(x) = \frac{f'(1)}{x}$.

Donc il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = f'(1) \ln(x) + C$

Or, $f(1) = 0$ donc, nécessairement $C = 0$.

Ainsi, on obtient : $\forall x \in]0, +\infty[$, $f(x) = f'(1) \ln(x)$.

- Synthèse

Soit f une fonction définie par :

$$f : \begin{array}{l}]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto K \ln(x) \end{array}$$

avec K une constante réelle.

Dans ce cas :

→ f est définie sur $]0, +\infty[$

→ f est dérivable en 1

→ si $x, y \in]0, +\infty[$, alors $f(xy) = K \ln(xy) = K(\ln(x) + \ln(y)) = K \ln(x) + K \ln(y) = f(x) + f(y)$

Donc f est solution du problème.

Remarque : et, dans ce cas, en dérivant puis en évaluant en 1, on obtient $K = f'(1)$.

- Conclusion

L'ensemble des solutions de (E) est :

$$\left\{ f : \begin{array}{l}]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto K \ln(x) \end{array}, K \in \mathbb{R} \right\}$$