Variables aléatoires sur un univers fini
Variables aléatoires finies
Exercice 1

On dispose d'une urne contenant une boule rouge et quatre boules noires. On tire successivement toutes les boules sans remise et on note X le rang du tirage de la boule rouge.

Déterminer la loi de X .

Exercice 2

On vous propose de jouer à un jeu. Pour pouvoir participer, il faut d'abord payer 1 euro. Ensuite, on lance deux dés classiques équilibrés simultanément.

- Si l'un des dés au moins présente un chiffre impair, vous ne gagnez rien.
- Sinon, si les dés présentent deux chiffres différents, vous gagnez 1 euro.
- Sinon, si les dés présentent le même chiffre pair, vous gagnez une somme égale au total des points des deux dés.

On note X la variable aléatoire qui à une partie associe le gain algébrique.

1. (a) Ecrire une fonction Python qui simule ce jeu.
(b) A l'aide de Python, en déduire une valeur approchée de $E(X)$.
2. Déterminer la loi de X .
3. Calculer $E(X)$ et interpréter.

Exercice 3

Un dé à 6 faces, numérotées de 1 à 6, est tel que la probabilité d'apparition d'une face est proportionnelle à sa valeur.

On lance ce dé et on note X le nombre obtenu.

1. Déterminer la loi de X , $E(X)$ et $V(X)$.
2. On généralise avec un dé à n faces ($n \in \mathbb{N}^*$).

(a) Démontrer que $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.

- (b) Déterminer la loi, l'espérance et la variance de X .

Exercice 4

Chaque individu d'une population souffre d'une certaine maladie avec une probabilité $p = 0,01$. Pour dépister cette maladie dans un échantillon de n individus, on a le choix entre deux techniques :

- Technique n°1 : effectuer un dépistage sur un échantillon sanguin de chaque individu.
- Technique n°2 : on effectue d'abord un dépistage sur un échantillon contenant le mélange du sang des n individus, puis dans le cas où le résultat est positif, on effectue le dépistage sur chaque échantillon.

On note X_n la variable aléatoire égale au nombre d'analyses effectuées avec la technique n°2.

1. Déterminer la loi de X_n et son espérance.
2. Montrer que la technique n°2 est préférable à la technique n°1 si et seulement si $n \ln(0,99) + \ln(n) > 0$.
3. Déterminer (calculatrice requise) les solutions de cette inéquation.

Lois usuelles
Exercice 5

Dans chacune des situations suivantes, reconnaître la loi usuelle suivie par la variable aléatoire X .

On ne demande pas de justification.

1. On choisit une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes.
 X est la hauteur de la carte choisie.
2. Un lion mange à chaque repas une gazelle (avec probabilité $\frac{2}{3}$) ou un zèbre (avec probabilité $\frac{1}{3}$). On suppose que la composition d'un repas est indépendante de celle des autres.
 X est le nombre de zèbres mangés sur 10 repas consécutifs.
3. On lance un dé classique à 6 faces.
 X est le chiffre obtenu.
4. 3000 sportifs se lancent au départ d'un marathon. Chaque participant termine la course avec une probabilité $\frac{2}{3}$.
 X est le nombre de personnes qui terminent la course.
5. Bruno dort chez son ami Justine qui lui a prêté son appartement. Il dispose d'un trousseau de 7 clés et ne sait pas laquelle est la bonne. Il les essaie une à une en mettant de côté chaque mauvaise clé essayée.
 X est le nombre d'essais nécessaires pour trouver la bonne clé.

Exercice 6

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit une variable aléatoire X_n par :

- $X_n(\Omega) = \left\{ \frac{1}{n}, \dots, \frac{n}{n} \right\}$

- Pour tout $k \in X_n(\Omega)$, $P(X_n = k) = \frac{1}{n}$

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, exprimer X_n en fonction d'une loi usuelle.
2. En déduire $E(X_n)$ en fonction de $n \in \mathbb{N}^*$ et étudier la limite de $E(X_n)$ quand n tend vers $+\infty$.

Exercice 7

On considère un jeu de 32 cartes et on pioche simultanément deux cartes dans le paquet. Si les deux cartes tirées sont de même valeur, on dit qu'il y a bataille et on pose $B = 1$. Sinon, on pose $B = 0$.

Déterminer la loi de B ainsi que son espérance et sa variance.

Exercice 8

Une puce se déplace de manière rectiligne. A chaque saut, elle avance d'un centimètre avec une probabilité $p \in [0, 1]$ et recule d'un centimètre avec une probabilité $1 - p$. Chaque saut est indépendant des autres.

On note X_n la variable aléatoire qui donne l'abscisse de la puce sur l'axe au bout de n sauts ($n \in \mathbb{N}^*$).

1. Ecrire une fonction Python qui simule la situation.
2. Exprimer X_n en fonction d'une variable aléatoire suivant une loi usuelle.
3. Déterminer l'espérance et la variance de X_n .

Exercice 9

On cherche à transmettre des données informatiques (une suite de 0 et de 1). Un bruit dans une transmission peut fausser un caractère (transformer un 0 en 1 ou un 1 en 0) avec la probabilité $1 - p$ ($p \in]0, 1[$), de manière indépendante.

Pour limiter cette altération, on envoie trois fois chaque caractère et si on a obtenu une majorité de 0 on considère que le caractère est 0. Sinon, on considère que le caractère est 1.

1. Pour un caractère, on note S la variable aléatoire qui donne le nombre de fois où le caractère a été transmis avec succès au cours des trois envois.
Montrer que, si $p > \frac{1}{2}$, la fiabilité de la réception est meilleure avec le triple envoi qu'avec un seul.
2. Quelle est la probabilité qu'un message de n caractères ($n \in \mathbb{N}^*$) ait été envoyé sans erreur ?
3. Quel est le nombre moyen de caractères erronés à la réception d'un message de n caractères ?

Exercice 10

Soit X une V.A. de loi $\mathcal{B}(n, p)$.

Calculer l'espérance de $\frac{1}{X+1}$.

Couples de variables aléatoires**Exercice 11**

Dans une urne, il y a une boule rouge. On lance un dé équilibré à 4 faces numérotées de 1 à 4 et on note X le nombre obtenu. On place alors X boules blanches dans l'urne, puis on retire les boules de l'urne, une à une, jusqu'à avoir tiré la boule rouge. On note alors Y le nombre de boules tirées.

1. Déterminer la loi de X .
2. Pour tous $(i, j) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$, déterminer :

$$P\left((X = i) \cap (Y = j)\right)$$

3. Déterminer la loi de Y .
4. Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes ?

Exercice 12

Une urne contient 4 boules rouges, 4 boules blanches et 2 boules jaunes. On tire successivement et avec remise trois boules. On note R le nombre de boules rouges et J le nombre de boules jaunes obtenues.

1. Déterminer les lois de R et J .
2. R et J sont-elles indépendantes ?

Approfondissement**Exercice 13**

Soient A et B deux événements d'un univers fini Ω .

Démontrer que :

1. $\mathbb{1}_{A \cap B} = \mathbb{1}_A \times \mathbb{1}_B$
2. $\mathbb{1}_{\bar{A}} = 1 - \mathbb{1}_A$
3. $\mathbb{1}_{A \cup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_{A \cap B}$

Exercice 14

Soit $n \in \mathbb{N}$ et X une V.A. tels que $X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket$.

Montrer que :

$$E(X) = \sum_{k=1}^n P(X \geq k)$$

Exercice 15

Une puce se déplace de manière rectiligne dans un seul sens par bonds successifs de 1 cm, avec une probabilité $p \in [0, 1]$, ou de 2 cm, avec une probabilité $1 - p$. Tous les sauts sont indépendants.

1. On note S_n le nombre de sauts de 2 cm effectués au cours des n premiers sauts.
Déterminer la loi de S_n .
2. On note X_n le nombre de cm parcourus par la puce après n sauts.
 - (a) Ecrire une fonction Python $\mathbf{X}(n, p)$ qui simule X_n .
 - (b) Exprimer X_n en fonction de S_n . En déduire l'espérance et la variance de X_n .
3. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note Y_n le nombre de sauts nécessaires pour parcourir n cm.
 - (a) Ecrire une fonction Python $\mathbf{Y}(n, p)$ qui simule Y_n .
 - (b) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, exprimer $P(Y_{n+2} = k)$ en fonction de $P(Y_{n+1} = k - 1)$ et $P(Y_n = k - 1)$.
On pourra utiliser le système complet d'événements $\left((X_1 = 1), (X_1 = 2)\right)$.
 - (c) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, en déduire une relation de récurrence sur $E(Y_n)$.
 - (d) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = E(Y_n) - an$.
Déterminer réel a pour que (u_n) soit une suite récurrente linéaire d'ordre 2.
 - (e) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, en déduire l'espérance de Y_n .

Exercice 16

Une urne contient n boules numérotées de 1 à n . On effectue trois tirages d'une boule, successifs et avec remise.

On note Z la variable aléatoire égale à la différence entre le plus grand numéro obtenu et le plus petit.

1. Déterminer $Z(\Omega)$.
2. Déterminer la loi de Z .
On pourra traiter à part le cas ($Z = 0$).
3. (a) Démontrer que, pour tout $N \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=1}^N k^3 = \left(\frac{N(N+1)}{2} \right)^2$$

- (b) Déterminer l'espérance de Z .
4. Déterminer un polynôme réel P tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, P(x+1) - P(x) = nx^3 - x^4$$

En déduire $V(Z)$.

Exercice 17

Un groupe de chercheurs s'intéresse au comportement d'une souris lorsqu'elle est placée dans un labyrinthe.

Le labyrinthe comporte trois croisements numérotés 1, 2 et 3 et de nombreux chemins. Il est schématisé sur la Figure 2 ci-dessous. Les flèches indiquent les déplacements possibles et les nombres portés le long des flèches indiquent les probabilités respectives que la souris choisisse ces déplacements.

A l'instant initial, on place la souris sur le croisement numéro 1.

On note X_n la variable aléatoire qui indique le numéro du croisement où se trouve la souris après le $n^{\text{ème}}$ déplacement ($n \in \mathbb{N}$).

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note aussi Y_n le vecteur colonne défini par : $Y_n = \begin{pmatrix} P(X_n = 1) \\ P(X_n = 2) \\ P(X_n = 3) \end{pmatrix}$.

Ainsi, $Y_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $Y_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$.

1. On note A la matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ définie par :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, Y_{n+1} = AY_n$$

2. En déduire que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, Y_n = A^n Y_0$$

3. Donner, pour tout $n \geq 1$, $P(X_n = 3)$. Justifier votre réponse.
4. (a) Calculer A^2 puis $A^2 \times (2A - I)$ (où I est la matrice identité d'ordre 3).
En déduire la relation $A^3 = \frac{1}{2}A^2 + \frac{1}{2}A$.
- (b) En déduire l'existence de deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ telles que, pour tout entier naturel n non nul : $A^n = u_n A^2 + v_n A$.
- (c) Exprimer, pour tout entier naturel n non nul, u_{n+1} et v_{n+1} en fonction de u_n et v_n puis u_{n+2} en fonction de u_{n+1} et u_n .
- (d) Calculer, pour tout entier naturel n non nul, u_n et v_n .
5. Déterminer, pour tout entier naturel n non nul, la loi de X_n .