Chapitre 26 : Espaces vectoriels (prof)

Table des matières

1	Structure de $\mathbb{R}^n$	2
1.1	Définition	2
1.2	Lois de compositions interne et externe sur $\mathbb{R}^n$	2
1.3	Stabilité par combinaison linéaire	3
2	Structure de sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$	4
2.1	Partie de $\mathbb{R}^n$ stable par combinaisons linéaires	4
2.2	Sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^n$	5
2.3	Sous-espaces vectoriels engendrés par des vecteurs	6
2.4	Intersection de sous-espaces vectoriels	7
3	Familles de vecteurs dans un espace vectoriel	8
3.1	Familles génératrices d'un sous-espace vectoriel	8
3.2	Familles liées, familles libres	9
3.3	Bases d'un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$	10
4	Espaces vectoriels (HP en première année)	13

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé dans tout le chapitre.

1 Structure de $\mathbb{R}^n$

1.1 Définition

Définition 1.

On note $\mathbb{R}^n$ l'ensemble des n -uplets formés de réels

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) / \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i \in \mathbb{R}\}$$

Les éléments de $\mathbb{R}^n$ sont appelés vecteurs de $\mathbb{R}^n$. On les note $x = (x_1, \dots, x_n)$

On appelle vecteur nul de $\mathbb{R}^n$ le vecteur défini par : $0_{\mathbb{R}^n} = (0, \dots, 0)$.

1.2 Lois de compositions interne et externe sur $\mathbb{R}^n$

Définition 2.

Soient $x = (x_1, \dots, x_n)$ et $y = (y_1, \dots, y_n)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$.

On appelle somme de x et de y et on note $x + y$ le vecteur de $\mathbb{R}^n$ défini par :

$$x + y = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$$

On définit une loi de composition interne sur $\mathbb{R}^n$: $\begin{cases} \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \\ (x, y) \mapsto x + y \end{cases}$

Théorème 3.

La loi $+$ sur $\mathbb{R}^n$ a les propriétés suivantes :

- **Commutativité** : $\forall (x, y) \in (\mathbb{R}^n)^2, x + y = y + x$.
- **Associativité** : $\forall (x, y, z) \in (\mathbb{R}^n)^3, (x + y) + z = x + (y + z)$.
- **Élément neutre** : $\forall x \in \mathbb{R}^n, x + 0_{\mathbb{R}^n} = x$.
- **Symétrique** : $\forall x \in \mathbb{R}^n, \exists y \in \mathbb{R}^n$ tel que $x + y = y + x = 0_{\mathbb{R}^n}$.

Démonstration :

- Soient $x = (x_1, \dots, x_n)$ et $y = (y_1, \dots, y_n)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$.

$$x + y = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) = (y_1 + x_1, \dots, y_n + x_n) = y + x$$

donc la loi $+$ est commutative sur $\mathbb{R}^n$.

- Soient $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$ et $z = (z_1, \dots, z_n)$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^n$.

$$\begin{aligned} (x + y) + z &= (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) + (z_1, \dots, z_n) \\ &= (x_1 + y_1 + z_1, \dots, x_n + y_n + z_n) \\ &= (x_1, \dots, x_n) + (y_1 + z_1, \dots, y_n + z_n) \\ &= x + (y + z) \end{aligned}$$

donc la loi $+$ est associative.

- Soit $x = (x_1, \dots, x_n)$ un vecteur de $\mathbb{R}^n$.

$$x + 0_{\mathbb{R}^n} = (x_1, \dots, x_n) + (0, \dots, 0) = (x_1 + 0, \dots, x_n + 0) = x$$

donc $0_{\mathbb{R}^n}$ est un élément neutre pour l'addition.

- Soit $x = (x_1, \dots, x_n)$ un vecteur de $\mathbb{R}^n$. Posons $y = (-x_1, \dots, -x_n)$.

$$x + y = (x_1 - x_1, \dots, x_n - x_n) = 0_{\mathbb{R}^n}$$

donc tout élément admet un symétrique par la loi +. ■

Définition 4.

Soient $x = (x_1, \dots, x_n)$ un vecteur de $\mathbb{R}^n$ et λ un élément de $\mathbb{R}$.

On appelle multiplication de x par λ et on note $\lambda.x$ le vecteur de $\mathbb{R}^n$ défini par

$$\lambda.x = (\lambda.x_1, \dots, \lambda.x_n)$$

On définit une loi de composition externe sur $\mathbb{R}^n$: $\begin{cases} \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \\ (\lambda, x) \mapsto \lambda.x \end{cases}$

Théorème 5.

La loi $.$ sur $\mathbb{R}^n$ a les propriétés suivantes :

- $\forall (x, y) \in (\mathbb{R}^n)^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \lambda.(x + y) = \lambda.x + \lambda.y$
- $\forall x \in \mathbb{R}^n, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, (\lambda + \mu).x = \lambda.x + \mu.x$.
- $\forall x \in \mathbb{R}^n, 1.x = x$.
- $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in \mathbb{R}^n, (\lambda\mu).x = \lambda.(\mu.x)$

Démonstration :

- Soient $(x, y) \in (\mathbb{R}^n)^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \lambda.(x + y) &= \lambda.(x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \\ &= (\lambda(x_1 + y_1), \dots, \lambda(x_n + y_n)) \\ &= (\lambda.x_1 + \lambda.y_1, \dots, \lambda.x_n + \lambda.y_n) \\ &= (\lambda.x_1, \dots, \lambda.x_n) + (\lambda.y_1, \dots, \lambda.y_n) \\ &= \lambda.x + \lambda.y \end{aligned}$$

- Idem
- Idem
- Idem

1.3 Stabilité par combinaison linéaire

Définition 6.

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Soit $F = (e_1, \dots, e_p)$ une famille de p vecteurs de $\mathbb{R}^n$.

On appelle combinaison linéaire de la famille F toute somme de la forme

$$\sum_{k=1}^p \lambda_k e_k = \lambda_1.e_1 + \dots + \lambda_p.e_p \text{ avec } \forall k \in \llbracket 1, p \rrbracket, \lambda_k \in \mathbb{R}.$$

Exemple 7 $(1, 1, 1)$ est une combinaison **linéaire** de $(1, 0, 2)$ et de $(0, 1, -1)$.

En effet, $(1, 1, 1) = (1, 0, 2) + (0, 1, -1)$.

Exemple 8 Soit $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$. $(\lambda, \mu, -\lambda + \mu) = \lambda.(1, 0, -1) + \mu.(0, 1, 1)$.

En effet, $(\lambda, \mu, -\lambda + \mu) = (\lambda, 0, -\lambda) + (0, \mu, \mu) = \lambda.(1, 0, -1) + \mu.(0, 1, 1)$.

Théorème 9 (Stabilité par combinaison linéaire).

Toutes les combinaisons linéaires formées à partir de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ sont des vecteurs de $\mathbb{R}^n$.
On dit alors que $\mathbb{R}^n$ est stable par combinaison linéaire.

Démonstration :

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Soit $F = (e_1, \dots, e_p)$ une famille de p vecteurs de $\mathbb{R}^n$. Soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{R}^p$.

$$\sum_{k=1}^p \lambda_k e_k = \lambda_1 \cdot e_1 + \dots + \underbrace{\lambda_{p-1} \cdot e_{p-1}}_{\in \mathbb{R}^n} + \underbrace{\lambda_p \cdot e_p}_{\in \mathbb{R}^n}$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{\in \mathbb{R}^n}$$

Finalement, $\sum_{k=1}^p \lambda_k e_k \in \mathbb{R}^n$. ■

Définition 10.

On dit que le triplet $(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ a une structure d'espace vectoriel.

Remarque 11 On a déjà rencontré des ensembles possédant cette structure.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

2 Structure de sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$

2.1 Partie de $\mathbb{R}^n$ stable par combinaisons linéaires

Définition 12.

Soit $F \subset \mathbb{R}^n$.

On dit que F est stable par combinaisons linéaires lorsque les combinaisons linéaires formées à partir de vecteurs de F sont des vecteurs de F .

Exemple 13 Soit la droite d'équation $2x + 3y = 0$. Montrer qu'elle est stable par combinaison linéaire.

Soit $(e_1 = (x_1, y_1), \dots, e_p = (x_p, y_p))$ des points de la droite. Soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{R}^p$.

Soit $u = \sum_{k=1}^p \lambda_k e_k = \sum_{k=1}^p \lambda_k (x_k, y_k) = \left(\sum_{k=1}^p \lambda_k x_k, \sum_{k=1}^p \lambda_k y_k \right)$. Montrons que u appartient à la droite.

$$2 \sum_{k=1}^p \lambda_k x_k + 3 \sum_{k=1}^p \lambda_k y_k = \sum_{k=1}^p (2\lambda_k x_k + 3\lambda_k y_k) = \sum_{k=1}^p \lambda_k (2x_k + 3y_k) = 0$$

Donc, u appartient à la droite.

Donc, la droite est stable par combinaison linéaire.

2.2 Sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^n$

Définition 14.

Soit $F \subset \mathbb{R}^n$. F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ signifie que

- $0_{\mathbb{R}^n} \in F$
- F est stable par combinaisons linéaires.

Exemple 15 Les droites passant par l'origine dans $\mathbb{R}^2$ ou dans $\mathbb{R}^3$.

Théorème 16.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $F \subset \mathbb{R}^n$. Il y a équivalence entre :

1. F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$.
2. F est non vide et $\forall (x, y) \in F^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \lambda x + \mu y \in F$.

Démonstration : On raisonne par double implication.

1 $\Rightarrow$ 2 : Par définition, F est stable par combinaisons linéaires donc, en particulier, F est stable par combinaisons linéaires de 2 vecteurs.

Par définition, $0_{\mathbb{R}^n} \in F$ donc F est non vide.

2 $\Rightarrow$ 1 : Supposons que F soit non vide et stable par combinaisons linéaires de deux vecteurs.

F est non vide : $\exists x \in F$. Donc, $x + (-1).x \in F$. Donc, $0_{\mathbb{R}^n} \in F$.

Soit $(e_1, \dots, e_p) \in F^p$. Soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{R}^p$.

$$\sum_{k=1}^p \lambda_k e_k = \lambda_1 \cdot e_1 + \dots + \underbrace{\lambda_{p-1} \cdot e_{p-1} + \lambda_p \cdot e_p}_{\in F}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\in F}$

Donc, F est stable par combinaisons linéaires, donc F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$. ■

Exemple 17 Soit $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + 2y + 3z = 0\}$. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

On va appliquer le théorème 4.

- $0 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 = 0$ donc $0_{\mathbb{R}^3} \in F$. Donc, F est non vide.
- On montre la stabilité par combinaison linéaire de deux vecteurs.
Soit $(x, y) \in (\mathbb{R}^3)^2$. $\exists (x_1, x_2, x_3, y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^6$ tel que $x = (x_1, x_2, x_3)$ et $y = (y_1, y_2, y_3)$.
Soit $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$.

$$\lambda_1 \cdot x + \lambda_2 \cdot y = (\lambda_1 \cdot x_1 + \lambda_2 \cdot y_1, \lambda_1 \cdot x_2 + \lambda_2 \cdot y_2, \lambda_1 \cdot x_3 + \lambda_2 \cdot y_3)$$

$$\begin{aligned} \lambda_1 \cdot x_1 + \lambda_2 \cdot y_1 + 2(\lambda_1 \cdot x_2 + \lambda_2 \cdot y_2) + 3(\lambda_1 \cdot x_3 + \lambda_2 \cdot y_3) &= \lambda_1 \cdot x_1 + 2\lambda_1 \cdot x_2 + 3\lambda_1 \cdot x_3 + \lambda_2 \cdot y_1 + 2\lambda_2 \cdot y_2 + 3\lambda_2 \cdot y_3 \\ &= \lambda_1 \underbrace{(x_1 + 2x_2 + 3x_3)}_{=0 \text{ car } x \in F} + \lambda_2 \underbrace{(y_1 + 2y_2 + 3y_3)}_{=0 \text{ car } y \in F} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donc, $\lambda_1 \cdot x + \lambda_2 \cdot y \in F$.

Par le théorème 4, F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

Exemple 18 Soit $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + 2y + 3z = 0 \text{ et } x - y + z = 0\}$. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

- $0 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 = 0$ et $0 - 0 + 0 = 0$ donc $0_{\mathbb{R}^3} \in F$. Donc, F est non vide.

- Soit $(x, y) \in (\mathbb{R}^3)^2$. $\exists (x_1, x_2, x_3, y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^6$ tel que $x = (x_1, x_2, x_3)$ et $y = (y_1, y_2, y_3)$.
Soit $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$.
On a $\lambda_1 \cdot x + \lambda_2 \cdot y = (\lambda_1 \cdot x_1 + \lambda_2 \cdot y_1, \lambda_1 \cdot x_2 + \lambda_2 \cdot y_2, \lambda_1 \cdot x_3 + \lambda_2 \cdot y_3)$.

$$\begin{aligned} \lambda_1 \cdot x_1 + \lambda_2 \cdot y_1 + 2(\lambda_1 \cdot x_2 + \lambda_2 \cdot y_2) + 3(\lambda_1 \cdot x_3 + \lambda_2 \cdot y_3) &= \lambda_1 \cdot x_1 + 2\lambda_1 \cdot x_2 + 3\lambda_1 \cdot x_3 + \lambda_2 \cdot y_1 + 2\lambda_2 \cdot y_2 + 3\lambda_2 \cdot y_3 \\ &= \lambda_1 \underbrace{(x_1 + 2x_2 + 3x_3)}_{=0 \text{ car } x \in F} + \lambda_2 \underbrace{(y_1 + 2y_2 + 3y_3)}_{=0 \text{ car } y \in F} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lambda_1 \cdot x_1 + \lambda_2 \cdot y_1 - (\lambda_1 \cdot x_2 + \lambda_2 \cdot y_2) + (\lambda_1 \cdot x_3 + \lambda_2 \cdot y_3) &= \lambda_1 \underbrace{(x_1 - x_2 + x_3)}_{=0 \text{ car } x \in F} + \lambda_2 \underbrace{(y_1 - y_2 + y_3)}_{=0 \text{ car } y \in F} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donc, $\lambda_1 \cdot x + \lambda_2 \cdot y \in F$.

Par le théorème 4, F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

2.3 Sous-espaces vectoriels engendrés par des vecteurs

Définition 19.

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Soit $\mathcal{F} = (e_1, \dots, e_p)$ une famille finie de vecteurs de $\mathbb{R}^n$.

On appelle espace vectoriel engendré par la famille $\mathcal{F}$, et on note $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$, l'ensemble

$$\text{Vect}(e_1, \dots, e_p) = \left\{ \sum_{i=1}^p \alpha_i \cdot e_i, \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \alpha_i \in \mathbb{R} \right\}$$

C'est l'ensemble contenant toutes les combinaisons linéaires des vecteurs de $\mathcal{F}$.

Exemple 20 Déterminer $\text{Vect}((1, 0, -1), (0, 1, 1))$.

$$\text{Vect}((1, 0, -1), (0, 1, 1)) = \{ \lambda_1(1, 0, -1) + \lambda_2(0, 1, 1), (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2 \} = \{ (\lambda_1 + \lambda_2, \lambda_2, -\lambda_1 + \lambda_2), (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2 \}$$

Théorème 21.

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Soit $\mathcal{F} = (e_1, \dots, e_p)$ une famille finie de vecteurs de $\mathbb{R}^n$.

$\text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$.

Démonstration : Notons $F = \left\{ \sum_{i=1}^p \alpha_i \cdot e_i, \forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \alpha_i \in \mathbb{R} \right\}$. On va appliquer le théorème 4.

- $0_{\mathbb{R}^n} = \sum_{i=1}^p 0 \cdot e_i$ donc $0_{\mathbb{R}^n} \in F$.

- Soit $(x, y) \in F^2$. Donc, $\exists (\alpha_1, \dots, \alpha_p, \beta_1, \dots, \beta_p) \in \mathbb{R}^{2p}$ tel que $x = \sum_{i=1}^p \alpha_i \cdot e_i$ et $y = \sum_{i=1}^p \beta_i \cdot e_i$.

Soit $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$.

$$\lambda_1 x + \lambda_2 y = \lambda_1 \sum_{i=1}^p \alpha_i \cdot e_i + \lambda_2 \cdot \sum_{i=1}^p \beta_i \cdot e_i = \sum_{i=1}^p \underbrace{(\lambda_1 \cdot \alpha_i + \lambda_2 \cdot \beta_i)}_{\in \mathbb{R}} \cdot e_i$$

donc $\lambda_1 x + \lambda_2 y \in F$.

Par le théorème 4, F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$. ■

Exemple 22 Montrer que $\{(x, y, -x), (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

On va l'écrire sous forme de sous-espace vectoriel engendré par une famille.

$$\{(x, y, -x), (x, y) \in \mathbb{R}^2\} = \{x(1, 0, -1) + y(0, 1, 0), (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$$

Donc, $\{(x, y, -x), (x, y) \in \mathbb{R}^2\} = \text{Vect}((1, 0, -1), (0, 1, 0))$. Donc, c'est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

2.4 Intersection de sous-espaces vectoriels

Théorème 23 (Intersection de deux sous-espaces vectoriels).

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^n$.
Alors, $F \cap G$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$.

Démonstration : Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^n$.

- $F \cap G \subset \mathbb{R}^n$.
- Par la définition 9, $0_{\mathbb{R}^n} \in F$ et $0_{\mathbb{R}^n} \in G$ donc $0_{\mathbb{R}^n} \in F \cap G$. Donc $F \cap G$ est non vide.
- Soit $(x, y) \in (F \cap G)^2$. Soit $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$.
 $(x, y) \in F^2$ donc, par la définition 9, $\lambda_1 x + \lambda_2 y \in F$. De même, $\lambda_1 x + \lambda_2 y \in G$.
Donc, $\lambda_1 x + \lambda_2 y \in F \cap G$.

Par le théorème 4, $F \cap G$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$. ■

Exemple 24 L'intersection de deux plans de $\mathbb{R}^3$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

Théorème 25 (Intersection d'un nombre fini de sous-espaces vectoriels).

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Soient $F_1, \dots, F_p$ des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^n$.
Alors, $\bigcap_{k=1}^p F_k$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$.

Démonstration : C'est une généralisation du théorème 6.

On le démontre par récurrence. ■

Remarque 26 En général, l'union de deux sous-espaces vectoriels n'est pas un sous-espace vectoriel.

Soient $F = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$ et $G = \{(x, x) \mid x \in \mathbb{R}\}$.

1. Représenter (rapidement) $F \cup G$.

2. Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$ mais que $F \cup G$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$. Représenter graphiquement le résultat.

$F = \{x(1, 0) \mid x \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, 0))$ donc c'est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

$G = \{x(1, 1) \mid x \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, 1))$ donc c'est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

On va montrer que $F \cup G$ n'est pas stable par addition.

Soit $u = (1, 1)$. Soit $v = (1, 0)$. On a bien $(u, v) \in (F \cup G)^2$.

Or, $u + v = (2, 1) \notin F \cup G$. Donc, $F \cup G$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

3 Familles de vecteurs dans un espace vectoriel

3.1 Familles génératrices d'un sous-espace vectoriel

Définition 27.

Soit F un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$. Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une famille finie de F .
On dit que la famille $(e_1, \dots, e_p)$ est génératrice de F lorsque $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p) = F$.

Tout vecteur de F est une combinaison linéaire de la famille $(e_1, \dots, e_p)$.

$$\forall x \in F, \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p \text{ tel que } x = \sum_{k=1}^p \lambda_k \cdot e_k$$

Exemple 28 La famille $((1, 0), (0, 1))$ est génératrice de $\mathbb{R}^2$.

$$x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \Leftrightarrow x = x_1(1, 0) + x_2(0, 1) \text{ donc } \mathbb{R}^2 = \text{Vect}((1, 0), (0, 1)).$$

Exemple 29 La famille $((1, 0), (1, 1))$ est génératrice de $\mathbb{R}^2$.

$$x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \Leftrightarrow x = (x_1 - x_2)(1, 0) + x_2(1, 1) \text{ donc } \mathbb{R}^2 = \text{Vect}((1, 0), (1, 1)).$$

Exemple 30 La famille $(e_1 = (\underbrace{1, 0, \dots, 0}_{n-1}), e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (\underbrace{0, \dots, 0}_{n-1}, 1))$ est génératrice de $\mathbb{R}^n$.

Exemple 31 La famille $\mathcal{D} = ((1, 1, 1), (0, 1, 1))$ n'est pas génératrice de $\mathbb{R}^3$.

On va proposer un vecteur de $\mathbb{R}^3$ qui ne s'écrit pas comme combinaisons linéaire de $(1, 1, 1)$ et de $(0, 1, 1)$.
On suppose par l'absurde que $\mathbb{R}^3 = \text{Vect}((1, 1, 1), (0, 1, 1))$.

$$(0, 0, 1) \in \mathbb{R}^3 \text{ donc } \exists (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2 \text{ tel que } (0, 0, 1) = \lambda_1(1, 1, 1) + \lambda_2(0, 1, 1) \Rightarrow \begin{cases} 0 = \lambda_1 \\ 0 = \lambda_1 + \lambda_2 \\ 1 = \lambda_1 + \lambda_2 \end{cases} \text{ Absurde}$$

Donc, la famille $((1, 1, 1), (0, 1, 1))$ n'est pas génératrice de $\mathbb{R}^3$.

Exemple 32 Soit le système $\begin{cases} x + 2y - 4z = 0 \\ x - y + t = 0 \end{cases}$.

Notons F l'ensemble des solutions de ce système. Déterminer une famille génératrice de F .

On va l'écrire sous forme de sous espace -vectoriel engendré par une famille.

$$\begin{cases} x + 2y - 4z = 0 \\ x - y + t = 0 \end{cases} \xLeftrightarrow_{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} x + 2y - 4z = 0 \\ -3y + t + 4z = 0 \end{cases} \xLeftrightarrow_{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} x = 2y + 4z = \frac{-2t + 4z}{3} \\ y = \frac{-t - 4z}{3} \end{cases}$$

Donc, $F = \left\{ \left(\frac{-2t+4z}{3}, \frac{-t-4z}{3}, z, t \right), (z, t) \in \mathbb{R}^2 \right\} = \left\{ t \left(\frac{-2}{3}, \frac{-1}{3}, 0, 1 \right) + z \left(\frac{4}{3}, \frac{-4}{3}, 1, 0 \right), (z, t) \in \mathbb{R}^2 \right\}$.

Donc, $F = \text{Vect} \left(\left(\frac{-2}{3}, \frac{-1}{3}, 0, 1 \right), \left(\frac{4}{3}, \frac{-4}{3}, 1, 0 \right) \right)$.

La famille $\left(\left(\frac{-2}{3}, \frac{-1}{3}, 0, 1 \right), \left(\frac{4}{3}, \frac{-4}{3}, 1, 0 \right) \right)$ est génératrice de F .

3.2 Familles liées, familles libres

Remarque 33 Exprimer plus simplement $\text{Vect}((1, 1, 1), (-2, -2, -2))$ puis $\text{Vect}((1, 1, 1), (1, 2, 3), (0, -1, -2))$.

$\text{Vect}((1, 1, 1), (-2, -2, -2)) = \{ \lambda_1 \cdot (1, 1, 1) + \lambda_2 \cdot (-2, -2, -2), (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2 \}$

$= \{ (\lambda_1 - 2\lambda_2, \lambda_1 - 2\lambda_2, \lambda_1 - 2\lambda_2), (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2 \} = \{ (\lambda_1 - 2\lambda_2)(1, 1, 1), (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2 \} = \text{Vect}((1, 1, 1))$.

Définition 34.

Soit F un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$. Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une famille finie de F .

- On dit que la famille $(e_1, \dots, e_p)$ est liée lorsque un des vecteurs de la famille peut s'exprimer comme combinaison linéaire des autres.
- On dit que la famille $(e_1, \dots, e_p)$ est libre lorsqu'elle n'est pas liée.

Exemple 35 Dans $\mathbb{R}^3$, on pose $u = (2, 3, 5)$, $v = (3, 4, 0)$ et $w = (5, 7, 5)$.

Montrer que la famille (u, v, w) est liée.

On remarque que $w = u + v$ donc la famille est liée.

Théorème 36 (Caractérisation d'une famille liée).

Soit F un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$. Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une famille finie de F .

On a équivalence entre

1. La famille $(e_1, \dots, e_p)$ est liée.
2. $\exists (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p$, $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \neq (0, \dots, 0)$ tel que $\sum_{k=1}^p \lambda_k \cdot e_k = 0_E$.

Démonstration : On raisonne par double implication.

1 $\Rightarrow$ 2 : On suppose que la famille est liée.

Donc, $\exists i_0 \in \llbracket 1; p \rrbracket$, $\exists (\lambda_1, \dots, \lambda_{i_0-1}, \lambda_{i_0+1}, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{R}^{p-1}$ tel que $e_{i_0} = \sum_{k \neq i_0} \lambda_k \cdot e_k$.

Donc, $\sum_{k=1}^{i_0-1} \lambda_k \cdot e_k - e_{i_0} + \sum_{k=i_0+1}^p \lambda_k \cdot e_k = 0$.

La proposition 2 est vraie avec $(\lambda_1, \dots, \lambda_{i_0-1}, -1, \lambda_{i_0+1}, \dots, \lambda_p)$.

2 $\Rightarrow$ 1 : On suppose qu'il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p$, $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \neq (0, \dots, 0)$ tel que $\sum_{k=1}^p \lambda_k \cdot e_k = 0$.

$(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \neq (0, \dots, 0) \Rightarrow \exists i_0 \in \llbracket 1; p \rrbracket$, $\lambda_{i_0} \neq 0$.

Donc, $\lambda_{i_0} e_{i_0} = - \sum_{k \neq i_0} \lambda_k \cdot e_k$. Donc, $e_{i_0} = \sum_{k \neq i_0} \frac{-\lambda_k}{\lambda_{i_0}} \cdot e_k$.

Donc, la famille est liée. ■

Remarque 37 Pour montrer qu'une famille est liée, on doit déterminer les scalaires $(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$.

On raisonnera souvent par analyse et synthèse.

Théorème 38 (Caractérisation d'une famille libre).

Soit F un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$. Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une famille finie de F .
On a équivalence entre

1. La famille $(e_1, \dots, e_p)$ est libre.
2. $\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p, \sum_{k=1}^p \lambda_k \cdot e_k = 0_E \Rightarrow \forall k \in \llbracket 1; p \rrbracket, \lambda_k = 0$.

Démonstration : C'est la négation du théorème précédent. ■

Exemple 39 Dans $\mathbb{R}^3$, on note $u = (1, 2, 3)$, $v = (3, 1, 2)$ et $w = (2, 3, 1)$.
Montrer que (u, v, w) est une famille libre de $\mathbb{R}^3$.

On va appliquer la caractérisation de la liberté (théorème 10).
Soit $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \in \mathbb{R}^3$ tel que $\lambda_1 \cdot u + \lambda_2 \cdot v + \lambda_3 \cdot w = 0_{\mathbb{R}^3}$.

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 + 3\lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_1 + \lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \\ 3\lambda_1 + 2\lambda_2 + \lambda_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 + 3\lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ -5\lambda_2 - \lambda_3 = 0 \\ -7\lambda_2 - 5\lambda_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 + 3\lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ -5\lambda_2 - \lambda_3 = 0 \\ 18\lambda_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \end{cases}$$

La famille (u, v, w) est donc libre.

Exemple 40 Soient $u = (0, 2, 3)$ et $v = (1, 0, 3)$. Montrer que (u, v) est une famille libre de $\mathbb{R}^3$.

Les vecteurs ne sont pas colinéaires donc ils forment une famille libre de $\mathbb{R}^3$.

3.3 Bases d'un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$

Définition 41.

Soit F un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$. Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une famille finie de F .
On dit que la famille $(e_1, \dots, e_p)$ est une base de F lorsque elle est libre et génératrice de F .

Exemple 42 La famille $((1, 0), (0, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^2$. C'est *la base canonique* de $\mathbb{R}^2$.

On a déjà montré qu'elle était génératrice de $\mathbb{R}^2$.
Soit $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\lambda_1(1, 0) + \lambda_2(0, 1) = (0, 0)$.
 $\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0$. Donc la famille est libre. C'est une base de $\mathbb{R}^2$.

Exemple 43 La famille $((1, 0), (1, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^2$.

On a déjà montré qu'elle était génératrice de $\mathbb{R}^2$.
Soit $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\lambda_1(1, 0) + \lambda_2(1, 1) = (0, 0)$.
 $\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0$. Donc la famille est libre. C'est une base de $\mathbb{R}^2$.

Théorème 44 (Existence de bases, ADMIS).

Tous les sous-espaces vectoriels non vides de $\mathbb{R}^n$ admettent des bases.

Exemple 45 Soit $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x + y + z + t = 0\}$.
Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ et en déterminer une base.

On va l'écrire comme un sous-espace vectoriel engendré par une famille.

$$F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x = -y - z - t\} = \{(-y - z - t, y, z, t), (y, z, t) \in \mathbb{R}^3\}.$$

Donc, $F = \text{Vect}((-1, 1, 0, 0), (-1, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 1))$.

C'est bien un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ et la famille $((-1, 1, 0, 0), (-1, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 1))$ est une famille génératrice de F .

Montrons qu'elle est libre.

Soit $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \in \mathbb{R}^3$ tel que $\lambda_1(-1, 1, 0, 0) + \lambda_2(-1, 0, 1, 0) + \lambda_3(-1, 0, 0, 1) = (0, 0, 0, 0)$.

$$\Rightarrow \begin{cases} -\lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0.$$

Donc la famille est libre. C'est une base de F .

Théorème 46.

Soit F un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$. Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une base de F .

$$\forall x \in F, \exists ! (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p \text{ tel que } x = \sum_{k=1}^p \lambda_k \cdot e_k$$

Démonstration : Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une base de E . Soit $x \in E$.

- **Existence :** La famille $(e_1, \dots, e_p)$ est une base de E . En particulier, elle est génératrice de E .

Donc, $\exists (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{R}^p$ tel que $x = \sum_{k=1}^p \lambda_k \cdot e_k$.

- **Unicité :** Soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_p, \beta_1, \dots, \beta_p) \in \mathbb{R}^{2p}$ tel que $x = \sum_{k=1}^p \lambda_k \cdot e_k = \sum_{k=1}^p \beta_k \cdot e_k$.

$\Rightarrow \sum_{k=1}^p (\lambda_k - \beta_k) \cdot e_k = 0_E$. Or, la famille $(e_1, \dots, e_p)$ est libre.

Donc, $\forall k \in [1; p]$, $\lambda_k - \beta_k = 0$.

Donc, $\forall k \in [1; p]$, $\lambda_k = \beta_k$.

Il y a bien unicité de l'écriture. ■

Remarque 47 génératrice $\rightarrow$ existence et libre $\rightarrow$ unicité.

Définition 48.

Soit F un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$. Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de F .

On appelle coordonnées de $x \in F$ dans la base $(e_1, \dots, e_p)$ les **uniques** coefficients $(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$

tels que $x = \sum_{k=1}^p \lambda_k \cdot e_k$.

On appelle matrice de x dans la base $\mathcal{B}$ la matrice suivante :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x) = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_p \end{pmatrix}.$$

Remarque 49 Cela étend la définition de coordonnées rencontrée pour les vecteurs de $\mathbb{R}^2$.

Remarque 50 Soit $\mathcal{B} = ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Au lieu d'écrire "soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ ", on devrait écrire "soit u un vecteur de $\mathbb{R}^3$ dont les coordonnées dans la base canonique sont (x, y, z) ".

Exemple 51 Soit $\mathcal{B} = ((1, 0, 1), (1, 1, 0), (0, 0, 1))$. Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et déterminer les coordonnées dans cette base d'un vecteur (a, b, c) de $\mathbb{R}^3$.

Soit $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \in \mathbb{R}^3$ tel que $\lambda_1(1, 0, 1) + \lambda_2(1, 1, 0) + \lambda_3(0, 0, 1) = (0, 0, 0)$.

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0.$$

Donc la famille est libre.

On va raisonner par analyse-synthèse pour montrer qu'elle est génératrice. Soit $x = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.

A : Supposons qu'il existe $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \in \mathbb{R}^3$ tel que $\lambda_1(1, 0, 1) + \lambda_2(1, 1, 0) + \lambda_3(0, 0, 1) = (a, b, c)$.

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = a \\ \lambda_2 = b \\ \lambda_1 + \lambda_3 = c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = a - b \\ \lambda_2 = b \\ \lambda_3 = c - a + b \end{cases}$$

S : On va vérifier que ça convient bien.

$$(a - b)(1, 0, 1) + b(1, 1, 0) + (c - a + b)(0, 0, 1) = (a - b + b, b, a - b + c - a + b) = (a, b, c)$$

La famille est libre et génératrice de $\mathbb{R}^3$ donc c'est une base de $\mathbb{R}^3$.

Les coordonnées de $x = (a, b, c)$ dans cette base sont $(a - b, b, c - a + b)$.

4 Espaces vectoriels (HP en première année)

Définition 52.

On appelle espace vectoriel sur $\mathbb{K}$, noté $\mathbb{K}\text{-ev}$, un triplet $(E, +, \times)$ où

1. E est un ensemble,
2. La loi $+$: $E \times E \mapsto E$ est une loi de composition interne telle que :
 - (a) $\forall (x, y) \in E^2, x + y = y + x.$
 - (b) $\forall (x, y, z) \in E^3, (x + y) + z = x + (y + z).$
 - (c) $\exists 0_E \in E$ tel que $\forall x \in E, x + 0_E = x.$
 - (d) $\forall x \in E, \exists y \in E$ tel que $x + y = y + x = 0_E.$
3. La loi $\cdot$: $\mathbb{K} \times E \mapsto E$ est une loi de composition externe telle que :
 - (a) $\forall (x, y) \in E^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda.(x + y) = \lambda.x + \lambda.y$
 - (b) $\forall x \in E, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, (\lambda + \mu).x = \lambda.x + \mu.x.$
 - (c) $\forall x \in E, 1_{\mathbb{K}}.x = x.$
 - (d) $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall x \in E, (\lambda \times \mu).x = \lambda.(\mu.x)$

Les éléments de E sont appelés des vecteurs. Les éléments de $\mathbb{K}$ sont appelés des scalaires.

Exemple 53

1. $\mathbb{C}$ est un espace vectoriel.
L'addition et la multiplication externe sont celles définies dans le chapitre "Complexes".
2. $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, l'ensemble des matrices de taille $n \times p$ à coefficients dans $\mathbb{K}$ est un espace vectoriel.
L'addition et la multiplication externe sont celles définies dans le chapitre "Matrices".
L'élément neutre est la matrice nulle.
3. L'ensemble $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ des fonctions définies sur I à valeurs dans $\mathbb{R}$ est un espace vectoriel.
L'élément neutre est la fonction constante égale à 0.
4. L'ensemble $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ des suites à valeurs dans $\mathbb{K}$ est un espace vectoriel.
5. $\mathbb{K}[\mathbf{X}]$, l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ est un espace vectoriel.

Définition 54.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit $F \subset E$. F est un sous-espace vectoriel de E signifie que

- $0_{\mathbb{R}^n} \in F$
- F est stable par combinaisons linéaires (**de deux ou de p vecteurs de F**).

Exemple 55 Etudier les ensembles suivants.

1. $F = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) / M \text{ soit diagonale}\}.$
 - La matrice nulle est diagonale donc $0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{R})} \in F.$
 - Soit $(D_1, D_2) \in F^2$. Soit $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2.$

$$\lambda_1 D_1 + \lambda_2 D_2 = \lambda_1 \cdot \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix} + \lambda_2 \cdot \begin{pmatrix} b_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & b_n \end{pmatrix} = \lambda_1 \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1 a_1 + \lambda_2 b_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_1 a_n + \lambda_2 b_n \end{pmatrix}$$

La matrice $\lambda_1 D_1 + \lambda_2 D_2$ est encore diagonale donc $\lambda_1 D_1 + \lambda_2 D_2 \in F.$

Donc, l'ensemble des matrices diagonales est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$

2. $F = \{y \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) / ay'' + by' + cy = 0\}.$

- La fonction identiquement nulle est solution de cette EDL donc $0_{\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})} \in F$.
- Soit $(y_1, y_2) \in F^2$. Soit $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned} a(\lambda_1 \cdot y_1 + \lambda_2 \cdot y_2)'' + b(\lambda_1 \cdot y_1 + \lambda_2 \cdot y_2)' + c(\lambda_1 \cdot y_1 + \lambda_2 \cdot y_2) &= \lambda_1 \underbrace{(ay_1'' + by_1' + cy_1)}_{=0 \text{ car } y_1 \in F} + \lambda_2 \underbrace{(ay_2'' + by_2' + cy_2)}_{=0 \text{ car } y_2 \in F} \\ &= 0 \end{aligned}$$

La fonction $\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2$ est solution de l'EDL donc $\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 \in F$.

Donc, l'ensemble des solutions est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

3. $F = \mathbb{K}_n[\mathbf{X}]$. On va montrer que c'est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[\mathbf{X}]$.

- Le polynôme nul est de degré $-\infty$ donc $0_{\mathbb{R}[\mathbf{X}]} \in \mathbb{R}_n[\mathbf{X}]$.
- Soit $(P, Q) \in \mathbb{R}_n[\mathbf{X}]^2$. Soit $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$.

$$\deg(\lambda_1 P + \lambda_2 Q) \leq \max(\deg(\lambda_1 P), \deg(\lambda_2 Q)) \leq n$$

Donc, $\lambda_1 P + \lambda_2 Q \in \mathbb{R}_n[\mathbf{X}]$.

Donc, $\mathbb{R}_n[\mathbf{X}]$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[\mathbf{X}]$.

4. $F = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} / \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 2u_{n+1} + 3u_n\}$. On va montrer que c'est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

- La suite constante égale à 0 vérifie la relation donc $0_{\mathbb{R}^{\mathbb{N}}} \in F$.
- Soit $(u, v) \in F^2$. Soit $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}, (\lambda_1 \cdot u + \lambda_2 \cdot v)_{n+2} &= \lambda_1 \cdot u_{n+2} + \lambda_2 \cdot v_{n+2} \\ &= \lambda_1(2u_{n+1} + 3u_n) + \lambda_2(2v_{n+1} + 3v_n) \\ &= 2(\lambda_1 u_{n+1} + \lambda_2 v_{n+1}) + 3(\lambda_1 u_n + \lambda_2 v_n) \\ &= 2(\lambda_1 \cdot u + \lambda_2 \cdot v)_{n+1} + 3(\lambda_1 \cdot u + \lambda_2 \cdot v)_n \end{aligned}$$

Donc, $\lambda_1 u + \lambda_2 v \in F$.

Donc, F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Remarque 56 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Un sous-espace vectoriel E est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.