

Chapitre 2 : Nombres réels

Table des matières

1	Identités remarquables	2
2	Manipulation d'inégalités	2
3	Résolutions d'équations et d'inéquations	3
4	Fonctions puissances et racines	5
4.1	Fonctions puissances	5
4.2	Racines carrées	5
5	Valeur absolue	6
5.1	Définition	6
5.2	Equations et inéquations avec la valeur absolue	6
5.3	Inégalités triangulaires	7
6	Partie entière	7
7	Intervalles	8

1 Identités remarquables

Théorème 1.

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ (a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\ a^2 - b^2 &= (a+b)(a-b) \\ (a+b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\ a^3 - b^3 &= (a-b)(a^2 + ab + b^2)\end{aligned}$$

Démonstration : Pour chacune des expressions, on développe le produit et on obtient l'autre expression. ■

Exemple 2. Montrer que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, xy \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$.

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

$$xy \leq \frac{x^2 + y^2}{2} \Leftrightarrow 2xy \leq x^2 + y^2 \Leftrightarrow 0 \leq x^2 - 2xy + y^2 \Leftrightarrow 0 \leq (x - y)^2$$

La dernière inégalité est vraie donc la première aussi.

Exemple 3. Soit $a \in \mathbb{R}$. Factoriser $a^3 + 1$.

Soit $a \in \mathbb{R}$.

$$a^3 + 1 = a^3 - (-1)^3 = (a - (-1))(a^2 - a + (-1)^2) = (a + 1)(a^2 - a + 1)$$

2 Manipulation d'inégalités

Théorème 4.

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

1. Additionner ou soustraire la même quantité aux deux membres d'une inégalité conserve le sens de l'inégalité.

$$\forall z \in \mathbb{R}, x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$$

2. Multiplier une inégalité par une quantité strictement positive conserve le sens de l'inégalité

$$\forall z \in \mathbb{R}_+, x \leq y \Rightarrow xz \leq yz$$


3. Multiplier une inégalité par une quantité strictement négative change le sens de l'inégalité

$$\forall z \in \mathbb{R}_-, x \leq y \Rightarrow xz \geq yz$$

Théorème 5.

Soit $(x, y) \in (\mathbb{R}^*)^2$ deux réels non nuls.

- Si $0 < x < y$ alors $0 < \frac{1}{y} < \frac{1}{x}$.
- Si $x < y < 0$ alors $\frac{1}{y} < \frac{1}{x} < 0$.
- Si $x < 0 < y$ alors $\frac{1}{x} < 0 < \frac{1}{y}$.

**Théorème 6.**

Soit $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$.

1. On peut ajouter membre à membre deux inégalités de même sens.

$$x \leq y \text{ et } z \leq t \Rightarrow x + z \leq y + t$$

2. On peut multiplier membre à membre deux inégalités de même sens **si tous les termes sont positifs**.

$$0 \leq x \leq y \text{ et } 0 \leq z \leq t \Rightarrow xz \leq yt$$

Démonstration :

1. Soit $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$ tel que $x \leq y$ et $z \leq t$.
 $\Rightarrow x + z \leq y + z$ et $y + z \leq y + t$.
 $\Rightarrow x + z \leq y + t$ par transitivité.
2. Soit $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$ tel que $0 \leq x \leq y$ et $0 \leq z \leq t$.
 $\Rightarrow xz \leq yz$ et $yz \leq yt$.
 $\Rightarrow xz \leq yt$ par transitivité. ■

3 Résolutions d'équations et d'inéquations**Théorème 7.**

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ avec $a \neq 0$. On note (E) l'équation $ax^2 + bx + c = 0$.

1. (a) Si $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$ alors l'équation admet 2 solutions réelles.

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ et } x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- (b) Si $\Delta < 0$ alors il n'y a aucune solution réelle.

Soit $f : x \mapsto ax^2 + bx + c$.

2. La courbe de f est une parabole dont le maximum est atteint en $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
3. Le signe de f est celui de $-a$ entre les racines et celui de a à l'extérieur des racines.

Démonstration :

On utilise la forme factorisée de l'expression $ax^2 + bx + c$.

$$ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right) = a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right) = a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right)$$

1. (a) Si $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ alors $-\frac{b^2 - 4ac}{4a^2} > 0$ donc $\left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right) > 0$.

Le polynôme ne s'annule jamais.

- (b) Si $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$ alors $\frac{b^2 - 4ac}{4a^2} = \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right)^2$ donc

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right) = a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right)^2 \right) \\ &= a \left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right) \left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right) \\ &= a \left(x - \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \right) \left(x - \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \right) \end{aligned}$$

Les solutions de $ax^2 + bx + c = 0$ sont donc $x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$.

2. Le maximum est atteint là où la dérivée s'annule.

3. On repart de la forme factorisée.

$$f(x) = ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Si $x \in [x_1; x_2]$ alors $x - x_1 \geq 0$ et $x - x_2 \leq 0$ donc $f(x)$ est du signe de $-a$.

Sinon, $(x - x_1)(x - x_2) \geq 0$ donc $f(x)$ est du signe de a . ■

Exemple 8. Résoudre l'inéquation $-x^2 + 4x < 4$.

Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$-x^2 + 4x < 4 \Leftrightarrow -x^2 + 4x - 4 < 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 4 > 0 \Leftrightarrow (x - 2)^0 > 0$$

Donc l'inégalité est tout le temps vraie.

Exemple 9. Résoudre l'inéquation $\frac{3}{x} \leq x + 2$.

Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$.

$$\frac{3}{x} \leq x + 2 \Leftrightarrow 3 \leq x(x + 2) \Leftrightarrow 0 \leq x^2 + 2x - 3 \Leftrightarrow 0 \leq (x - 1)(x + 3)$$

Or, le polynôme $x^2 + 2x - 3$ est positif en dehors des racines donc

$$\frac{3}{x} \leq x + 2 \text{ ET } x > 0 \Leftrightarrow x \in [1; +\infty[$$

Soit $x \in \mathbb{R}_-^*$.

$$\frac{3}{x} \leq x + 2 \Leftrightarrow 3 \geq x(x + 2) \Leftrightarrow 0 \geq x^2 + 2x - 3 \Leftrightarrow 0 \geq (x - 1)(x + 3)$$

Or, le polynôme $x^2 + 2x - 3$ est négatif en dehors des racines donc

$$\frac{3}{x} \leq x + 2 \text{ ET } x < 0 \Leftrightarrow x \in [-3; 0]$$

Finalement, $S = [-3; 0] \cup [1; +\infty[$

Exemple 10. On considère la droite \mathcal{D} d'équation $y = \frac{1}{2}x + 1$ et la parabole \mathcal{P} d'équation $y = x^2 - \frac{3}{2}x - 1$. Déterminer le point d'intersection de \mathcal{D} et de \mathcal{P} .

Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}x + 1 = x^2 - \frac{3}{2}x - 1 &\Leftrightarrow 0 = x^2 - x - 1 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{2 + \sqrt{12}}{2} \text{ ou } x = \frac{2 - \sqrt{12}}{2} \end{aligned}$$

Donc $S = \{1 + \sqrt{3}, 1 - \sqrt{3}\}$.

4 Fonctions puissances et racines

4.1 Fonctions puissances

Définition 11.

Soit $x \in \mathbb{R}^*$. Soit $n \in \mathbb{Z}$.

Pour n positif, on appelle puissance n -ième de x le réel $x^n = \underbrace{x \times \cdots \times x}_{n \text{ fois}} = \prod_{k=1}^n x$.

Pour n négatif, on appelle puissance n -ième de x le réel $x^n = \frac{1}{x^{-n}}$.

Théorème 12 (Règles de calculs).

Soient $(x, y) \in (\mathbb{R}^*)^2$ et $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$.

$$(xy)^n = x^n y^n, \quad x^{n+m} = x^m \cdot x^n, \quad (x^n)^m = x^{nm}$$

4.2 Racines carrées

Définition 13.

Soit $x \in \mathbb{R}_+$.

On appelle racine carrée de x l'unique réel **positif** a tel que $a^2 = x$.

On note $a = \sqrt{x}$.

Théorème 14 (Règles de calculs).

Soient $(x, y) \in (\mathbb{R}_+)^2$.

$$\sqrt{xy} = \sqrt{x}\sqrt{y}, \quad \sqrt{x^2} = |x|$$

5 Valeur absolue


5.1 Définition

Définition 15.

Soit $x \in \mathbb{R}$.

On appelle la valeur absolue de x le nombre réel, noté $|x|$, défini par

$$|x| = \max\{x, -x\} = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$



Théorème 16.

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Soit $n \in \mathbb{N}$.

1. **Positivité** : $|x| \geq 0$.
2. **Compatibilité avec le produit** : $|xy| = |x||y|$ et $|x^n| = |x|^n$.
3. **Compatibilité avec le quotient** : Si $y \neq 0$ alors $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$.


Remarque 17. Soit $x \in \mathbb{R}$. Le réel $|x|$ représente la distance entre x et 0.

5.2 Equations et inéquations avec la valeur absolue

Théorème 18.

Soit $(x, a, b) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^*$.


1. $|x| = b \Leftrightarrow x = b$ ou $x = -b$.
2. $|x - a| = b \Leftrightarrow x = a + b$ ou $x = a - b$.



Théorème 19.

Soit $(x, a, b) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^*$.

1. $|x| \leq b \Leftrightarrow -b \leq x \leq b$.
2. $|x - a| \leq b \Leftrightarrow a - b \leq x \leq a + b$.



5.3 Inégalités triangulaires

Théorème 20 (Inégalité triangulaire).

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

Démonstration : Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned} (|x + y|)^2 &= (x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 = |x|^2 + 2xy + |y|^2 \\ (|x| + |y|)^2 &= |x|^2 + 2|x||y| + |y|^2 = |x|^2 + 2|xy| + |y|^2 \end{aligned}$$

Or, $xy \leq |xy|$ donc $(|x + y|)^2 \leq (|x| + |y|)^2$.

Par passage à la racine carrée, on retrouve l'inégalité souhaitée. ■

Théorème 21.

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

$$||x| - |y|| \leq |x + y| \leq |x| + |y|$$

Démonstration : Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned} |x| = |x + y - y| &\leq |x + y| + |-y| \\ &\leq |x + y| + |y| \\ |x| - |y| &\leq |x + y| \end{aligned}$$

De même,

$$\begin{aligned} |y| = |y + x - x| &\leq |y + x| + |-x| \\ &\leq |x + y| + |x| \\ |y| - |x| &\leq |x + y| \end{aligned}$$

Finalement, $||x| - |y|| \leq |x + y|$. ■

6 Partie entière

Définition 22.

Soit x un nombre réel. On appelle partie entière de x le plus grand entier inférieur ou égal à x .
On la note $\lfloor x \rfloor$.


$$\lfloor x \rfloor = \max \{n \in \mathbb{N}, n \leq x\}$$

Exemple 23. $E(e) = 2$, $E(-\pi) = -4$.

Théorème 24.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$$



Remarque 25. La fonction partie entière est définie sur \mathbb{R} à valeurs dans \mathbb{Z} . Elle est croissante sur \mathbb{R} .

Théorème 26.

Soient $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{Z}$.

1. $x \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = [x]$.
2. $[x + n] = [x] + n$.

Remarque 27. Le deuxième point est faux dans le cas général.

7 Intervalles

Définition 28.

Un intervalle de \mathbb{R} a une des formes suivantes pour un couple $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

- L'ensemble vide : \emptyset
- Un segment : $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$
- Un intervalle borné, semi-ouvert : $]a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ ou $]a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$
- Un intervalle borné, ouvert : $]a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$
- Un intervalle semi-ouvert, non borné : $[a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\}$ ou $] -\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$
- Un intervalle ouvert non borné : $]a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\}$ ou $] -\infty, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$
- $\mathbb{R} =] -\infty, +\infty[$

Les réels a et b sont appelés les bornes de l'intervalle.

Remarque 29.

1. Chaque intervalle est associé à une ou deux inégalités.
2. Les bornes n'appartiennent pas toujours à l'intervalle.

Définition 30 (Hors-programme).

Soit I une partie de \mathbb{R} .

On dit que I est un intervalle de \mathbb{R} lorsque I est l'ensemble vide ou lorsque

$$\forall (x, y) \in I^2, x \leq y \Rightarrow [x, y] \subset I$$