

Exercice 1

1. Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue dont le tableau de variations est le suivant :

x	0	1	6	$+\infty$
f	1	2	-4	$+\infty$

Déterminer $f([0, 1[)$, $f([1, 6])$ et $f([1, +\infty[)$.

2. Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue dont le tableau de variations est le suivant :

x	$-\infty$	3	$+\infty$
g	0	1	$-\infty$

Déterminer $g(]3, +\infty[)$ et $g(]-\infty, 3])$.

3. Soit $h : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue dont le tableau de variations est le suivant :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
h	$+\infty$	0	-2

Déterminer $h(]1, +\infty[)$ et $h(]-\infty, 1])$.

Exercice 2

- Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \exp(\sqrt{x})$. Montrer que f est injective mais n'est pas surjective.
- Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow]-\infty, 2]$
 $x \mapsto 2 - x^2$. Montrer que g est surjective mais n'est pas injective.





Exercice 3

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$. Quels sont les ensembles de départ et d'arrivée de $g \circ f$? Montrer que :

- si $g \circ f$ est injective alors f est injective.
- si $g \circ f$ est surjective alors g est surjective.

Exercice 4

La page ci-après présente (en mode paysage!) les graphes de quatre fonctions de \mathbb{R} dans \mathbb{R} . Déterminer si ces fonctions sont injectives et/ou surjectives.



Exercice 5

Soient E et F des ensembles, $f : E \longrightarrow F$, et $A, A' \subset E$.

1. Montrer que si $A \subset A'$ alors $f(A) \subset f(A')$.
2. Montrer que $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$.
3. Donner un exemple de fonction $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ et d'ensembles $A, A' \subset \mathbb{R}$ tels que $f(A \cap A') \neq f(A) \cap f(A')$.

Exercice 6

On considère la fonction suivante : :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto (2x + y, x + z, y + z) \end{aligned}$$

Montrer que f est bijective et déterminer f^{-1} .

Exercice 7

Soit la fonction numérique f donnée par

$$f(x) = \frac{1}{1 + x + x^2}.$$

1. Faire l'étude complète de f .
2. Donner l'allure du graphe de f et la vérifier à l'aide de GeoGebra (<https://www.geogebra.org/classic?lang=fr>).
3. Déterminer par lecture graphique deux intervalles I et J tels que $f : I \longrightarrow J$ soit une bijection.
4. Démontrer le résultat énoncé à la question précédente selon la méthode du cours.

Exercice 8

Soit th la fonction numérique donnée par

$$th(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

1. Faire l'étude de th .
2. Donner des intervalles I et J tels que $th : I \longrightarrow J$ soit une bijection.
3. Déterminer la bijection réciproque $th^{-1} : J \longrightarrow I$.

Exercice 9

Soit f la fonction numérique donnée par

$$f(x) = \sqrt{\frac{2-x}{1+x}}.$$

1. Faire l'étude de f .
2. Donner des intervalles I et J tels que $f : I \rightarrow J$ soit une bijection. (*On pourra vérifier sa réponse sur Geogebra avant de passer à la question suivante.*)
3. Déterminer la bijection réciproque $f^{-1} : J \rightarrow I$.

Exercice 10

Montrer que la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow]0, +\infty[$ donnée par

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \ln(1 + e^x)$$

est bijective, et déterminer f^{-1} . En déduire la bijection réciproque de

$$g : x \mapsto (\ln(1 + e^x))^3.$$

Exercice 11

Pour $a \in \mathbb{R}$ on considère la fonction

$$\begin{aligned} f_a &: \mathbb{R} \setminus \{a\} \longrightarrow \mathbb{R} \\ &: x \longmapsto \frac{1}{x-a} + a \end{aligned}$$

1. Montrer que $Im(f_a) \subset \mathbb{R} \setminus \{a\}$.
2. Calculer $f_a \circ f_a$. Que peut-on en conclure ? Illustrer ce fait graphiquement.