

Feuille de cours 5.2 : sommes doubles

Dans tout ce document, $n, p, n_0, n_1, p_0, p_1, \dots$ désignent des entiers ad hoc, et on considère pour tous $i, j \in \mathbb{Z}$ des nombres réels (ou complexes) $a_{i,j} \in \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$).

1 Sommes doubles “rectangulaires”

Dans ce paragraphe, on cherche à calculer des sommes du type $\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} a_{i,j}$. C’est-à-dire qu’on cherche à déterminer la somme de tous les $a_{i,j}$ pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$.

Notation : lorsque $n = p$ on note $\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} a_{i,j} = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j}$

1.1 Sommations par lignes et par colonnes

Rangeons les nombres $a_{i,j}$ dans un tableau à n lignes et p colonnes dans lequel $a_{i,j}$ est placé à la ligne i , colonne j .

Pour calculer $\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} a_{i,j}$, on peut d’abord faire la somme sur chacune des lignes :

$$\begin{array}{ccccccc}
 a_{1,1} & \cdots & a_{1,j} & \cdots & a_{1,p} & \longrightarrow & a_{1,1} + \dots + a_{1,j} + \dots + a_{1,p} = \sum \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots & & \\
 a_{i,1} & \cdots & a_{i,j} & \cdots & a_{i,p} & \longrightarrow & a_{i,1} + \dots + a_{i,j} + \dots + a_{i,p} = \sum \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots & & \\
 a_{n,1} & \cdots & a_{n,j} & \cdots & a_{n,p} & \longrightarrow & a_{n,1} + \dots + a_{n,j} + \dots + a_{n,p} = \sum
 \end{array}$$

Conclusion : en sommant ligne par ligne, on obtient

$$\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} a_{i,j} = \sum_{j=1}^p a_{1,j} + \dots + \sum_{j=1}^p a_{i,j} + \dots + \sum_{j=1}^p a_{n,j} = \sum \left(\sum_{j=1}^p a_{i,j} \right)$$

Pour calculer $\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} a_{i,j}$, on peut aussi faire la somme sur chacune des colonnes :

$$\begin{array}{ccccccccc}
 a_{1,1} & \cdots & a_{1,j} & \cdots & a_{1,p} \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 a_{i,1} & \cdots & a_{i,j} & \cdots & a_{i,p} \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 a_{n,1} & \cdots & a_{n,j} & \cdots & a_{n,p} \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 \sum & & \sum & & \sum
 \end{array}$$

Conclusion : en sommant colonne par colonne, on obtient

$$\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} a_{i,j} = \sum_{i=1}^n a_{i,1} + \dots + \sum_{i=1}^n a_{i,j} + \dots + \sum_{i=1}^n a_{i,p} = \sum \left(\sum_{i=1}^n a_{i,j} \right).$$

Finalement : $\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} a_{i,j} =$

Remarque : Les indices ne commencent pas forcément à 1. Plus généralement, on a :

$$\sum_{\substack{n_0 \leq i \leq n_1 \\ p_0 \leq j \leq p_1}} a_{i,j} = \sum_{i=n_0}^{n_1} \left(\sum_{j=p_0}^{p_1} a_{i,j} \right) = \sum_{j=p_0}^{p_1} \left(\sum_{i=n_0}^{n_1} a_{i,j} \right)$$

Plus généralement encore, on peut sommer sur des indices (i, j) appartenant à n'importe quel produit cartésien : $I \times J$ (c'est-à-dire pour tous les couples (i, j) avec $i \in I$ et $j \in J$) et alors

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} a_{i,j} = \sum_{i \in I} \left(\sum_{j \in J} a_{i,j} \right) = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I} a_{i,j} \right)$$

Remarque : Il faut ensuite utiliser les outils usuels des sommes simples, en particulier :

Si $a_{i,j} = \tilde{a}_j$ ne dépend pas de i on peut simplifier la somme $\sum_{i=1}^n a_{i,j} = \sum_{i=1}^n \tilde{a}_j =$

De même, Si $a_{i,j} = \tilde{a}_i$ ne dépend pas de j on peut simplifier la somme $\sum_{j=1}^p a_{i,j} = \sum_{j=1}^p \tilde{a}_i =$

Exercice 1

Calculer $S_1 = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} 1$, $S_2 = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} i$, $S_3 = \sum_{1 \leq i, j \leq n} i + j$ et $S_4 = \sum_{1 \leq i, j \leq n} ij$.

1.2 Cas des termes séparables

On s'intéresse au cas particulier où $a_{i,j}$ s'écrit $a_{i,j} = a_i b_j$.

Proposition 1

Soient $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_p \in \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$). On a :

$$\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} a_i b_j = \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \times \left(\sum_{j=1}^p b_j \right)$$

Démonstration :

Exercice 2

Écrire sous forme d'une somme double : $\left(\sum_{k=1}^n k \right)^2$

Exercice 3

Calculer pour $n, p \in \mathbb{N}^*$ et $a \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$: $S_5 = \sum_{0 \leq i, j \leq n} a^{i+j}$, $S_6 = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 0 \leq j \leq p}} i a^j$, et $P = \prod_{1 \leq i, j \leq n} ij$.

1.3 Et en Python ?

Pour faire une somme double du type $\sum_{\substack{a \leq i \leq b \\ c \leq j \leq d}}$ on utilise 2 boucles `for` imbriquées :

Exercice 4

Écrire une fonction Python prenant en argument deux entiers n et m et renvoyant la valeur de :

1. $\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 0 \leq j \leq m}} \frac{i}{i+j}$
2. $\prod_{\substack{2 \leq i \leq n+1 \\ 0 \leq j \leq m}} (i + 2^j)$

2 Sommes doubles “triangulaires”

On se place dans le cas “carré” $n = p$. On range à nouveau les nombres $a_{i,j}$ dans un tableau (à n lignes et n colonnes). Le nombre $a_{i,j}$ est placé ligne i colonne j .

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,j} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i,1} & \cdots & a_{i,j} & \cdots & a_{i,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,j} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}.$$

On souhaite calculer la somme des coefficients du tableau placés au-dessus ou en-dessous de la diagonale (diagonale incluse), c’est-à-dire les sommes :

- $\sum a_{i,j}$ (termes au-dessus de la diagonale), ou
- $\sum a_{i,j}$ (termes en-dessous de la diagonale).

Dans la suite, on s’intéresse à la deuxième somme, les résultats sont bien sûr similaires dans le cas de la première.

2.1 Sommations par lignes et par colonnes

Pour calculer $\sum_{1 \leq j \leq i \leq n} a_{i,j}$, on peut d’abord faire la somme sur chacune des lignes :

$$\begin{array}{ccc} a_{1,1} & & \longrightarrow a_{1,1} = \sum \\ \vdots & \ddots & \\ a_{i,1} & \cdots & a_{i,i} \longrightarrow a_{i,1} + \cdots + a_{i,i} = \sum \\ \vdots & & \vdots \quad \ddots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,j} \quad \cdots \quad a_{n,n} \longrightarrow a_{n,1} + \cdots + a_{n,j} + \cdots + a_{n,n} = \sum \end{array}$$

Conclusion : en sommant ligne par ligne, on obtient

$$\sum_{1 \leq j \leq i \leq n} a_{i,j} = \sum_{j=1}^1 a_{1,j} + \cdots + \sum_{j=1}^i a_{i,j} + \cdots + \sum_{j=1}^n a_{n,j} = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^i a_{i,j} \right)$$

Pour calculer $\sum_{1 \leq j \leq i \leq n} a_{i,j}$, on peut aussi faire la somme sur chacune des colonnes :

$$\begin{array}{ccccccc}
 & a_{1,1} & & & & & \\
 & \vdots & & \ddots & & & \\
 & a_{i,1} & \cdots & & a_{j,j} & & \\
 & \vdots & & & \vdots & \ddots & \\
 & a_{n,1} & \cdots & & a_{n,j} & \cdots & a_{n,n} \\
 & \downarrow & & & \downarrow & & \downarrow \\
 & \sum a_{i,1} & & & \sum a_{i,j} & & \sum a_{i,n}
 \end{array}$$

Conclusion : en sommant colonne par colonne, on obtient

$$\sum_{1 \leq j \leq i \leq n} a_{i,j} = \sum_{i=1}^n a_{i,1} + \dots + \sum_{i=j}^n a_{i,j} + \dots + \sum_{i=n}^n a_{i,n} = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=j}^n a_{i,j} \right).$$

Finalemment : $\sum_{1 \leq j \leq i \leq n} a_{i,j} =$

Exercice 5

Calculer $S = \sum_{1 \leq j \leq i \leq n} 1$.

Important : Attention, la somme à l'intérieur dépend de l'indice de la somme à l'extérieur. Contrairement aux sommes "rectangulaires" il ne suffit donc pas d'échanger les deux symboles sommes. En particulier, les égalités :

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i a_{ij} = \sum_{j=1}^i \sum_{i=1}^n a_{ij} \quad \text{ou encore} \quad \sum_{j=1}^n \sum_{i=j}^n a_{ij} = \sum_{i=j}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}$$

sont fausses (et n'ont aucun sens!).

Généralisations : De manière plus générale, pour $m, n \in \mathbb{Z}$ on a :

$$\sum_{m \leq k \leq \ell \leq n} a_{k,\ell} = \sum_{k=m}^n \sum_{\ell=k}^n a_{k,\ell} = \sum_{\ell=m}^n \sum_{k=m}^{\ell} a_{k,\ell}$$

On peut aussi traiter des inégalités strictes (cas où la diagonale " $i = j$ " est exclue) :

$$\sum_{1 \leq j < i \leq n} a_{i,j} = \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{i=j+1}^n a_{i,j} = \sum_{i=2}^n \sum_{j=1}^{i-1} a_{i,j}$$

On rappelle que par convention, toute somme vide est nulle : $\sum_{i=1}^0 b_i = \sum_{j=n+1}^n b_j = 0$, de sorte qu'on peut aussi écrire :

$$\sum_{1 \leq j < i \leq n} a_{i,j} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=j+1}^n a_{i,j} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=i-1}^n a_{i,j}$$

à condition de se rappeler que les expressions $a_{n+1,n}$ et $a_{1,0}$ n'ont a priori pas de sens.

Exercice 6

Calculer $T = \sum_{1 \leq j < i \leq n} 1$.

2.2 Méthodes

Il faut ensuite utiliser les outils usuels des sommes simples, en particulier :

- Si $a_{i,j} = \tilde{a}_i$ ne dépend pas de j on peut simplifier la somme $\sum_{j=1}^i a_{i,j} = \sum_{j=1}^i \tilde{a}_i =$
- Si $a_{i,j} = \tilde{a}_j$ ne dépend pas de i on peut simplifier la somme $\sum_{i=j}^n a_{i,j} = \sum_{i=j}^n \tilde{a}_j =$

Cette utilisation est un peu plus subtile que dans le cas “rectangulaire” car l’indice dont dépend $a_{i,j}$ peut lui-même être une borne...

Important : Le choix de l’ordre de sommation devient donc ici une étape essentielle du calcul : choisir le bon ordre simplifie (voire rend possible) le calcul de la somme.

Exercice 7

Écrire les deux ordres de sommations possibles pour calculer les sommes suivantes, choisir le bon, et terminer le calcul : $S_1 = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{1}{j}$, et $S_3 = \sum_{0 \leq j \leq k \leq n} \binom{n}{k} \binom{k}{j} a^j b^{k-j}$.

Pour conclure, certaines sommes “rectangulaires” se prêtent particulièrement à un “découpage” en sommes “triangulaires”. On écrit alors par exemple que :

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j} = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j} + \sum_{1 \leq j < i \leq n} a_{i,j}$$

Exercice 8

Calculer $S_4 = \sum_{1 \leq i, j \leq n} \min(i, j)$ et $S_5 = \sum_{1 \leq i, j \leq n} \max(i, j)$

Exercice 9

Calculer pour $n \in \mathbb{N}^*$: $S_6 = \sum_{0 \leq i < j \leq n} \frac{i^2}{j^2 - j}$, $S_7 = \sum_{0 \leq i \leq j \leq n} 2^{i-j}$

2.3 Et en Python ?

Pour faire une somme double du type $\sum_{a \leq i \leq j \leq b}$ on utilise 2 boucles `for` imbriquées :

Exercice 10

Écrire une fonction Python prenant en argument deux entiers n et m et renvoyant la valeur de :

1. $\sum_{1 \leq j \leq i \leq n} \frac{i}{i+j}$
2. $\prod_{m \leq j < i \leq n} ij$

Exercice 11

Calculer les sommes et produits suivants pour $n, p \in \mathbb{N}^*$:

$$1. S_1 = \sum_{1 \leq i, j \leq n} i^2 j$$

$$2. S_2 = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} 2^{i-j}$$

$$3. P_1 = \prod_{1 \leq i, j \leq n} i^2 j$$

$$4. P_2 = \prod_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} e^{i+j}$$

Exercice 12

Calculer les sommes et produits suivants pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$1. S_1 = \sum_{1 \leq j \leq i \leq n} i + j$$

$$2. S_2 = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j}$$

$$3. S_3 = \sum_{0 \leq i \leq j \leq n} \binom{j}{i} \binom{n}{j}$$

$$4. S_4 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{1}{n-i}$$

$$5. S_5 = \sum_{1 \leq i, j \leq n} |i - j|$$

$$6. P_1 = \prod_{\substack{1 \leq i \leq j \leq n \\ 1 \leq k \leq j}} \left(\frac{k}{i} \right)^{1/j}$$

Exercice 13

Pour $n \geq 1$ on note $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ et $u_n = \sum_{k=1}^n H_k$.

Montrer que pour tout $n \geq 1$, $u_n = (n+1)H_n - n$.