Corrigé du DM n°13

Étude de $f : x \mapsto \frac{x}{1 + e^x}$

1. Variations de f

(a) Par opérations, f est dérivable sur $\mathbf{R}$ et : $\forall x \in \mathbf{R}, f'(x) = \frac{1 \times (1 + e^x) - xe^x}{(1 + e^x)^2}$.

Soit : $\forall x \in \mathbf{R}, f'(x) = \frac{1 + e^x - xe^x}{(1 + e^x)^2}$.

(b) φ est définie et dérivable sur $\mathbf{R}$ et : $\forall x \in \mathbf{R}, \varphi'(x) = e^x - (e^x + xe^x) = -xe^x$.
Par ailleurs, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x) = 1$ par croissances comparées.

De plus, $\varphi(x) = 1 + (1 - x)e^x$ et $(1 - x)e^x \underset{+\infty}{\sim} -xe^x$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = -\infty$.

On en déduit le tableau de variations suivant :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\varphi'(x)$	+	0	-
φ	1	2	$-\infty$

(c) D'après 1a, $\forall x \in \mathbf{R}, f'(x) = \frac{\varphi(x)}{(1 + e^x)^2}$ donc $f'(x) = 0 \iff \varphi(x) = 0$.

Or : $\forall x \leq 0, \varphi(x) \geq 1$ donc : $\forall x \leq 0, \varphi(x) \neq 0$.

Par ailleurs, φ est continue, strictement décroissante sur l'intervalle $\mathbf{R}_+$ et réalise donc une bijection de $\mathbf{R}_+$ vers $\varphi(\mathbf{R}_+) =]-\infty, 2]$.

$0 \in]-\infty, 2]$ donc 0 admet un unique antécédent a par φ dans $\mathbf{R}_+$.

De plus, $\varphi(1) = 1 > 0$ et $\varphi(2) = 1 - e^2 < 0$ donc $a \in]1, 2[$.

Enfin, $1 + e^a = ae^a$ puisque $\varphi(a) = 0$. Ainsi, $f(a) = \frac{a}{ae^a} = e^{-a}$.

Conclusion : f' s'annule une unique fois. En ce point $a \in]1, 2[, f(a) = e^{-a}$.

(d) Par opérations, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, et $f(x) \underset{+\infty}{\sim} \frac{x}{e^x}$ donc par croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

D'après les questions précédentes, on obtient le signe de $f'(x) = \frac{\varphi(x)}{(1 + e^x)^2}$.

x	$-\infty$	a	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$	e^{-a}	0

2. Étude locale en 0

(a) $f(0) = 0$ et $f'(0) = \frac{2}{2^2} = \frac{1}{2}$ donc l'équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ en 0 est : $y = \frac{x}{2}$.

(b) Soit $x \in \mathbf{R}$. Alors $f(x) - \frac{x}{2} = \frac{x}{1 + e^x} - \frac{x}{2} = \frac{2x - x(1 + e^x)}{2(1 + e^x)} = \frac{x(1 - e^x)}{2(1 + e^x)}$.

(c) On sait que $e^x - 1 \underset{0}{\sim} x$. De plus, $1 + e^x \rightarrow 2$ donc $1 + e^x \underset{0}{\sim} 2$. Ainsi, $f(x) - x \underset{0}{\sim} -\frac{x^2}{4}$.

(d) $-\frac{x^2}{4} \leq 0$ donc au voisinage de 0, $f(x) - \frac{x}{2} \leq 0$.

On en déduit que la courbe $\mathcal{C}_f$ est localement en-dessous de sa tangente T .

3. Étude en $-\infty$ et graphe :

(a) $\forall x \in \mathbf{R}, f(x) - x = \frac{x}{1+e^x} - x = \frac{x - x(1+e^x)}{1+e^x} = \frac{-xe^x}{1+e^x}$.

Mais $1 + e^x \underset{-\infty}{\sim} 1$, donc par quotient d'équivalents : $f(x) - x \underset{-\infty}{\sim} -xe^x$.

(b) Par croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow -\infty} -xe^x = 0$ donc la droite Δ d'équation $y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$. De plus, $f(x) - x \geq 0$ dès que $x \leq 0$ donc la courbe $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ sur $\mathbf{R}_-$.

(c) **Représentation graphique de f :**

4. Approximation de a

(a) $\varphi(a) = 0 \iff 1 + (1-a)e^a = 0$
 $\iff e^{-a} = a - 1$
 $\iff 1 + e^{-a} = a$

a est l'unique solution de l'équation $h(x) = x$.

(b) h est dérivable sur $[1, +\infty[$ et $\forall x \geq 1, h'(x) = -e^{-x}$ donc : $\forall x \geq 1, |h'(x)| \leq e^{-1}$.

(c) Soient I le segment de bornes a et x , et $\overset{\circ}{I}$ l'intervalle ouvert de bornes a et x . Alors h est continue sur I et dérivable sur $\overset{\circ}{I}$. D'après l'inégalité des accroissements finis :
 $|h(x) - h(a)| \leq M|x - a|$ où M est le sup de $|h'(t)|$ pour $t \in \overset{\circ}{I}$.

D'après **4a**, $h(a) = a$, et d'après **4b**, $M \leq e^{-1}$. Ainsi : $\forall x \geq 1, |h(x) - a| \leq e^{-1}|x - a|$.

(d) $\forall x \in \mathbf{R}, h(x) \geq 1$ et $u_0 = 1 \geq 1$, donc $\forall n \in \mathbf{N}, u_n \geq 1$.

On applique le résultat précédent à $x = u_n$: $\forall n \in \mathbf{N}, |u_{n+1} - a| \leq e^{-1}|u_n - a|$.

(e) $h(a) = a$ donc : $a - 1 = e^{-a}$. De plus, $a > 1$ donc $e^{-a} < e^{-1}$.

(f) Soit $\mathcal{H}_n$: " $|u_n - a| \leq e^{-(n+1)}$ ". Prouvons par récurrence que $\mathcal{H}_n$ est vraie pour tout $n \geq 0$.

- **Initialisation** : $|u_0 - a| = |1 - a| = a - 1 < e^{-1}$ d'après l'étude précédente. Ainsi, $\mathcal{H}_0$ est vraie.
- **Hérédité** : Soit $n \geq 0$. Supposons $\mathcal{H}_n$ vraie.
 On sait : $|u_{n+1} - a| \leq e^{-1}|u_n - a|$ donc, par hypothèse de récurrence, $|u_{n+1} - a| \leq e^{-1} \times e^{-(n+1)}$.
 Donc $|u_{n+1} - a| \leq e^{-(n+2)}$, et ainsi $\mathcal{H}_{n+1}$ est vraie.

Conclusion : $\forall n \in \mathbf{N}, |u_n - a| \leq e^{-(n+1)}$.

(g) $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-(n+1)} = 0$ donc (u_n) converge et $\lim u_n = a$.

5. Informatique

```
from math import exp
def h(x) :
    return 1 + exp(-x)

def u(n) :
    '''version itérative'''
    u0 = 1
    for _ in range(n) :
        u0 = h(u0)
    return u0

def urec(n) :
    '''version récursive'''
    if n == 0 :
        return 1
    return h(urec(n-1))

def approximation(p) :
    n = 0
    while exp(-n-1) > 10**(-p) :
        n += 1
    return u(n)
```