Exercice 1 : Un exemple de VAR

1. Diagramme en bâtons de X

2. Fonction de répartition de X

3. $\mathbf{P}(X \leq 0) = \mathbf{P}(X = -1) + \mathbf{P}(X = 0) = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{12}$.

$\mathbf{P}(-0,5 \leq X < 3) = \mathbf{P}(X = 0) + \mathbf{P}(X = 1) = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$.

4. Loi de $Y = |X|$

k	0	1	3
$\mathbf{P}(Y = k)$	1/6	7/12	1/4

Loi de $Z = X(X^2 - 1)$

k	0	24
$\mathbf{P}(Z = k)$	3/4	1/4

5. Espérances et variances

$\mathbf{E}(X) = \frac{1}{4}(-1) + \frac{1}{6} \times 0 + \frac{1}{3} \times 1 + \frac{1}{4} \times 3$ donc $\mathbf{E}(X) = \frac{5}{6}$.

$\mathbf{E}(X^2) = \frac{1}{4}(-1)^2 + \frac{1}{6} \times 0^2 + \frac{1}{3} \times 1^2 + \frac{1}{4} \times 3^2$ donc $\mathbf{E}(X^2) = \frac{17}{6}$.

D'après le théorème de König-Huygens, $\mathbf{V}(X) = \mathbf{E}(X^2) - (\mathbf{E}(X))^2 = \frac{17}{6} - \left(\frac{5}{6}\right)^2$ donc $\mathbf{V}(X) = \frac{77}{36}$.

$\mathbf{E}(Y) = \frac{7}{12} \times 1 + \frac{1}{4} \times 3 = \frac{4}{3}$, puis $\mathbf{E}(Y^2) = \frac{7}{12} \times 1^2 + \frac{1}{4} \times 3^2 = \frac{17}{6}$.

D'où : $\mathbf{V}(Y) = \frac{17}{6} - \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{19}{18}$.

$\mathbf{E}(Z) = \frac{1}{4} \times 24 = 6$, puis $\mathbf{E}(Z^2) = \frac{1}{4} \times 24^2 = 144$ donc $\mathbf{V}(Z) = 144 - 6^2 = 108$.

Exercice 2 : Loi de X étant donnée sa fonction de répartition.

Loi de X

k	-2	2
$\mathbf{P}(X = k)$	2/3	1/3

Espérance de X :

$\mathbf{E}(X) = \frac{2}{3}(-2) + \frac{1}{3} \times 2 = -\frac{2}{3}$.

Variance de X : $X^2 = 4$

(loi certaine) donc $\mathbf{E}(X^2) = 4$
 et $\mathbf{V}(X) = 4 - \left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{32}{9}$.

Exercice 3 : Loi lors d'un tirage sans remise.

X est le nombre de tirages nécessaires pour choisir un homme.

Au minimum, $X = 1$: on a choisi un homme dès le premier tirage.

Au maximum, puisqu'il y a p femmes, on obtient le premier homme au $(p + 1)^{\text{ème}}$ tirage.

Ainsi, le support de X est $X(\Omega) = \llbracket 1, p+1 \rrbracket$.

Soit $k \in \llbracket 1, p+1 \rrbracket$. On cherche $\mathbf{P}(X = k)$, ie la probabilité d'obtenir le premier homme au $k^{\text{ème}}$ tirage.

Pour tout $i \in \llbracket 1, n+p \rrbracket$, notons F_i l'événement « une femme est choisie au tirage i ».

Alors : $[X = k] = F_1 \cap F_2 \cap \dots \cap F_{k-1} \cap \overline{F_k}$.

D'après la formule des probabilités composées :

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(X = k) &= \mathbf{P}(F_1) \times \mathbf{P}_{F_1}(F_2) \times \dots \times \mathbf{P}_{F_1 \cap \dots \cap F_{k-2}}(F_{k-1}) \times \mathbf{P}_{F_1 \cap \dots \cap F_{k-1}}(\overline{F_k}) \\ &= \frac{p}{n+p} \times \frac{p-1}{n+p-1} \times \dots \times \frac{p-(k-2)}{n+p-(k-2)} \times \frac{n}{n+p-(k-1)}. \end{aligned}$$

On peut utiliser la notation factorielle : $\mathbf{P}(X = k) = \frac{p!}{(p-k+1)!} \times \frac{(n+p-k)!}{(n+p)!} \times n$

et (ce n'est pas un objectif de l'exercice) obtenir : $\forall k \in \llbracket 1, p+1 \rrbracket, \mathbf{P}(X = k) = \frac{n}{p-k+1} \frac{\binom{p}{k}}{\binom{n+p}{k}}$.

Autre façon de rédiger : soit Y_k la VAR égale au nombre d'hommes choisis au cours des k premiers tirages. Alors $Y_k \hookrightarrow \mathcal{H}(n+p, k, \frac{n}{n+p})$: loi hypergéométrique de paramètres $N = n+p$ (nombre total de personnes),

k tirages sans remise, et avec la proportion $\frac{n}{n+p}$ d'hommes dans l'échantillon.

Ainsi, $[X = k] = [Y_{k-1} = 0] \cap \overline{F_k}$. En effet, choisir pour la première fois un homme au tirage k signifie ne choisir aucun homme au cours des $(k-1)$ premiers tirages, et choisir un homme au tirage k .

Il vient alors (formule des probabilités composées) :

$$\mathbf{P}(X = k) = \mathbf{P}(Y_{k-1} = 0) \times \mathbf{P}_{Y_{k-1}=0}(\overline{F_k}) = \frac{\binom{n}{0} \binom{p}{k-1}}{\binom{n+p}{k-1}} \times \frac{n}{n+p-k+1} = \frac{n}{n+p-k+1} \times \frac{\binom{p}{k-1}}{\binom{n+p}{k-1}}.$$

d'après la formule de la loi hypergéométrique.

Remarque :

en utilisant le lemme du pion, on montre que le résultat ainsi obtenu est identique au précédent.

Exercice 4 : Les haies.

Au minimum, $X = 2$ car la première haie est toujours franchie avec succès et le sportif peut échouer sur la deuxième haie (probabilité $1/2$).

Au maximum, le sportif franchit toutes les haies, et alors $X = n+1$.

Ainsi, le support de X est $X(\Omega) = \llbracket 2, n+1 \rrbracket$.

Pour $k \in \llbracket 2, n+1 \rrbracket$, on cherche $\mathbf{P}(X = k)$.

Pour tout $i \in \llbracket 2, n \rrbracket$, on note H_i l'événement : « la $i^{\text{ème}}$ haie est franchie avec succès ».

Alors $[X = k] = H_2 \cap H_3 \cap \dots \cap H_{k-1} \cap \overline{H_k}$ si $k \leq n$, et $\mathbf{P}(X = n+1) = \prod_{i=2}^n H_i$.

D'après la formule des probabilités composées :

$$\begin{aligned} \forall k \leq n, \mathbf{P}(X = k) &= \mathbf{P}(H_2) \times \mathbf{P}_{H_2}(H_3) \times \dots \times \mathbf{P}_{H_2 \cap \dots \cap H_{k-2}}(H_{k-1}) \times \mathbf{P}_{H_2 \cap \dots \cap H_{k-1}}(\overline{H_k}) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \dots \times \frac{1}{k-1} \times \left(1 - \frac{1}{k}\right) = \frac{k-1}{k!} \quad \text{d'après l'énoncé;} \end{aligned}$$

$$\text{et } \mathbf{P}(X = n+1) = \frac{1}{n!}.$$

$$\text{Enfin, } \mathbf{P}(X = n+1) = \mathbf{P}\left(\bigcap_{i=1}^n H_i\right) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{i} = \frac{1}{n!}.$$

Exercice 5 : Maximum obtenu en lançant n dés.

1. Cas où $n = 2$:

On peut ici simplement examiner les 36 événements élémentaires pour déterminer la loi de M .

Le support de M est $M(\Omega) = \llbracket 1, 6 \rrbracket$.

$[M = 1]$ est l'événement $\{(1, 1)\}$: obtenir un double 1.

$[M = 2]$ est l'événement $\{(1, 2), (2, 2), (2, 1)\}$.

$[M = 3]$ est l'événement $\{(1, 3), (2, 3), (3, 3), (3, 2), (3, 1)\}$.

$[M = 4]$ est l'événement $\{(1, 4), (2, 4), (3, 4), (4, 4), (4, 3), (4, 2), (4, 1)\}$.

$[M = 5]$ est l'événement $\{(1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (5, 5), (5, 4), (5, 3), (5, 2), (5, 1)\}$.

$[M = 6]$ est l'événement $\{(1, 6), (2, 6), (3, 6), (4, 6), (5, 6), (6, 6), (6, 5), (6, 4), (6, 3), (6, 2), (6, 1)\}$.

Par équiprobabilité, on trouve la loi de M :

k	1	2	3	4	5	6
$\mathbf{P}(M = k)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{11}{36}$

Espérance de M :

$$\mathbf{E}(M) = \frac{1}{36} \times 1 + \frac{3}{36} \times 2 + \frac{5}{36} \times 3 + \frac{7}{36} \times 4 + \frac{9}{36} \times 5 + \frac{11}{36} \times 6, \text{ donc } \mathbf{E}(M) = \frac{161}{36}.$$

Variance de M :

$$\text{On calcule d'abord } \mathbf{E}(M^2) = \frac{1}{36} \times 1^2 + \frac{3}{36} \times 2^2 + \frac{5}{36} \times 3^2 + \frac{7}{36} \times 4^2 + \frac{9}{36} \times 5^2 + \frac{11}{36} \times 6^2 = \frac{791}{36}$$

$$\text{D'après König-Huygens : } \mathbf{V}(M) = \mathbf{E}(M^2) - \mathbf{E}(M)^2 = \frac{791}{36} - \left(\frac{161}{36}\right)^2 \text{ donc } \mathbf{V}(M) = \frac{2555}{36^2}.$$

2. Cas général : Soit $k \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$.

Alors $[M \leq k]$ signifie que le maximum des dés ne dépasse pas k , donc qu'aucun dé ne dépasse k :

$$\forall k \in \llbracket 1, 6 \rrbracket, [M \leq k] = \bigcap_{i=1}^n [X_i \leq k]$$

3. Fonction de répartition puis loi de M :

D'après la question précédente et la formule des probabilités composées :

$$\begin{aligned} \forall k \in \llbracket 1, 6 \rrbracket, F_M(k) &= \mathbf{P}(M \leq k) = \mathbf{P}(X_1 \leq k) \times \mathbf{P}_{[X_1 \leq k]}(X_2 \leq k) \times \dots \times \mathbf{P}_{[X_1 \leq k] \cap \dots \cap [X_{n-1} \leq k]}(X_n \leq k) \\ &= \frac{k}{6} \times \frac{k}{6} \times \dots \times \frac{k}{6} \quad \text{donc } \forall k \in \llbracket 1, 6 \rrbracket, F_M(k) = \left(\frac{k}{6}\right)^n. \end{aligned}$$

On obtient la loi de M en écrivant : $\forall k \in \llbracket 1, 6 \rrbracket, \mathbf{P}(M = k) = F_M(k) - F_M(k-1)$,

car $M = k$ signifie que M est inférieur ou égal à k mais pas inférieur ou égal à $k-1$.

$$\text{Ainsi, } \forall k \in \llbracket 1, 6 \rrbracket, \mathbf{P}(M = k) = \left(\frac{k}{6}\right)^n - \left(\frac{k-1}{6}\right)^n.$$

4. Espérance de M :

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(M) &= \sum_{k=1}^6 k \left(\left(\frac{k}{6}\right)^n - \left(\frac{k-1}{6}\right)^n \right) = \sum_{k=1}^6 \frac{k^{n+1}}{6^n} - \sum_{k=1}^6 \frac{k(k-1)^n}{6^n} \quad \text{par linéarité,} \\ &= \sum_{k=1}^6 \frac{k^{n+1}}{6^n} - \sum_{k=0}^5 \frac{(k+1)k^n}{6^n} = \sum_{k=1}^6 \frac{k^{n+1}}{6^n} - \sum_{k=0}^5 \frac{k^{n+1}}{6^n} - \sum_{k=0}^5 \frac{k^n}{6^n} \quad \text{par glissement d'indices} \\ &= \frac{6^{n+1}}{6^n} - \sum_{k=0}^5 \frac{k^n}{6^n} \quad \text{par télescopage.} \quad \text{Ainsi, } \mathbf{E}(M) = 6 - \sum_{k=1}^5 \left(\frac{k}{6}\right)^n. \end{aligned}$$

$$\forall k \in \llbracket 1, 5 \rrbracket, -1 < \frac{k}{6} < 1 \text{ donc } \left(\frac{k}{6}\right)^n \text{ tend vers } 0. \text{ Par opérations, on a donc : } \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbf{E}(M) = 6.$$

De façon assez évidente, lorsqu'on lance un très grand nombre de dés, le maximum obtenu est en moyenne très proche de 6.

Exercice 6 :

1. Support de X_n :

Au minimum, on ne pioche que des boules blanches, donc $X_n = 0$.

Au maximum, on ne pioche que des boules noires (tant qu'il y en a), donc, si $n \leq 5$, alors $X_n = n$ et si $n \geq 6$, alors $X_n = 6$.

$$\text{Ainsi, } X_n(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket \text{ si } n \leq 5, \text{ et } X_n(\Omega) = \llbracket 0, 6 \rrbracket \text{ si } n \geq 6.$$

2. Couleur de la dernière boule piochée :

Soit $i \in \mathbf{N}^*$. On note B_i l'événement « la boule piochée au $i^{\text{ème}}$ tirage est blanche ».

Alors $(B_{n+1}, \overline{B_{n+1}})$ forme un système complet d'événements. Ainsi :

$$\mathbf{P}(X_{n+1} = k) = \mathbf{P}([X_{n+1} = k] \cap B_{n+1}) + \mathbf{P}([X_{n+1} = k] \cap \overline{B_{n+1}})$$

$$= \mathbf{P}([X_n = k] \cap B_{n+1}) + \mathbf{P}([X_n = k-1] \cap \overline{B_{n+1}})$$

car $[X_{n+1} = k] \cap B_{n+1}$ signifie qu'on a pioché k boules noires au cours des $(n+1)$ premiers tirages et une boule blanche au $(n+1)$ ème tirage, donc qu'on a pioché k boules noires au cours des n premiers tirages et une blanche ensuite ;

et de même : $[X_{n+1} = k] \cap \overline{B_{n+1}}$ signifie qu'on a pioché k boules noires au cours des $(n+1)$ premiers tirages et une boule noire au $(n+1)$ ème tirage, donc qu'on a pioché $k-1$ boules noires au cours des n premiers tirages et une noire ensuite.

D'après la formule des probabilités totales :

$$\mathbf{P}(X_{n+1} = k) = \mathbf{P}(X_n = k) \times \mathbf{P}_{[X_n=k]}(B_{n+1}) + \mathbf{P}(X_n = k-1) \times \mathbf{P}_{[X_n=k-1]}(\overline{B_{n+1}})$$

avec $\mathbf{P}_{[X_n=k]}(B_{n+1}) = \frac{4+k}{10}$ car si on a pioché k boules noires lors des n premiers tirages, alors on les a remplacées par k boules blanches, donc il y a dans l'urne $4+k$ boules blanches (et toujours 10 boules en tout), et $\mathbf{P}_{[X_n=k-1]}(\overline{B_{n+1}}) = \frac{7-k}{10}$ car si on a pioché $k-1$ boules noires au cours des n premiers tirages, il en reste $6 - (k-1) = 7-k$.

$$\forall k \in \llbracket 0, 6 \rrbracket, \mathbf{P}(X_{n+1} = k) = \mathbf{P}(X_n = k) \times \frac{4+k}{10} + \mathbf{P}(X_n = k-1) \times \frac{7-k}{10}$$

3. Une relation de récurrence :

Par définition, $\mathbf{E}(X_{n+1}) = \sum_{k=0}^6 k \mathbf{P}(X_{n+1} = k)$ donc vu ce qui précède, le terme pour $k=0$ étant nul,

$$\begin{aligned} 10\mathbf{E}(X_{n+1}) &= \sum_{k=1}^6 (k(4+k)\mathbf{P}(X_n = k) + k(7-k)\mathbf{P}(X_n = k-1)) \\ &= \sum_{k=1}^6 (k^2 + 4k)\mathbf{P}(X_n = k) + \sum_{j=0}^5 (j+1)(6-j)\mathbf{P}(X_n = j) \quad \text{par linéarité et glissement d'indices} \\ &= \sum_{k=1}^5 (k^2 + 4k + (k+1)(6-k))\mathbf{P}(X_n = k) + \underbrace{6\mathbf{P}(X_n = 0)}_{j=0} + \underbrace{60\mathbf{P}(X_n = 6)}_{k=6} \\ &= \sum_{k=1}^5 (9k+6)\mathbf{P}(X_n = k) + 6\mathbf{P}(X_n = 0) + 60\mathbf{P}(X_n = 6) \\ &= \sum_{k=0}^6 (9k+6)\mathbf{P}(X_n = k) = 9\mathbf{E}(X_n) + 6 \times 1, \text{ donc } \mathbf{E}(X_{n+1}) = \frac{9}{10}\mathbf{E}(X_n) + \frac{6}{10}. \end{aligned}$$

4. Calcul de l'espérance

On reconnaît une relation des suites arithmético-géométrique. On résout $\ell = \frac{9}{10}\ell + \frac{6}{10}$,

ce qui donne $\ell = 6$. La suite $v_n = \mathbf{E}(X_n) - 6$ est géométrique de raison $\frac{9}{10}$,

$$\text{donc } \forall n \geq 6, v_n = v_6 \left(\frac{9}{10}\right)^{n-6} \text{ et finalement : } \forall n \geq 6, \mathbf{E}(X_n) = v_6 \left(\frac{9}{10}\right)^{n-6} + 6.$$

On en déduit que $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{E}(X_n) = 6$, ce qui revient à dire que, après avoir effectué un très grand nombre de tirages, on aura en moyenne pioché toutes les boules noires.

Exercice 7 :

1. $X \hookrightarrow \mathcal{B}(6, 0.51)$. $\mathbf{E}(X) = 6 \times 0,51 = 3,06$ et $\mathbf{V}(X) = 6 \times 0,51 \times 0,49 = 1,4994$.

2. $X \hookrightarrow \mathcal{B}(365, \frac{1}{125})$. $\mathbf{E}(X) = \frac{365}{125} = 2,92$ et $\mathbf{V}(X) = 365 \times \frac{1}{125} \times \frac{124}{125} = 2,89664$.

3. $X \hookrightarrow \mathcal{B}(\frac{1}{2})$. $\mathbf{E}(X) = \frac{1}{2}$ et $\mathbf{V}(X) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

4. $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(10, \frac{1}{3})$. $\mathbf{E}(Y) = \frac{10}{3}$ et $\mathbf{V}(Y) = \frac{10}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{20}{9}$.

5. $Z \hookrightarrow \mathcal{U}(\llbracket 1, 10 \rrbracket)$. $\mathbf{E}(Z) = \frac{1+10}{2} = \frac{11}{2}$ et $\mathbf{V}(Z) = \frac{10^2-1}{12} = \frac{33}{4}$.

6. $S \hookrightarrow \mathcal{B}(\frac{2}{5})$. $\mathbf{E}(S) = \frac{2}{5}$ et $\mathbf{V}(S) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{25}$.

7. $R \hookrightarrow \mathcal{B}(3, \frac{2}{5})$. $\mathbf{E}(R) = 3 \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$ et $\mathbf{V}(R) = 3 \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{18}{25}$.

$$8. N \hookrightarrow \mathcal{H}(5000, 100, \frac{1}{10}). \quad \mathbf{E}(N) = \frac{100}{10} = 10 \quad \text{et} \quad \mathbf{V}(N) = 100 \times \frac{1}{10} \times \frac{9}{10} \times \frac{5000-100}{5000-1} = \frac{44100}{4999}.$$

$$9. B \hookrightarrow \mathcal{B}(100, \frac{1}{10}). \quad \mathbf{E}(B) = \frac{100}{10} = 10 \quad \text{et} \quad \mathbf{V}(B) = 100 \times \frac{1}{10} \times \frac{9}{10} = 9.$$

Exercice 8 :

Une liste non ordonnée correspond à un sous-ensemble de l'ensemble des n personnes.

On sait qu'un ensemble de cardinal n possède au total 2^n sous-ensembles.

Il y a donc 2^n listes de noms dans l'urne.

Exemple avec $n = 3$: soient les personnes Alain (A), Béatrice (B) et Chloé (C).

Il y a alors dans l'urne les listes : A, B, C, AB, AC, BC, ABC et la liste vide, ce qui fait $8 = 2^3$ listes.

Soit X le nombre de noms sur une liste piochée au hasard.

Sur l'exemple précédent, X peut valoir de 0 (liste vide) à 3 (liste ABC), donc $X(\Omega) = \llbracket 0, 3 \rrbracket$.

On a, par équiprobabilité : $\mathbf{P}(X = 0) = \mathbf{P}(X = 3) = \frac{1}{8}$, et $\mathbf{P}(X = 1) = \mathbf{P}(X = 2) = \frac{3}{8}$.

On voit apparaître une loi binomiale !

Cas général : $X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket$.

Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Alors le nombre de listes de longueur k correspond au nombre de sous-ensembles de cardinal k dans un ensemble à n éléments. On sait donc qu'il est égal au coefficient binomial $\binom{n}{k}$.

Par équiprobabilité : $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \mathbf{P}(X = k) = \frac{\binom{n}{k}}{2^n}$.

On peut alors écrire : $\mathbf{P}(X = k) = \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \binom{n}{k} \times \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k} = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$,

avec $p = \frac{1}{2}$ et $q = 1 - p$. Ainsi : $X \hookrightarrow B(n, \frac{1}{2})$. En conséquence : $\mathbf{E}(X) = \frac{n}{2}$ et $\mathbf{V}(X) = \frac{n}{4}$.

Exercice 9 :

Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note D_i l'événement : « la $i^{\text{ème}}$ pièce testée est défectueuse. »

Détection par un robot :

Au minimum, $X = 1$ lorsque le robot choisit en premier de tester la pièce défectueuse. Au maximum,

$X = n$ lorsqu'il choisit cette pièce en dernier. Ainsi, $X(\Omega) = \llbracket 1, n \rrbracket$.

Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a : $\mathbf{P}(X = k) = \mathbf{P}(D_k)$.

Par équiprobabilité, $\mathbf{P}(D_k) = \frac{1}{n}$, donc $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbf{P}(X = k) = \frac{1}{n}$.

X suit donc une loi uniforme sur $\llbracket 1, n \rrbracket$. En conséquence : $\mathbf{E}(X) = \frac{n+1}{2}$ et $\mathbf{V}(X) = \frac{n^2-1}{12}$.

Détection par un humain :

Maintenant, $Y(\Omega) = \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ car si la pièce défectueuse n'a pas été repérée au cours des $(n-1)$ premiers tests, alors c'est forcément la dernière, et il est inutile de la tester.

Il n'y a aucune différence jusqu'à l'avant dernier test : $\forall k \in \llbracket 1, n-2 \rrbracket, \mathbf{P}(Y = k) = \frac{1}{n}$.

On a donc : $\mathbf{P}(Y = n-1) = \mathbf{P}(\Omega) - \sum_{k=1}^{n-2} \mathbf{P}(Y = k)$

$$= 1 - \sum_{k=1}^{n-2} \frac{1}{n} = 1 - \frac{n-2}{n} = \frac{2}{n}.$$

On calcule alors l'espérance de Y : $\mathbf{E}(Y) = \sum_{k=1}^{n-1} k \mathbf{P}(Y = k) = \sum_{k=1}^{n-2} \frac{k}{n} + (n-1) \times \frac{2}{n}$

donc $\mathbf{E}(Y) = \frac{1}{n} \times \frac{(n-2)(n-1)}{2} + \frac{2(n-1)}{n}$ d'où : $\mathbf{E}(Y) = \frac{(n-1)(n+2)}{2n}$.

Pour la variance, on calcule d'abord $\mathbf{E}(Y^2) = \sum_{k=1}^{n-1} k^2 \mathbf{P}(Y = k) = \sum_{k=1}^{n-2} \frac{k^2}{n} + (n-1)^2 \times \frac{2}{n}$,

donc $\mathbf{E}(Y^2) = \frac{1}{n} \times \frac{(n-2)(n-1)(2n-3)}{6} + \frac{2(n-1)^2}{n} = \frac{n-1}{6n} (2n^2 + 5n - 6)$.

On utilise ensuite la formule de König-Huygens :

$$\mathbf{V}(Y) = \mathbf{E}(Y^2) - \mathbf{E}(Y)^2 = \frac{n-1}{6n} (2n^2 + 5n - 6) - \left(\frac{(n-1)(n+2)}{2n} \right)^2$$

Après calculs, on trouve : $\mathbf{V}(Y) = \frac{n-1}{12n^2} (n^3 + n^2 - 12n + 12)$

et on peut factoriser : $\mathbf{V}(Y) = \frac{(n-1)(n-2)(n^2 + 3n - 6)}{12n^2}$.

Exercice 10 : Les sauts de puce.

Loi de S_n :

$$S_n \text{ suit une loi binomiale de paramètres } n \text{ et } \frac{1}{2} : S_n \hookrightarrow \mathcal{B}(n, \frac{1}{2}), \quad \mathbf{E}(S_n) = \frac{n}{2}, \quad \mathbf{V}(S_n) = \frac{n}{4}.$$

Position X_n de la puce après n sauts :

On peut exprimer facilement X_n en fonction de S_n . En effet,

si la puce a effectué S_n sauts de taille 2, alors elle a aussi effectué $(n - S_n)$ sauts de taille 1.

Son abscisse après tous ces sauts est donc : $X_n = 2 \times S_n + 1 \times (n - S_n)$, donc $X_n = n + S_n$.

On en déduit par linéarité de l'espérance : $\mathbf{E}(X_n) = n + \mathbf{E}(S_n) = \frac{3n}{2}$.

et par propriété de la variance : $\mathbf{V}(X_n) = \mathbf{V}(S_n) = \frac{n}{4}$.

Pour exprimer la loi de X_n , on décale de n le support de S_n : $X_n(\Omega) = \llbracket n, 2n \rrbracket$.

Et on a : $\forall k \in \llbracket n, 2n \rrbracket, [X_n = k] = [n + S_n = k] = [S_n = k - n]$,

donc $\forall k \in \llbracket n, 2n \rrbracket, \mathbf{P}(X_n = k) = \mathbf{P}(S_n = k - n) = \binom{n}{k-n} p^{k-n} q^{n-(k-n)}$, où $p = \frac{1}{2}$ et $q = 1 - p = \frac{1}{2}$.

Après simplifications : $\forall k \in \llbracket n, 2n \rrbracket, \mathbf{P}(X_n = k) = \binom{n}{k-n} \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Exercice 11 : Les ampoules défectueuses.

1) Conditionnement par boîtes dont le contenu ne provient que d'une seule machine.

X est le nombre d'ampoules défectueuses dans une boîte de n ampoules, donc $0 \leq X \leq n$: $X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket$.

Soit $0 \leq k \leq n$. Notons A l'événement : « La boîte ouverte provient de la machine A ».

Alors $(A, \bar{A})$ forme un système complet d'événements. D'après la formule des probabilités totales :

$$\mathbf{P}(X = k) = \mathbf{P}(A) \times \mathbf{P}_A(X = k) + \mathbf{P}(\bar{A}) \times \mathbf{P}_{\bar{A}}(X = k).$$

L'énoncé donne : $\mathbf{P}(A) = \frac{3}{4}$ donc $\mathbf{P}(\bar{A}) = \frac{1}{4}$.

Par ailleurs, $\mathbf{P}_A(X = k) = \binom{n}{k} 0, 1^k \times 0, 9^{n-k}$, et $\mathbf{P}_{\bar{A}}(X = k) = \binom{n}{k} 0, 2^k \times 0, 8^{n-k}$.

On obtient donc : $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \mathbf{P}(X = k) = \binom{n}{k} \left(\frac{3}{4} \times 0, 1^k \times 0, 9^{n-k} + \frac{1}{4} \times 0, 2^k \times 0, 8^{n-k} \right)$.

Le calcul de l'espérance donne : $\mathbf{E}(X) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} \left(\frac{3}{4} \times 0, 1^k \times 0, 9^{n-k} + \frac{1}{4} \times 0, 2^k \times 0, 8^{n-k} \right)$

donc par linéarité : $\mathbf{E}(X) = \frac{3}{4} \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} 0, 1^k \times 0, 9^{n-k} + \frac{1}{4} \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} 0, 2^k \times 0, 8^{n-k}$.

On reconnaît deux fois la formule de l'espérance pour une loi binomiale, donc : $\mathbf{E}(X) = \frac{3}{4} \times 0, 1n + \frac{1}{4} \times 0, 2n$.

En conclusion : $\mathbf{E}(X) = \frac{n}{8}$.

2) Une probabilité conditionnelle :

On demande $\mathbf{P}_{[X=0]}(A) = \frac{\mathbf{P}(A \cap [X=0])}{\mathbf{P}(X=0)} = \frac{\mathbf{P}(A) \times \mathbf{P}_A(X=0)}{\mathbf{P}(X=0)} = \frac{\frac{3}{4} \times 0, 9^n}{\frac{3}{4} \times 0, 9^n + \frac{1}{4} \times 0, 8^n}$.

Ainsi, $\mathbf{P}_{[X=0]}(A) = \frac{3 \times 0, 9^n}{3 \times 0, 9^n + 0, 8^n} = \frac{3}{3 + \left(\frac{8}{9}\right)^n}$.

3) Conditionnement par boîtes dont le contenu est mélangé.

Dans chaque boîte, chaque ampoule a maintenant 3 chances sur 4 de provenir de la machine A, et 1 chance sur 4 de provenir de la machine B.

Pour chaque ampoule, la probabilité d'être défectueuse est donc : $p = \frac{3}{4} \times 0,1 + \frac{1}{4} \times 0,2 = \frac{1}{8}$.

La VAR Y suit donc une loi binomiale de paramètres n et $p = \frac{1}{8}$.

$Y \hookrightarrow \mathcal{B}(n, \frac{1}{8}), \mathbf{E}(Y) = \frac{n}{8}$. On remarque que $\mathbf{E}(X) = \mathbf{E}(Y)$: cette seconde façon de conditionner n'a pas changé le nombre moyen d'ampoules défectueuses par boîte.

Exercice 12 : Détecter les erreurs

1) Erreurs détectées lors d'une seule relecture :

On note X le nombre d'erreurs détectées lors d'une relecture.

Chaque erreur a une probabilité $p = 0,75$ d'être détectée, indépendamment des autres.

X suit donc une loi binomiale de paramètres k et $p = 0,75$.

Le nombre moyen d'erreurs détectées lors d'une relecture est : $\mathbf{E}(X) = k \times p = 0,75k$.

2) Erreurs détectées lors de 36 relectures indépendantes :

Chacune des k erreurs a une probabilité $(1-p)^{36} = 0,25^{36} = 2^{-72}$ de ne jamais être détectée, donc une probabilité $p' = 1 - 2^{-72}$ d'être détectée par au moins un des 36 relecteurs.

On note Y le nombre d'erreurs détectées après 42 relectures.

Alors Y suit une loi binomiale de paramètres k et $p' = 1 - 2^{-72}$.

Son espérance vaut donc $\mathbf{E}(Y) = k(1 - 2^{-72})$.

Exercice 8 :

L'écart Z entre les numéros piochés est au minimum de 1 car on ne peut pas piocher deux fois la même boule, et au maximum de $n^2 - 1$, lorsque les boules numéro 1 et n^2 sont piochées.

Ainsi, $Z(\Omega) = \llbracket 1, n^2 - 1 \rrbracket$.

Soit $k \in Z(\Omega)$. L'événement $[Z = k]$ est l'événement « l'écart entre les numéros piochés vaut k », donc que les boules $\{1, k+1\}$, ou $\{2, k+2\}$ ou ... ou $\{n^2 - k, n^2\}$ ont été piochées.

Puisqu'il y a au total $\binom{n^2}{2} = \frac{n^2(n^2 - 1)}{2}$ tirages possibles, parmi lesquels $n^2 - k$ réalisent l'événement

$[Z = k]$, on a par équiprobabilité : $\forall k \in \llbracket 1, n^2 - 1 \rrbracket, \mathbf{P}(Z = k) = \frac{2(n^2 - k)}{n^2(n^2 - 1)}$.

Enfin, Z est un carré parfait si et seulement si $Z = 1$ ou 4 ou 9 ou ... ou $(n-1)^2$.

Notons C l'événement « Z est un carré parfait ».

$$\begin{aligned} \text{Alors } \mathbf{P}(C) &= \sum_{k=1}^{n-1} \mathbf{P}(Z = k^2) = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2(n^2 - k^2)}{n^2(n^2 - 1)} \text{ d'après la loi de } Z, \\ &= \frac{2(n-1)n^2}{n^2(n^2 - 1)} - \frac{2}{n^2(n^2 - 1)} \sum_{k=1}^{n-1} k^2, \text{ par linéarité de la somme, et en calculant} \\ &= \frac{2}{n+1} - \frac{2}{n^2(n^2 - 1)} \times \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}, \text{ la première somme, qui est une somme de constantes,} \\ &= \frac{2}{n+1} - \frac{2(2n-1)}{6n(n+1)} \text{ d'après une somme usuelle,} \\ & \text{ après simplifications, puis on réduit :} \end{aligned}$$

La probabilité que Z soit un carré parfait est : $\frac{4n+1}{3n(n+1)}$.