Corrigé du DS n°7

$$\text{Exercice 1 : } f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$$

1. $\mathcal{D}_f = \mathbf{R}^*$, centré en 0. $\forall x \neq 0$, $f(x) = \frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{\sin(x)}{x} = f(x)$ donc f est paire.

2. $\forall x \neq 0$, $0 \leq |f(x)| \leq \frac{1}{|x|}$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$. D'après le théorème des gendarmes : $\lim_{\pm\infty} f = 0$.

La courbe représentative de f admet l'axe des abscisses comme asymptote horizontale en $\pm\infty$.

3. $\sin(x) \underset{0}{\sim} x$ donc $f(x) \underset{0}{\sim} \frac{x}{x} = 1$. Ainsi, $\lim_0 f = 1$.

En posant $f(0) = 1$, on obtient donc un prolongement continu de f sur $\mathbf{R}$.

4. Soit $x \neq 0$. Par opérations, f est dérivable en x et $f'(x) = \frac{x \cos(x) - \sin(x)}{x^2}$.

5. Soit $h \neq 0$. Le taux d'accroissement de f en 0 est : $\Delta_0(h) = \frac{f(h) - f(0)}{h}$.

$$\Delta_0(h) = \frac{\frac{\sin h}{h} - 1}{h} = \frac{\sin h - h}{h^2} = \frac{\sin h - h}{h^2} \sim -\frac{h}{6}, \text{ donc } \lim_{h \rightarrow 0} \Delta_0(h) = 0.$$

Ainsi : f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

6. Soit $x \in [-2\pi, 2\pi]$. Alors $f(x) = 0 \Leftrightarrow \sin(x) = 0$ et $x \neq 0$
 $\Leftrightarrow x \in \{-2\pi, -\pi, \pi, 2\pi\}$.

Sur les intervalles $[-2\pi, -\pi]$, $[-\pi, \pi]$ et $[\pi, 2\pi]$, f vérifie les hypothèses du théorème de Rolle :
 f est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et $f(a) = f(b)$.

On sait donc que f' s'annule (au moins) une fois sur $]a, b[$.

f' possède au moins trois racines, une dans chacun de ces intervalles.

7. g est dérivable sur $\mathbf{R}$ par opérations et : $\forall x \in \mathbf{R}$, $g'(x) = -x \sin(x)$.
 g' est donc du signe de $-\sin(x)$ sur $[0, 2\pi]$:

x	0	π	α	2π
$g'(x)$	0	-	0	+
g	0			2π

$\swarrow$ $-\pi$ $\searrow$

8. D'après le tableau de variations précédent, $g(x) = 0$ admet sur $[0, \pi]$ une unique solution : 0.

Sur l'intervalle $[\pi, 2\pi]$, g est strictement croissante et continue.

Elle réalise donc une bijection de $[\pi, 2\pi]$ vers $[g(\pi), g(2\pi)] = [-\pi, 2\pi]$.

$0 \in [-\pi, 2\pi]$ possède donc un unique antécédent $\alpha \in [\pi, 2\pi]$ par g .

9. $\forall x \neq 0$, $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ et le signe de $g(x)$ sur $[0, 2\pi]$ découle du tableau précédent.

x	0	α	2π
$f'(x)$	0	-	+
f	1		0

$\swarrow$ $f(\alpha)$ $\searrow$

10. On voit dans ce tableau que $f(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\alpha} < 0$.

Mais $g(\alpha) = 0$ donc $\alpha \cos(\alpha) - \sin(\alpha) = 0$, donc $\frac{\sin(\alpha)}{\alpha} = \cos(\alpha)$.

Finalement, $\cos(\alpha) < 0$. Ainsi, $\alpha \in \left] \pi, \frac{3\pi}{2} \right[$.

11. Allure de la courbe représentative de f sur $[0, 2\pi]$:

Rappel : f est paire, donc $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Exercice 2 : Variables aléatoires

1. X suit une loi uniforme : $X \hookrightarrow \mathcal{U}(\llbracket 1, 6 \rrbracket)$, $\mathbf{E}(X) = \frac{7}{2}$, $\mathbf{V}(X) = \frac{35}{12}$.

2. On peut piocher entre 0 et 6 fois la boule noire : $Y(\Omega) = \llbracket 0, 6 \rrbracket$.

3. Si $X = i$, alors on effectue i tirages dans l'urne, indépendants.

Chacun peut donner un succès (piocher la boule noire) de probabilité $p = \frac{1}{n}$, ou un échec.

Y compte donc le nombre de succès dans la répétition de i épreuves de Bernoulli, indépendantes, et de même paramètre $\frac{1}{n}$.

Lorsque $X = i$, Y suit une loi binomiale de paramètres i et $\frac{1}{n}$.

4. Soit $j \in Y(\Omega) \setminus \{0\}$.

Les événements $[X = 1], \dots, [X = 6]$ forment un système complet d'événements.

D'après la formule des probabilités totales : $\mathbf{P}(Y = j) = \sum_{i=1}^6 \mathbf{P}(X = i) \times \mathbf{P}_{[X=i]}(Y = j)$.

D'après les questions précédentes, $\mathbf{P}(X = i) = \frac{1}{6}$ indépendamment de i ;

et si $j \leq i$, alors $\mathbf{P}_{[X=i]}(Y = j) = \binom{i}{j} p^j q^{i-j}$ avec $p = \frac{1}{n}$ et $q = 1 - p$.

Mais si $j > i$, alors $[Y = j]$ est impossible : $\mathbf{P}_{[X=i]}(Y = j) = 0$.

On obtient donc : $\forall j \in \llbracket 1, 6 \rrbracket, \mathbf{P}(Y = j) = \frac{1}{6} \sum_{i=j}^6 \binom{i}{j} p^j q^{i-j}$ où $p = \frac{1}{n}$ et $q = 1 - p$.

5. Par définition, $\mathbf{E}(Y) = \sum_{j \in Y(\Omega)} j \times \mathbf{P}(Y = j)$. Mais le terme correspondant à $j = 0$ est nul, donc :

$$\mathbf{E}(Y) = \sum_{j=1}^6 j \times \frac{1}{6} \sum_{i=j}^6 \binom{i}{j} p^j q^{i-j} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^i j \binom{i}{j} p^j q^{i-j} \quad (\text{somme double triangulaire})$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^i i \binom{i-1}{j-1} p^j q^{i-j} \quad (\text{lemme du pion}) \\
&= \frac{p}{6} \sum_{i=1}^6 i \sum_{j=0}^{i-1} \binom{i-1}{j} p^j q^{(i-1)-j} \quad (\text{glissement d'indices, et } p^{j+1} = p \times p^j) \\
&= \frac{p}{6} \sum_{i=1}^6 i(p+q)^{i-1} \quad (\text{somme de Newton, puis } p+q=1) \\
&= \frac{p}{6} \times \frac{6 \times 7}{2} \quad (\text{somme usuelle des premiers entiers naturels, puis } p = \frac{1}{n})
\end{aligned}$$

En conclusion : $\mathbf{E}(Y) = \frac{7}{2n}$.

$$\begin{aligned}
6. \mathbf{E}(G) &= \sum_{g \in G(\Omega)} g \times \mathbf{P}(G=g) = -a \times \mathbf{P}(G=-a) + \sum_{g=1}^6 g \times \mathbf{P}(G=g) \\
&= -a\mathbf{P}(Y=0) + \sum_{g=1}^6 g \times \mathbf{P}(Y=g), \quad \text{et on reconnaît } \mathbf{E}(Y)
\end{aligned}$$

Conclusion : $\mathbf{E}(G) = \mathbf{E}(Y) - a\mathbf{P}(Y=0)$.

7. Il faut calculer $\mathbf{P}(Y=0)$.

D'après le SCE de la question 5. et la FPT :

$$\begin{aligned}
\mathbf{P}(Y=0) &= \sum_{i=1}^6 \mathbf{P}(X=i) \times \mathbf{P}_{[X=i]}(Y=0) \\
&= \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 q^i = \frac{q}{6} \sum_{i=0}^5 q^5 = \frac{q}{6} \times \frac{1-q^6}{1-q} \quad (\text{somme géométrique de raison } q \neq 1)
\end{aligned}$$

$$\text{donc } \mathbf{P}(Y=0) = \frac{q}{6} \times \frac{1-q^6}{p}.$$

$$\text{Finalement, } \mathbf{E}(G) = \frac{7}{2n} - a \times \frac{q}{6} \times \frac{1-q^6}{p} \quad \text{et en remplaçant } q = 1-p \text{ et } p = \frac{1}{n},$$

$$\text{on obtient : } \mathbf{E}(G) = \frac{7}{2n} - \frac{a(n-1)}{6} \times \left(1 - \left(\frac{n-1}{n}\right)^6\right).$$

8. Le jeu est équilibré quand le gain moyen est nul :

$$\mathbf{E}(G) = 0 \Leftrightarrow a = \frac{7}{2n} \times \frac{6}{n-1} \times \frac{1}{1-q^6}, \text{ soit : } a_n = \frac{21}{n(n-1)} \times \frac{1}{1 - \left(\frac{n-1}{n}\right)^6}.$$

$$\text{D'une part : } n(n-1) \underset{+\infty}{\sim} n^2, \text{ et d'autre part : } \left(1 - \frac{1}{n}\right)^6 - 1 \underset{+\infty}{\sim} -\frac{6}{n},$$

$$\text{donc } 1 - \left(\frac{n-1}{n}\right)^6 \underset{+\infty}{\sim} \frac{6}{n}.$$

$$\text{Par opérations sur les équivalents, } a_n \underset{+\infty}{\sim} \frac{21}{n^2} \times \frac{n}{6} \text{ donc } a_n \underset{+\infty}{\sim} \frac{7}{2n} = \mathbf{E}(Y).$$

9. Simulation informatique

```

import random as rd
def X():
    return rd.randint(1,6)
def urne(n) :
    return [1]+[0]*(n-1)
def Y(n) :
    x = X()
    U = urne(n)
    noires = 0
    for _ in range(x) :
        noires += rd.choice(U)
    return noires

def gain(n,a) :
    noires = Y(n)
    if noires > 0 : return noires
    else : return -a
def gainMoyen(n,a,N) :
    M = 0
    for _ in range(N) :
        M += gain(n,a)
    return M/N

```

Exercice 3 : Suite d'intégrales

Soit pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1 + \sin x} dx$$

1. La fonction $x \mapsto \frac{x^n}{1 + \sin x}$ est continue sur $[0, 1]$, car :

- $x \mapsto x^n$ est continue sur $[0, 1]$
- $1 + \sin x \geq 0$ sur $[0, 1]$, et même strictement > 0

Donc I_n est bien défini.

2. $\forall x \in [0, 1] \Rightarrow x^{n+1} \leq x^n$. Ainsi :

$$\frac{x^{n+1}}{1 + \sin x} \leq \frac{x^n}{1 + \sin x} \Rightarrow I_{n+1} \leq I_n$$

Donc la suite (I_n) est décroissante.

3. $\forall x \in [0, 1]$, on a $0 \leq \sin x \leq \sin 1 \leq 1$, donc :

$$1 \leq 1 + \sin x \leq 2 \Rightarrow \frac{1}{2} \leq \frac{1}{1 + \sin x} \leq 1$$

En multipliant par x^n (positif sur $[0, 1]$), on obtient :

$$\frac{x^n}{2} \leq \frac{x^n}{1 + \sin x} \leq x^n$$

4. On intègre sur $[0, 1]$:

$$\int_0^1 \frac{x^n}{2} dx \leq I_n \leq \int_0^1 x^n dx \Rightarrow \frac{1}{2(n+1)} \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$$

5. D'après l'encadrement :

$$\frac{1}{2(n+1)} \leq I_n \leq \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow I_n \rightarrow 0 \quad (\text{théorème des gendarmes})$$

6. On a :

$$J_n = \int_0^1 \frac{x^{n+1} \cos x}{(1 + \sin x)^2} dx$$

Posons $u(x) = \frac{1}{1 + \sin x}$, alors : $u'(x) = \frac{-\cos x}{(1 + \sin x)^2}$

$v(x) = x^n$, alors $v(x) = \frac{1}{n+1} x^{n+1}$

avec les fonctions u et v qui sont C1 sur $[0, 1]$ donc par intégration par parties :

$$I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1 + \sin x} dx = \frac{1}{n+1} \left[\frac{x^{n+1}}{1 + \sin x} \right]_0^1 + \frac{1}{n+1} J_n = \frac{1}{(n+1)(1 + \sin 1)} + \frac{1}{n+1} J_n$$

7. On a :

$$|J_n| \leq \int_0^1 \left| \frac{x^{n+1} \cos x}{(1 + \sin x)^2} \right| dx \leq \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1 + \sin x} dx = I_{n+1}$$

(car $|\cos x| \leq 1$ et $(1 + \sin x)^2 \geq 1$)

8. On a :

$$I_n = \frac{1}{(n+1)(1 + \sin 1)} + \frac{1}{n+1} J_n \quad \text{avec } |J_n| \leq I_{n+1} \leq \frac{1}{n+2} \Rightarrow \left| \frac{1}{n+1} J_n \right| \leq \frac{1}{(n+1)(n+2)} \rightarrow 0$$

Donc :

$$I_n \sim \frac{1}{n(1 + \sin 1)} \quad \text{et } \lambda = \frac{1}{1 + \sin 1}$$

$$I_n \sim \frac{1}{n(1 + \sin 1)}$$

Exercice 4 : Une primitive de $f : x \mapsto \sin(\ln x)$

1. Existence de primitives :

f est continue sur $\mathbf{R}_+^*$, donc elle y admet des primitives.

Sur l'intervalle $\mathbf{R}_+^*$, si F est une primitive de f , alors l'ensemble des primitives de f est l'ensemble des fonctions G telle que : $G = F + \lambda$, où λ est une constante réelle.

2. Une double PPP :

On pose $u(t) = e^t$ et $v(t) = \sin(t)$. Alors u, v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbf{R}$, et :

$\forall t \in \mathbf{R}$, $u'(t) = e^t$ et $v'(t) = \cos(t)$.

Par primitivation par parties (PPP), on a : $\int \sin(t)e^t dt = \sin(t)e^t - \int \cos(t)e^t dt$.

On pose maintenant $u(t) = e^t$ et $v(t) = \cos(t)$.

Alors $u, v \in \mathcal{C}^1(\mathbf{R})$ et $\forall t \in \mathbf{R}$, $u'(t) = e^t$ et $v'(t) = -\sin(t)$.

Par seconde PPP, on a : $\int \cos(t)e^t dt = \cos(t)e^t - \int (-\sin t)e^t dt$.

Enfinement : $\int \sin(t)e^t dt = \sin(t)e^t - \cos(t)e^t - \int \sin(t)e^t dt$.

Donc : $2 \int g(t) dt = (\sin t - \cos t)e^t$ et $\int \sin(t)e^t dt = \frac{e^t}{2}(\sin t - \cos t) + \lambda$ ($\lambda \in \mathbf{R}$).

3. Primitive de f :

On effectue le changement de variables : $t = \ln x$. On a alors : $x = e^t$ donc $\frac{dx}{dt} = e^t$, soit : $dx = e^t dt$.

Il vient : $\int \sin(\ln x) dx = \int \sin(t)e^t dt = \frac{e^t}{2}(\sin t - \cos t)$ d'après la question précédente.

Ainsi, $F(x) = \frac{e^{\ln x}}{2}(\sin(\ln x) - \cos(\ln x))$,

soit : $F(x) = \frac{x}{2}(\sin(\ln x) - \cos(\ln x))$ est une primitive de f sur $\mathbf{R}_+^*$.