Coefficients binomiaux

BCPST 1C – Mme MOREL

1 Définition et premières propriétés

1.1 Définition

Soient deux entiers $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{Z}$. Le coefficient binômial $\binom{n}{p}$, qui se lit "p parmi n" est défini par:

$$\boxed{\binom{n}{p} = \begin{array}{|ll} 0 & \text{si } p < 0 \text{ ou } p > n \\ \dfrac{n(n-1)\dots(n-p+1)}{p!} & \text{sinon} \end{array}}$$

Remarque 1 :

(1) On peut aussi trouver la notation C_n^p.

(2) Ecriture avec factorielles: $\forall 0 \leqslant p \leqslant n$, $\boxed{\binom{n}{p} = \dfrac{n!}{p!\,(n-p)!}}$

En effet:

(3) Le nombre entier (voir la preuve dans la partie 2.1) $\binom{n}{p}$ a une interprétation en dénombrement: c'est le nombre de façons de choisir **simultanément** p éléments parmi n.

1.2 Propriétés

***Proposition 1* :**

(1) $\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ \binom{n}{0} = 1 = \binom{n}{n}}$ *(2)* $\boxed{\forall n \geqslant 2,\ \binom{n}{2} = \dfrac{n\,(n-1)}{2}}$

Preuve:

■

***Proposition 2* (formule de symétrie)** $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall 0 \leqslant p \leqslant n,\ \binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$.

Preuve:

■

Proposition 3 **(formule du chef)** *Pour tout entier* $p, n \in \mathbb{N}$ *tels que* $1 \leqslant p \leqslant n$, $\binom{n}{p} = \frac{n}{p}\binom{n-1}{p-1}$.

Preuve:

■

2 Formule du binôme de Newton

2.1 Triangle de Pascal

Proposition 4 **(formule de Pascal):**
$\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall 0 \leqslant p \leqslant n$, $\binom{n}{p} + \binom{n}{p+1} = \binom{n+1}{p+1}$.

Preuve:
$\forall\, 0 \leqslant p \leqslant n-1$ $(p+1 \leqslant n)$:

Si $p = n$:

■

Remarque 2 : Illustration du triangle de Pascal.

Proposition 5 *Les coefficients binomiaux sont des nombres entiers.*

Preuve:

$*$ Si $p < 0$ ou $p > n$:

$*$ Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$, la propriété $\mathcal{P}_n$: "$\forall 0 \leqslant p \leqslant n\,,\ \binom{n}{p} \in \mathbb{N}$".

$n = 0$:

Supposons que à un certain rang $n \geqslant 0$, $\forall 0 \leqslant p \leqslant n\,,\ \binom{n}{p} \in \mathbb{N}$.

Au rang $n+1$: montrons que $\forall 0 \leqslant p \leqslant n+1\,,\ \binom{n+1}{p} \in \mathbb{N}$.

2.2 Binôme de Newton

Théorème 1 **Binôme de Newton:**

$\forall a, b \in \mathbb{C}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\boxed{(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k\, b^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} b^k\, a^{n-k}}$

Remarque 3 : Il s'agit d'une généralisation des égalités remarquables:
$(a+b)^2 = a^2 + 2\,ab + b^2$ et $(a-b)^2 = a^2 - 2\,ab + b^2$.

CAPACITÉ EXIGIBLE 1 : utilisation du triangle de Pascal pour la formule du binôme.

Exemple 1 $\boxed{(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \text{ et } (a-b)^3 = a^3 + 3ab^2 - 3a^2b - b^3}$

POINT METHODE 1 : Appliquer la formule du binôme.

Exercice 1 (choisir judicieusement deux réels a et b) Montrer que $\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n}$

Exercice 2 (se ramener à la formule en "ciblant" les problèmes un par un)

Pour tout entier $n \geqslant 1$, et tout réel non nul x, calculer la somme: $\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} x^{k-1}$.