

Fonctions – calcul de dérivées

Remarque 1 Une formule est toujours accompagnée d'un **DOMAINE DE VALIDITÉ** !!!!

I. Opérations algébriques

Proposition 1 Soient f et g deux fonctions dérivables sur un même intervalle I .

- (1) $f + g$ est dérivable sur I et $(f + g)' = f' + g'$.
- (2) $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, λf est dérivable sur I et $(\lambda f)' = \lambda f'$.
- (3) $f g$ est dérivable sur I et $(f g)' = f' g + f g'$.
- (4) Si g ne s'annule pas sur I alors $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ sont dérivables sur I et $\left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2}$ et $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' g - f g'}{g^2}$.

Dérivées des fonctions usuelles:

Fonction	Ensemble de définition	Ensemble de dérivation	Dérivée
x^n	\mathbb{R} si $n \in \mathbb{N}$ \mathbb{R}^* si $n < 0$	$]-\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$ si $n < 0$	$n x^{n-1}$
\sqrt{x}	$]0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\ln x$	$]0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$\frac{1}{x}$
e^x	\mathbb{R}	\mathbb{R}	e^x
x^α ($\alpha \in \mathbb{R}$)	$]0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$\alpha x^{\alpha-1}$
$\sin x$	\mathbb{R}	\mathbb{R}	$\cos x$
$\cos x$	\mathbb{R}	\mathbb{R}	$-\sin x$
$\tan x$	$\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$	$\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$

Exemple 1 $\tan = \frac{\sin}{\cos}$ est dérivable sur chaque intervalle de $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$ en tant que:

* quotient de fonctions dérivables (dont le dénominateur ne s'annule pas):

$$\tan' = \dots$$

* produit de fonctions dérivables: $\tan' = \dots$

Conclusion:

Exercice 1 Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \sqrt{x}(x^2 - x + 1)$

4. $g(x) = \frac{\sqrt{x}}{x^2 + 1}$

6. $u(x) = x^2 \cos x$

2. $f(x) = 2(x - 1)e^x + 1$

5. $h(x) = \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} + 1}$

7. $v(x) = \frac{1}{\sin x}$

3. $g(x) = 5e^x - x^2$

Exercice 2 Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \sqrt{x} + 2x$

4. $g(x) = \frac{1}{3x^2 - 5x + 1}$

7. $v(x) = \frac{\ln x}{1 + x^2}$

2. $f(x) = x - \ln x - \frac{1}{x}$

5. $h(x) = \frac{x - 1}{x^2 + 2x + 3}$

8. $g(x) = \frac{x \ln x}{1 + x}$

3. $f(x) = (x - 2)e^x + x + 2$

6. $u(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x^3 + 2x}$

II. Composée

Proposition 2 Soient f une fonction dérivable sur un intervalle I , g dérivable sur un intervalle J avec $f(I) \subset J$. Alors $g \circ f$ est dérivable sur I et $(g \circ f)' = g' \circ f \times f'$.

Exemple 2 : composées usuelles.

(1) Si f est dérivable sur I alors $\forall n \in \mathbb{N}$, f^n est dérivable sur et $(f^n)' = \dots$

(2) Si f est dérivable sur I alors $\sin f$ et $\cos f$ sont dérivables sur et $(\sin f)' = \dots$ et $(\cos f)' = \dots$

(3) Si f est dérivable sur I alors e^f est dérivable sur et: $(e^f)' = \dots$

(4) Si f est dérivable sur I et $\forall x \in I$, alors \sqrt{f} est dérivable sur I et $(\sqrt{f})' = \dots$

(5) Si f est dérivable sur I et $\forall x \in I$, alors $\ln f$ est dérivable sur I et $(\ln f)' = \dots$

Remarque 2 : ATTENTION!

Ces propositions donnent une condition SUFFISANTE mais pas une condition NÉCESSAIRE!!

Il est possible de faire des opérations sur des fonctions non dérivables et d'obtenir une fonction dérivable.

contre-exemple: $f(x) = \sqrt{x^4} = x^2$ est dérivable en 0!

contre-exemple: $g(x) = (\sqrt{x})^2 = x$ est dérivable en 0!

Dérivées des composées usuelles

Fonction	Ensemble de définition	Ensemble de dérivation	Dérivée
u^n ($n \in \mathbb{N}$)	\mathcal{D}_u	$\mathcal{D}_{u'}$	$n u' u^{n-1}$
$\frac{1}{u}$	$u \neq 0$ sur I	$I \subset \mathcal{D}_{u'}$ et $u \neq 0$ sur I	$-\frac{u'}{u^2}$
\sqrt{u}	$u \geq 0$ sur I	$I \subset \mathcal{D}_{u'}$ et $u > 0$ sur I	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$\ln u $	$u \neq 0$ sur I	$I \subset \mathcal{D}_{u'}$ et $u \neq 0$ sur I	$\frac{u'}{u}$
e^u	\mathcal{D}_u	$\mathcal{D}_{u'}$	$u' e^u$
u^α ($\alpha \in \mathbb{R}$)	$u > 0$ sur I	$I \subset \mathcal{D}_{u'}$ et $u > 0$ sur I	$\alpha u' u^{\alpha-1}$
$\sin u$	\mathcal{D}_u	$\mathcal{D}_{u'}$	$u' \cos u$
$\cos u$	\mathcal{D}_u	$\mathcal{D}_{u'}$	$-u' \sin u$
$\tan u$	$u \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ sur I	$I \subset \mathcal{D}_{u'}$ et $u \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ sur I	$u' (1 + \tan^2 u) = \frac{u'}{\cos^2 u}$

Exercice 3 Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1. $f(x) = 2e^{-x} + 6x^3 - 3e^5$

2. $f(x) = -8xe^{-3x+1}$

3. $f(x) = x \sin(-3x + 4)$

4. $g(x) = \sqrt{x-2}(x^2 - 1)$

5. $h(x) = 4 \cos x + \cos^2 x$

6. $u(x) = \cos(-2x + 4) \sin(-3x + 2)$

7. $v(x) = \sin^2(2x)$

8. $g(x) = e^{-x} (-\cos x + \sin x + 1)$

9. $u(x) = \frac{\sqrt{3-x}}{x^3}$

10. $v(x) = \frac{1}{\sqrt{1-2x}}$

11. $u(x) = (3x^2 - x) \ln(x - 2)$

12. $u(x) = e^{3 \sin(2x)}$

13. $u(x) = \frac{2x^2 + 3x}{\ln x}$

Exercice 4 Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \cos(2x + 1)$

2. $g(x) = \sin(\sqrt{x})$

3. $h(x) = e^{\cos x}$

4. $u(x) = (3x^2 + 4x - 6)^{-4}$

5. $v(x) = (\tan x - 1)^2$

6. $w(x) = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$

7. $s(x) = \sqrt{\ln x}$

8. $f(x) = \frac{\sqrt{x} e^{2x}}{x^2 + 1}$

9. $g(x) = \frac{\sin(2x)}{\cos(3x)}$

10. $h(x) = \ln(\sqrt{x^2 + 3})$

11. $u(x) = \sqrt{e^{-2x+1}}$

12. $v(x) = (\sin(x^2 + 5x + 1))^2$

13. $w(x) = \left(\frac{e^{\sin x} - 1}{x}\right)^3$

14. $f(x) = \ln|x^2 - 3x + 2|$

15. $g(x) = xe^{-\frac{3}{|x|}}$

16. $h(x) = \sqrt{|1 - x^2|}$

Exercice 5 Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1. $g(x) = \frac{1}{x} e^{-\frac{1}{x}}$

2. $v(x) = \ln(1 + e^x)$

3. $h(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

4. $w(x) = \exp\left(1 - \frac{1}{(\ln|x|)^2 + 1}\right)$

5. $f(x) = \cos(3x) \cos^3 x$

6. $f(x) = \frac{\sin x}{1 + \sin x}$

7. $u(x) = (3 \cos x - \sin x)^3$

8. $u(x) = \frac{x}{\sqrt{9 - x^2}}$