

## Fonctions réelles de deux variables

### I. Calcul de dérivées partielles.

**Exercice 1** Calculer, quand elles existent, les dérivées partielles des fonctions:

$$a(x, y) = \frac{x}{y} + \frac{y}{x} \quad b(x, y) = x^2 y \cos(2x + y) \quad c(x, y) = \sqrt{y - \frac{1}{2}} \ln(1 - x^2 - y^2)$$

$$f(x, y) = x^2 y^2 \arctan\left(\frac{x - y}{x + y}\right) \quad g(x, y) = x^{(y^x)} \quad h(x, y) = y e^{-(x^2 + y)}.$$

**Exercice 2** Soit  $V$  une application de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^2$ . Calculer la dérivée de la fonction  $\Phi$  définie sur  $\mathbb{R}_+^*$  par:

$$\forall t \in \mathbb{R}, \Phi(t) = V(t^2 + 1, e^t + \ln t - 1).$$

### II. Recherche d'extremum.

**Exercice 3** On considère la fonction  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ .

1. Calculer les dérivées partielles de  $f$ .
2. Montrer qu'il existe un unique couple  $(x_0, y_0)$  de  $\mathbb{R}^2$  tel que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0.$$

3. Étudier le signe du trinôme  $X^2 + X + 1$ .
4. En remarquant que  $x^2 + xy + y^2 = y^2 \left( \left(\frac{x}{y}\right)^2 + \frac{x}{y} + 1 \right)$  quand  $y \neq 0$ , montrer que  $f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$ ,  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ . Interpréter ce résultat.

**Exercice 4** On pose  $f(x, y) = 4x^2 - 2xy + 7y^2 + 4$ .

1. Déterminer les dérivées partielles de  $f$ .
2. Montrer que  $f$  admet un unique point critique  $(x_0, y_0)$  de  $\mathbb{R}^2$  que l'on déterminera.
3. Étudier le signe du trinôme  $4X^2 - 2X + 7$ .
4. En déduire que  $(x_0, y_0)$  est un minimum de  $f$ .

**Exercice 5** Montrer que la fonction  $f : (x, y) \mapsto e^{x+y} - x^2 - y$  admet un unique point critique sur  $\mathbb{R}^2$ .

**Exercice 6** Soit  $T$  l'ensemble des couples  $(x, y)$  de réels solutions du système d'inéquations  $x \geq \frac{1}{4}$ ,  $y \geq \frac{1}{4}$ ,  $x + y \leq \frac{3}{4}$ .

On note  $T'$  l'intérieur de  $T$ , à savoir les couples  $(x, y)$  de réels solutions du système d'inéquations  $x > \frac{1}{4}$ ,  $y > \frac{1}{4}$ ,  $x + y < \frac{3}{4}$ .

Soit  $f$  la fonction définie sur  $T$  par:  $f(x, y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{2}{x+y}$ .

1. Représenter sur un même graphique  $T$  et  $T'$ .
2. Déterminer les dérivées partielles d'ordre 1 sur  $T'$  de  $f$ .
3. Montrer que  $f$  n'a pas de point critique sur  $T'$ .

**Exercice 7**

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^2 - 2xy + 2y^2 + e^{-x} \end{aligned}$$

Établir que l'équation  $e^{-x} = x$  admet une solution et une seule sur  $\mathbb{R}$ .

Montrer qu'il existe un unique point critique  $(x_0, y_0)$ , et établir:

$$\begin{cases} x_0 - e^{-x_0} = 0 \\ y_0 = \frac{x_0}{2} \end{cases}$$

Calculer les dérivées partielles d'ordre 2 de  $f$  en  $(x_0, y_0)$ .

**Exercice 8 :**

1. On considère l'application  $\varphi$  définie sur  $]0, +\infty[$  par :

$$\varphi(x) = 2 \ln \left( \frac{x}{2} \right) + \frac{1}{x}$$

- (a) Dresser le tableau de variations de  $\varphi$  sur  $]0, +\infty[$ .  
 (b) On rappelle que  $\ln 2 \simeq 0,69$ .  
 Montrer qu'il existe deux réels  $\alpha$  et  $\beta$ , et deux seulement, tels que :

$$\varphi(\alpha) = 0 = \varphi(\beta) \quad \text{et} \quad 0 < \alpha < \frac{1}{2} < \beta$$

2. On considère la fonction  $f$  définie sur  $]0, +\infty[ \times ]0, +\infty[$  par :

$$f(x, y) = e^{x+4y} \ln(xy)$$

- (a) Prouver que pour tout  $x$  et  $y$  strictement positifs,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = f(x, y) + \frac{1}{x} e^{x+4y} \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 4 f(x, y) + \frac{1}{y} e^{x+4y}$$

- (b) Montrer que les points de coordonnées  $\left(\alpha, \frac{\alpha}{4}\right)$  et  $\left(\beta, \frac{\beta}{4}\right)$  sont les seuls points critiques de  $f$  sur  $]0, +\infty[ \times ]0, +\infty[$ .

**Exercice 9** Soit  $f$  la fonction de deux variables définie sur  $U = ]1, +\infty[ \times ]0, \frac{1}{2}[$  par:

$$f(x, y) = x y (1 - 2y)^{x-1}.$$

1. Montrer que  $f$  admet en tout point de  $U$  des dérivées partielles premières. Les calculer et les factoriser.  
 2. Montrer que  $\forall u \in ]0, 1[, \ln(1 - u) < -u$ .  
 En déduire que  $f$  n'a pas de point critique sur  $U$ .