

## Calcul de limites

**Rappel 1** On rappelle que F.I signifie **forme indéterminée**: on ne peut pas conclure. Pour cela, il faut **lever** l'indétermination. On relève 4 indéterminations:

$$0 \times \infty, (+\infty) + (-\infty), \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$$

Soit  $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ .

• **Somme:**

$\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x)$	$\ell' \in \mathbb{R}$	$-\infty$	$+\infty$	$\leftarrow \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
$\ell \in \mathbb{R}$	$\ell + \ell'$	$-\infty$	$+\infty$	
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	<b>F.I</b>	
$+\infty$	$+\infty$	<b>F.I</b>	$+\infty$	
$\uparrow$ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$				

• **Produit:**

$\lim_{x \rightarrow x_0} (f \times g)(x)$	$-\infty$	$+\infty$	$\ell' \neq 0$	$0$	$\leftarrow \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
$\ell \neq 0$	$\infty$	$\infty$	$\ell \ell'$	$0$	
$0$	<b>F.I</b>	<b>F.I</b>	$0$	$0$	
$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$\infty$	<b>F.I</b>	
$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$\infty$	<b>F.I</b>	
$\uparrow$ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$					

Dans le cas  $\infty$ , c'est la règle usuelle des signes qui s'applique:

$\times$ $\nearrow$	$-\infty$	$+\infty$
$\ell < 0$	$+\infty$	$-\infty$
$\ell > 0$	$-\infty$	$+\infty$

• **Quotient:**

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$	$\ell \neq 0$	$\ell = 0^+$ $f(x) > 0$ au vois de $x_0$	$\ell = 0^-$ $f(x) < 0$ au vois de $x_0$	$-\infty$	$+\infty$	$\ell = 0$
$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)}$	$\frac{1}{\ell}$	$+\infty$	$-\infty$	$0$	$0$	n'a pas de limite

• Puisque  $\frac{f(x)}{g(x)} = f(x) \times \frac{1}{g(x)}$ , on en déduit la limite de  $\frac{f(x)}{g(x)}$  en utilisant les deux derniers tableaux.

### I. Calcul de limite de la forme " $\frac{\lambda}{0}$ ", où $\lambda \neq 0$

On est dans le cas d'un quotient  $\frac{f(x)}{g(x)}$ , où  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lambda$  avec  $\lambda$  réel **non nul** et  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ .

Donc d'après le tableau "quotient", on doit connaître le signe de  $\frac{\lambda}{g(x)}$  quand  $x$  est au voisinage (très proche) de  $x_0$ . Très souvent, on va étudier les limites à gauche et à droite en  $x_0$ . C'est-à-dire :

- $x$  tend vers  $x_0$  ET  $x > x_0$ , noté  $\lim_{x \rightarrow x_0^+}$
- $x$  tend vers  $x_0$  ET  $x < x_0$ , noté  $\lim_{x \rightarrow x_0^-}$

Et suivant le signe de  $g(x)$  quand  $x$  tend vers  $x_0$  à droite ou à gauche, on obtient :

- si  $\frac{\lambda}{g(x)} > 0$ , alors  $\frac{f(x)}{g(x)}$  tend vers  $+\infty$
- si  $\frac{\lambda}{g(x)} < 0$ , alors  $\frac{f(x)}{g(x)}$  tend vers  $-\infty$

**Exemple 1**  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x+1}{x^2-1}$  et  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x+1}{x^2-1}$

## II. Repérer le dominant

### 1. Dominant en l'infini :

(a) Les **grandes** puissances de  $x$  l'emportent en l'infini : on **factorise**.

**Exemple 2**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{x+1}$ . (F.I de la forme  $\frac{\infty}{\infty}$ )

(b) Cas des **racines** et de la **quantité conjuguée** :

**Exemple 3**  $\sqrt{x^2+3x+1}+x+1$  en  $-\infty$  (F.I de la forme  $(+\infty)+(-\infty)$ ).

(c) En  $+\infty$  :  $\forall n, p \in \mathbb{N}$ ,  $(\ln(x))^p \ll x^n \ll e^x$ , ce qui donne les **croissances comparées** :  $\forall n, p \in \mathbb{N}$ ,

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^p}{x^n} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0}$$

**Exemple 4** On combine souvent avec la factorisation par le dominant.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 2x + 7}{e^{2x} - 1}$$

## 2. Dominant en 0 :

(a) Les **petites** puissances de  $x$  l'emportent en 0 !! On **factorise**.

**Exemple 5** Limite en  $0^+$  de  $f(x) = \frac{x + x^2}{\sqrt{x} + x^2}$  (F.I de la forme  $\frac{0}{0}$ ).

(b) **croissances comparées** :  $\forall n, p \in \mathbb{N}$ ,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n (\ln x)^p = 0$$

**Exemple 6**  $\lim_{x \rightarrow 0^+} 2x \ln(x + \sqrt{x})$

## III. Organisation dans les calculs

1. **CIBLER** l'indétermination. "Mettre de côté" les termes qui ne génèrent pas d'indétermination.
2. Si  $x$  tend vers un réel  $a$  non nul, **se ramener en 0** en posant  $h = x - a$ .
3. **Repérer le dominant et factoriser** (cas particulier de la racine)
4. **Bien connaître ses croissances comparées**

**Exercice 1** Déterminer, si elles existent, les limites suivantes:

$$1. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x + 3}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + 2x - 3}{x + 3}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 - 1}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 - 1}$$

$$5. \ln(e - e^{-1/x}) \text{ en } 0^-$$

$$6. \ln(e - e^{-1/x}) \text{ en } 1^+$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 0} e^{-1/x}$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 0} x \left| x + \frac{1}{x} \right|$$

$$9. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^2 - 4x + 3}$$

$$10. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x - e^{1/x}}$$

$$11. \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x^2} - e^{3x} + x^2$$

$$12. \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-3x} - \frac{1}{x} + x - e^{x^2}$$

$$13. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{3x} + 2x + 7}{e^x + e^{-x}}$$

$$14. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{4x} - e^x - 1}{x^4 + 2x + 1}$$

$$15. \lim_{x \rightarrow +\infty} x^5 e^{-x^2}.$$

$$16. \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 2} - 3x$$

$$17. \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 2x + 3} - x$$

$$18. \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\ln(x^2 + 1)} - \sqrt{\ln(x^2 - 1)}$$

$$19. \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left( \frac{2x^2 - x + 1}{2x^2 - 5x + 7} \right)$$

$$20. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x - 1} - \frac{x^2}{x + 1}$$