Exercice 1

Partie A : L'acide chloroacétique

1. Si on note n_1 la quantité de matière en ClAH apportée par la masse $m_1 = 1,00$ g, alors la concentration en quantité de matière C_1 en ClAH vaut : $C_1 = \frac{n_1}{V_1}$, c'est-à-dire $C_1 = \frac{m_1}{M \times V_1}$.

AN $\rightarrow C_1 = \frac{1,00}{94,5 \times 0,500}$ soit **$C_1 = 2,12 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$** .

2. La transformation a lieu en phase aqueuse, donc de volume constant : on complète le tableau d'avancement volumique relatif à la réaction (R_1) où $\xi_{V,F}$ représente l'avancement volumique final.

mol.L ⁻¹	$\text{ClAH}_{(aq)}$	+	$\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$	=	$\text{ClA}^-_{(aq)}$	+	$\text{H}_3\text{O}^+_{(aq)}$
Etat initial	C_1		excès		0		0
Etat final	$C_1 - \xi_{V,F}$		excès		$\xi_{V,F}$		$\xi_{V,F}$

La constante thermodynamique de cet équilibre est $K_1^\circ = 1,5 \cdot 10^{-3} < 10^3$, on fait l'hypothèse que cette réaction conduit à un équilibre chimique.

D'après la relation de Guldberg et Waage, à l'équilibre, le quotient réactionnel final est égal à la constante thermodynamique de la réaction : $Q_{r,F} = K_1^\circ$. Il vient alors :

$$K_1^\circ = \frac{a_F(\text{H}_3\text{O}^+) \times a_F(\text{ClA}^-)}{a_F(\text{ClAH}) \times a_F(\text{H}_2\text{O})}$$

Pour les espèces dissoutes en solution, $a_i = \frac{C_i}{C^\circ}$ avec $C^\circ = 1,00 \text{ mol.L}^{-1}$ la concentration standard.

L'eau jouant ici le rôle de solvant, on considère que $a(\text{H}_2\text{O}) = 1$.

$$K_1^\circ = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_F \times [\text{ClA}^-]_F}{[\text{ClAH}]_F \times C^\circ}$$

On remplace chaque concentration en quantité de matière par son expression (ligne « état final » du tableau d'avancement volumique) :

$$\begin{aligned} K_1^\circ &= \frac{\xi_{V,F} \times \xi_{V,F}}{(C_1 - \xi_{V,F}) \times C^\circ} \Leftrightarrow K_1^\circ \times (C_1 - \xi_{V,F}) \times C^\circ = \xi_{V,F}^2 \\ &\Leftrightarrow \xi_{V,F}^2 + K_1^\circ C^\circ \xi_{V,F} - K_1^\circ C^\circ C_1 = 0 \\ &\Leftrightarrow \xi_{V,F}^2 + 1,5 \cdot 10^{-3} \times 1 \times \xi_{V,F} - 1,5 \cdot 10^{-3} \times 1 \times 2,12 \cdot 10^{-2} = 0 \\ &\Leftrightarrow \boxed{\xi_{V,F}^2 + 1,5 \cdot 10^{-3} \xi_{V,F} - 3,18 \cdot 10^{-5} = 0} \end{aligned}$$

La résolution de ce polynôme peut se faire à la calculatrice ou à la main. A la main, on calcule le discriminant de cette équation et il vaut : $\Delta = (1,5 \cdot 10^{-3})^2 + 4 \times 3,18 \cdot 10^{-5} = 1,2945 \cdot 10^{-4} > 0$.

On a donc 2 racines : $\xi_{V,F1} = \frac{-1,5 \cdot 10^{-3} - \sqrt{\Delta}}{2}$ et $\xi_{V,F2} = \frac{-1,5 \cdot 10^{-3} + \sqrt{\Delta}}{2}$.
 Soit : $\xi_{V,F1} = -6,4 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ et $\xi_{V,F2} = 4,9 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$

A l'instant initial et avant toute réaction dans le milieu, les concentrations en ion $\text{Cl}^-_{(aq)}$ et en ions $\text{H}_3\text{O}^+_{(aq)}$ étant nulles, le système ne peut évoluer spontanément que dans le **sens direct** : on en déduit donc que l'avancement volumique de la réaction doit être positif.

Ainsi, seule la solution **$\xi_{V,F2} = 4,9 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ est acceptable.**

➔ **Composition finale du système :**

- $[\text{ClAH}]_F = C_1 - \xi_{V,F2}$ **AN** : $[\text{ClAH}]_F = 2,12 \cdot 10^{-2} - 4,9 \cdot 10^{-3}$ soit **$[\text{ClAH}]_F = 1,63 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$**
- $[\text{ClA}^-]_F = [\text{H}_3\text{O}^+]_F = \xi_{V,F2}$ **AN** : **$[\text{ClA}^-]_F = [\text{H}_3\text{O}^+]_F = 4,9 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$**

Dans l'état final, toutes les espèces sont présentes en quantité notables, l'hypothèse d'un équilibre final est validée.

3. En supposant la loi de Kohlrausch vérifiée, la conductivité σ de la solution est donnée par la relation : $\sigma = \lambda(\text{H}_3\text{O}^+) \times [\text{H}_3\text{O}^+]_F + \lambda(\text{ClA}^-) \times [\text{ClA}^-]_F$

On réalise l'application numérique en exprimant les concentrations en quantité de matière en mol.m^{-3} et les conductivités molaires ioniques en $\text{mS.m}^2.\text{mol}^{-1}$, le résultat de σ sera en mS.m^{-1} :

AN $\rightarrow \sigma = 35,0 \times 4,9 + 4,1 \times 4,9$ soit $C_1 = 1,9.10^2 \text{ mS.m}^{-1}$.

Partie B : L'acide chloroacétique

4. Déterminons le quotient de réaction initial : $Q_{r,i} = \frac{a_{\text{AH},i}^2}{a_{\text{H}_2,i} \times a_{\text{I}_2,i}}$

Pour un mélange de gaz parfait, $a_i = \frac{P_i}{P^0}$ avec $P^0 = 1,0 \text{ bar}$ et P_i la pression partielle de l'espèce chimique. On obtient alors : $Q_{r,i} = \frac{P^2(\text{HI})}{P(\text{H}_2) \times P(\text{I}_2)}$

Or $P_i = x_i P$ avec x_i la fraction molaire de l'espèce chimique et P la pression totale. La relation devient : $Q_{r,i} = \frac{x^2(\text{HI})}{x(\text{H}_2) \times x(\text{I}_2)}$

Or $x = \frac{n_i}{n_{\text{tot}}}$ avec n_i la quantité de matière de l'espèce chimique et n_{tot} la quantité de matière totale du mélange. On a donc finalement : $Q_{r,i} = \frac{n^2(\text{HI})}{n(\text{H}_2) \times n(\text{I}_2)}$

AN $\rightarrow Q_{r,i} = \frac{0,50^2}{0,50 \times 0,50}$ soit $Q_{r,i} = 1,0$.

On constate donc que $Q_{r,i} < K^0(T)$: d'après le critère d'évolution spontanée, le système évoluera donc spontanément dans le **sens direct** de l'écriture de l'équation de réaction.

5. Dressons un tableau d'avancement avec ξ_F l'avancement final de la réaction :

mol	$\text{H}_{2(g)}$	+	$\text{I}_{2(g)}$	=	$2\text{HI}_{(g)}$	n_{tot}
<i>E. i</i>	n_0		n_0		n_0	$3n_0$
<i>E. f</i>	$n_0 - \xi_F$		$n_0 - \xi_F$		$n_0 + 2\xi_F$	$3n_0$

La constante thermodynamique de cet équilibre est $K_2^\circ = 61 < 10^3$, on fait l'hypothèse que cette réaction conduit à un équilibre chimique.

A l'équilibre, d'après la relation de Guldberg et Waage :

$$Q_{r,F} = K_2^\circ = \frac{n^2(\text{HI})_F}{n(\text{H}_2)_F \times n(\text{I}_2)_F}$$

En remplaçant chaque quantité de matière par son expression à l'état final d'après le tableau d'avancement, on obtient :

$$K_2^\circ = \frac{(n_0 + 2\xi_F)^2}{(n_0 - \xi_F)^2} \Leftrightarrow \sqrt{K_2^\circ} = \frac{n_0 + 2\xi_F}{n_0 - \xi_F} \quad \text{ou} \quad -\sqrt{K_2^\circ} = \frac{n_0 + 2\xi_F}{n_0 - \xi_F}$$

($n_0 + 2\xi_F$ et $n_0 - \xi_F$ sont les quantités de matières d'espèces dans l'état final, elles ont toujours positives, donc leur quotient également, ainsi seule la première équation est possible)

$$\Leftrightarrow \sqrt{K_2^\circ}(n_0 - \xi_F) = n_0 + 2\xi_F \Leftrightarrow \sqrt{K_2^\circ}n_0 - \sqrt{K_2^\circ}\xi_F = n_0 + 2\xi_F$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{K_2^\circ}n_0 - n_0 = 2\xi_F + \sqrt{K_2^\circ}\xi_F \Leftrightarrow n_0(\sqrt{K_2^\circ} - 1) = \xi_F(2 + \sqrt{K_2^\circ})$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\xi_F = \frac{n_0(\sqrt{K_2^\circ} - 1)}{(2 + \sqrt{K_2^\circ})}}$$

$$\underline{AN} \rightarrow \xi_F = \frac{5,0 \cdot 10^{-1}(\sqrt{61} - 1)}{(\sqrt{61} + 2)} \quad \text{soit } \xi_F = \underline{0,35 \text{ mol}}$$

(Le sens direct de la réaction est confirmé par le signe positif de ξ_F et le résultat est cohérent car $\xi_F < n_0$)

➔ **Composition finale du système :**

$$\blacksquare n_{H_2,f} = n_{I_2,f} = 5,0 \cdot 10^{-1} - 3,5 \cdot 10^{-1} = \underline{0,15 \text{ mol}} \quad \blacksquare n_{HI,f} = 5,00 \cdot 10^{-1} + 2 \times 3,5 \cdot 10^{-1} = \underline{1,2 \text{ mol}}$$

Dans l'état final, toutes les espèces sont présentes en quantité notables, l'hypothèse d'un équilibre final est validée.

6. Le taux d'avancement final d'une transformation chimique est défini comme suit : $\tau_F = \frac{\xi_F}{\xi_{max}}$ où ξ_{max} est l'avancement maximal qu'on détermine en considérant que le réactif limitant est totalement consommé.

Or, ici, les deux réactifs sont introduits en proportions stœchiométriques : ainsi, les deux réactifs sont limitants. Il en découle alors que : $n_0 - \xi_{max} = 0 \Rightarrow \xi_{max} = n_0$. On a alors :

$$\boxed{\tau_F = \frac{\xi_F}{n_0}}$$

$$\underline{AN} \rightarrow \tau_F = \frac{3,5 \cdot 10^{-1}}{5,0 \cdot 10^{-1}} \quad \text{soit } \tau_F = \underline{0,70 = 70 \%}$$

Cela signifie que 70 % de ces réactifs (qui ont tous les deux limitants) seront consommés dans l'état final.

7. La constante d'équilibre **ne dépend que de la température pour une transformation donnée**. Il faut donc modifier la température pour changer la valeur de la constante d'équilibre.

8. D'après la définition du taux d'avancement final, on $\xi_F = n_0 \tau_F$. En remplaçant le taux d'avancement final par son expression dans la relation du Guldberg et Waage, on obtient :

$$K^{\circ'} = \frac{(n_0 + 2n_0\tau_F)^2}{(n_0 - n_0\tau_F)^2} \Leftrightarrow \boxed{K^{\circ'} = \frac{(1 + 2\tau_F)^2}{(1 - \tau_F)^2}}$$

$$\underline{AN} \rightarrow K^{\circ'} = \frac{(1 + 2 \cdot 0,95)^2}{(1 - 0,95)^2} \quad \text{soit } K^{\circ'} = \underline{3,4 \cdot 10^3}$$

(On constate que $K^{\circ'} > K_2^\circ$: le résultat est cohérent car le taux d'avancement est plus élevé, donc on lui associe une constante d'équilibre plus grande)

9. Pour que le système n'évolue pas, il faut que $Q_{r,i} = K_2^\circ$ (395 °C)

$$\frac{n^2(HI)}{n(H_2) \times n(I_2)} = K_2^\circ \Leftrightarrow n^2(HI) = n(H_2) \times n(I_2) \times K_2^\circ$$

$$n(HI) = \sqrt{n(H_2) \times n(I_2) \times K_2^\circ} \Leftrightarrow n(HI) = \sqrt{n_0^2 \times K_2^\circ} \quad \boxed{\Leftrightarrow n(HI) = n_0 \sqrt{K_2^\circ}}$$

$$\underline{AN} \rightarrow n(HI) = 5,0 \cdot 10^{-1} \times \sqrt{61} \quad \text{soit } \underline{n(HI) = 3,9 \text{ mol}}$$

Partie C : Réactions mettant en jeu le chlore et le brome

10. La constante d'équilibre K_3° associée à la réaction (R₃) est largement supérieure à 10^3 . C'est pourquoi on peut considérer que cette réaction est quasi-totale.

11. La transformation a lieu en phase aqueuse, donc de volume constant, on complète le tableau d'avancement volumique relatif à la réaction (R₃) où $\xi_{V,F}$ représente l'avancement volumique final.

mol.L ⁻¹	Cl _{2(aq)}	+	2 Br ⁻ _(aq)	=	2 Cl ⁻ _(aq)	+	Br _{2(aq)}
Etat initial	C ₃		C ₃		0		0
Etat final	C ₃ - $\xi_{V,F}$		C ₃ - 2 $\xi_{V,F}$		2 $\xi_{V,F}$		$\xi_{V,F}$

En supposant la réaction (R₃) comme totale, l'avancement volumique final $\xi_{V,F}$ s'identifie à l'avancement volumique maximal $\xi_{V,max}$ qu'on détermine en considérant que le réactif limitant est totalement consommé.

Ici, la concentration initiale des deux réactifs étant la même, mais Br⁻_(aq) étant consommé deux fois plus que Cl_{2(aq)}, on peut affirmer que Br⁻_(aq) est le réactif limitant. On pose donc :

$$C_3 - 2 \xi_{V,F} = 0 \leftrightarrow \xi_{V,F} = \frac{C_3}{2} \quad (\text{soit } \xi_{V,F} = 5,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})$$

➔ **Composition finale du système :**

- $[\text{Cl}_2]_F = C_3 - \xi_{V,F} \leftrightarrow [\text{Cl}_2]_F = C_3 - \frac{C_3}{2} \leftrightarrow [\text{Cl}_2]_F = \frac{C_3}{2}$ AN : $[\text{Cl}_2]_F = 5,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- $[\text{Br}^-]_F \approx 0$ car Br⁻ constitue le réactif limitant de cette transformation supposée totale.
- $[\text{Cl}^-]_F = 2 \xi_{V,F} \leftrightarrow [\text{Cl}^-]_F = 2 \times \frac{C_3}{2} \leftrightarrow [\text{Cl}^-]_F = C_3$ AN : $[\text{Cl}^-]_F = 1,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- $[\text{Br}_2]_F = \xi_{V,F} \leftrightarrow [\text{Br}_2]_F = \frac{C_3}{2}$ AN : $[\text{Br}_2]_F = 5,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

12. Pour valider l'hypothèse formulée à la question 10., il faut calculer la concentration en quantité de matière finale en ions Br⁻_(aq) afin de vérifier si elle est négligeable par rapport à la concentration C₃ initiale.

D'après la relation de Guldberg et Waage, à l'équilibre, le quotient réactionnel final est égal à la constante thermodynamique de la réaction : $Q_{r,F} = K_3^\circ$. Il vient alors :

$$K_3^\circ = \frac{(a_F(\text{Cl}^-))^2 \times a_F(\text{Br}_2)}{a_F(\text{Cl}_2) \times (a_F(\text{Br}^-))^2}$$

Or, pour les espèces dissoutes en solution, $a_i = \frac{C_i}{C^\circ}$ avec $C^\circ = 1,00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ la concentration standard. On a donc :

$$K_3^\circ = \frac{[\text{Cl}^-]_F^2 \times [\text{Br}_2]_F}{[\text{Cl}_2]_F \times [\text{Br}^-]_F^2} \leftrightarrow [\text{Br}^-]_F = [\text{Cl}^-]_F \times \sqrt{\frac{[\text{Br}_2]_F}{K_3^\circ \times [\text{Cl}_2]_F}}$$

$$\text{AN} \rightarrow [\text{Br}^-]_F = 1,00 \cdot 10^{-2} \times \sqrt{\frac{5,00 \cdot 10^{-3}}{10^{9,3} \times 5,00 \cdot 10^{-3}}} \quad \text{soit } \underline{[\text{Br}^-]_F = 2,2 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}}$$

Le rapport $\frac{C_3}{[\text{Br}^-]_F}$ vaut $2,2 \cdot 10^5$ et est donc largement supérieur à 100 : cela prouve que **la concentration en quantité de matière finale en ions Br⁻_(aq) est négligeable devant sa concentration initiale**. Ceci confirme donc que les ions Br⁻_(aq) ont été quasiment totalement consommés, **en accord avec le caractère quasi-total de la réaction (R₃)**.

13. On constate que la réaction (R₅) est une combinaison linéaire des réactions (R₃) et (R₄). Plus précisément, **(R₅) = 1 × (R₄) - 3 × (R₃)** :

On en déduit donc que $K_5^\circ = (K_4^\circ)^1 \times (K_3^\circ)^{-3}$ soit $K_5^\circ = \frac{K_4^\circ}{(K_3^\circ)^3}$.

$$AN \rightarrow K_5^\circ = \frac{10^{1,5}}{(10^{9,3})^3} \text{ soit } K_5^\circ = 10^{-26,4}.$$

On constate donc que $K_5^\circ \ll K_4^\circ$: on en conclue donc que **la réaction (R₄) est la plus favorable thermodynamiquement.**

Exercice 2

1. Les groupes caractéristiques suivants sont identifiés sur la structure de la molécule ci-contre :

- (1) groupe hémiacétal ;
- (2) groupe carbonyle ;
- (3) groupe ester ;
- (4) groupe acétal ;
- (5) groupe hydroxyl.

2. Composé 2 : Acide 2-méthylpropanoïque
Composé 3 : 2-méthylpropanoate d'éthyle

3. Un groupe de protons équivalent (GPE) est un ensemble de protons qui ont le même environnement chimique. Autrement dit, s'il existe une opération de symétrie (plan de symétrie, axe de symétrie, et centre d'inversion) qui permet de les échanger.

Les GPE sont identifiés sur les composés 2 et 3 par un encadrement :

4. Le déplacement chimique du proton dépend de son environnement chimique. Par conséquent, il y aura autant de signaux différents dans le spectre d'une molécule que celle-ci possède de groupes de protons équivalents (GPE)

Le spectre RMN du composé 2 sera donc constitué de 3 signaux alors que celui du composé 3 contiendra 4 signaux. Ainsi, le nombre de signaux permet effectivement de distinguer les deux composés.

5. L'analyse du composé 3 est résumée dans le tableau ci-dessous :

GPE étudié	Protons voisins	Multiplicité	Intégration
6 H(a')	1 H(b')	Doublet	6
1 H(b')	6 H(a')	Septuplet	1
2 H(c')	3 H(d')	Quadruplet	2
3 H(d')	2 H(c')	Triplet	3

La multiplicité des signaux est prévue par la *règle n+1* : le signal d'un GPE présente un nombre de pics égal au nombre de protons voisins + 1.

La valeur renseignée pour l'intégration est identique au nombre de protons présents dans le GPE étudié

6.	Signal	δ (en ppm)	Intégration	Multiplicité	Couplage
	I	5,68	1 H	Multiplet	$^3J = 17$ Hz $^3J = 10$ Hz $^3J = 6,3$ Hz
	G	5,13	1 H	Multiplet	$^3J = 17$ Hz $^2J = 1,8$ Hz
	H	5,00	1 H	Multiplet	$^3J = 10$ Hz $^2J = 1,8$ Hz
	E	4,09	1 H	Doublet	$^3J = 6,3$ Hz
	B	3,20	1 H	Multiplet	Non renseigné
	D	2,47	2 H	Doublet	Non renseigné
	F	1,99	1 H	Singulet large	/
	A	1,52	3 H	Doublet	Non renseigné
	C	1,12	3 H	Doublet	Non renseigné
	J	0,90	6 H	Singulet	