

Mathématiques – TD2
INTÉGRALES GÉNÉRALISÉES

1 Applications directes du cours

Correction de l'exercice 1.

1. La fonction $f : t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t-1}}$ est définie et continue sur $[2, +\infty[$ donc l'intégrale est impropre en $+\infty$.

Soit $A \in [2, +\infty[$. On a :

$$\int_2^A \frac{1}{\sqrt{t-1}} dt = [2\sqrt{t-1}]_2^A = 2\sqrt{A-1} - 2.$$

Donc : $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_2^A \frac{1}{\sqrt{t-1}} dt = +\infty$.

Ainsi l'intégrale $\int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{t-1}} dt$ est divergente.

2. La fonction $f : t \mapsto \frac{t}{(1+t^2)^2}$ est continue sur $] -\infty, 0]$ donc l'intégrale est impropre en $-\infty$.

Soit $A \in] -\infty, 0]$. Alors on a :

$$\int_A^0 \frac{t}{(1+t^2)^2} dt = \left[-\frac{1}{2} \frac{1}{1+t^2} \right]_A^0 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+A^2} - 1 \right).$$

Donc : $\lim_{A \rightarrow -\infty} \int_A^0 \frac{t}{(1+t^2)^2} dt = -\frac{1}{2}$.

Ainsi l'intégrale $\int_{-\infty}^0 \frac{t}{(1+t^2)^2} dt$ est convergente et vaut $-\frac{1}{2}$.

3. La fonction $x \mapsto xe^{-x^2}$ est continue sur \mathbb{R} donc l'intégrale est impropre en $-\infty$ et en $+\infty$.

- Étude de l'intégrale $\int_{-\infty}^0 xe^{-x^2} dx$ impropre en $-\infty$.

Soit $A \in] -\infty, 0]$. On a :

$$\int_A^0 xe^{-x^2} dx = \left[-\frac{1}{2} e^{-x^2} \right]_A^0 = -\frac{1}{2} (1 - e^{-A^2}).$$

Ainsi : $\lim_{A \rightarrow -\infty} \int_A^0 xe^{-x^2} dx = -\frac{1}{2}$.

L'intégrale converge donc et vaut $-\frac{1}{2}$.

- Étude de l'intégrale $\int_0^{+\infty} xe^{-x^2} dx$ impropre en $+\infty$.
Soit $A \in [0, +\infty[$. On a :

$$\int_0^A xe^{-x^2} dx = \left[-\frac{1}{2} e^{-x^2} \right]_0^A = -\frac{1}{2} (e^{-A^2} - 1).$$

Ainsi : $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A xe^{-x^2} dx = \frac{1}{2}$.

L'intégrale converge donc et vaut $\frac{1}{2}$.

- Conclusion : comme les intégrales $\int_{-\infty}^0 xe^{-x^2} dx$ et $\int_0^{+\infty} xe^{-x^2} dx$ convergent alors $\int_{-\infty}^{+\infty} xe^{-x^2} dx$ converge et :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} xe^{-x^2} dx = \int_{-\infty}^0 xe^{-x^2} dx + \int_0^{+\infty} xe^{-x^2} dx = 0.$$

4. La fonction $t \mapsto \frac{t}{\sqrt{2-t^2}}$ est continue sur $[0, \sqrt{2}[$ donc la l'intégrale est impropre en $\sqrt{2}$. Soit $A \in [0, \sqrt{2}[$. Pour tout $t \in [0, \sqrt{2}[$, on a

$$\frac{t}{\sqrt{2-t^2}} = -\frac{1}{2} \frac{-2t}{\sqrt{2-t^2}} = -\frac{u'}{2\sqrt{u}}$$

où $u : t \mapsto 2 - t^2$ est continue et positive sur $[0, A]$. Ainsi,

$$\int_0^A \frac{t}{\sqrt{2-t^2}} dt = -\left[\sqrt{2-t^2} \right]_0^A = -\sqrt{2-A^2} + \sqrt{2}.$$

Donc

$$\lim_{A \rightarrow \sqrt{2}^-} \int_0^A \frac{t}{\sqrt{2-t^2}} dt = \lim_{A \rightarrow \sqrt{2}^-} -\sqrt{2-A^2} + \sqrt{2} = \sqrt{2}.$$

Ainsi, l'intégrale $\int_0^{\sqrt{2}} \frac{t}{\sqrt{2-t^2}} dt$ converge et vaut $\sqrt{2}$.

Correction de l'exercice 2.

1. La fonction $f : x \mapsto xe^{-x^2}$ est continue sur $[0, +\infty[$ donc l'intégrale est impropre en $+\infty$.

Soit $A \in [0, +\infty[$. Alors on a :

$$\int_0^A xe^{-x^2} dx = \left[-\frac{1}{2} e^{-x^2} \right]_0^A = \frac{1}{2} (1 - e^{-A^2}).$$

Donc : $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A xe^{-x^2} dx = \frac{1}{2}$.

Ainsi l'intégrale $\int_0^{+\infty} xe^{-x^2} dx$ est convergente et vaut $\frac{1}{2}$.

2. La fonction $f : t \mapsto \frac{1}{1 + e^t}$ est continue sur $[0, +\infty[$ donc l'intégrale est impropre en $+\infty$.
Soit $A \in [0, +\infty[$.

- **Méthode 1 :** la fonction $u : t \mapsto e^t$ est de classe C^1 sur $[0, A]$, en effectuant le changement de variable $u = e^t$ on obtient :

$$\int_0^A \frac{1}{1 + e^t} dt = \int_0^A \frac{1}{e^t(1 + e^t)} e^t dt = \int_0^A \frac{1}{u(t)(1 + u(t))} u'(t) dt = \int_1^{e^A} \frac{1}{u(1 + u)} du.$$

Or, pour tout $u \geq 1$: $\frac{1}{u(u+1)} = \frac{1}{u} - \frac{1}{u+1}$. Donc :

$$\begin{aligned} \int_0^A \frac{1}{1 + e^t} dt &= \int_1^{e^A} \frac{1}{u(1 + u)} du \\ &= \int_1^{e^A} \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{u+1} \right) du \\ &= [\ln(u) - \ln(u+1)]_1^{e^A} \\ &= A - \ln(1 + e^A) + \ln(2) \\ &= \ln(2) - \ln(1 + e^{-A}). \end{aligned}$$

- **Méthode 2 :** on a : $\forall t \geq 0, \frac{1}{1 + e^t} = \frac{e^{-t}}{1 + e^{-t}}$. Donc :

$$\int_0^A \frac{1}{1 + e^t} dt = \int_0^A \frac{e^{-t}}{1 + e^{-t}} dt = [-\ln(1 + e^{-t})]_0^A = \ln(2) - \ln(1 + e^{-A}).$$

- **Conclusion :** $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A \frac{1}{1 + e^t} dt = \ln(2)$.

Ainsi l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + e^t} dt$ est convergente et vaut $\ln(2)$.

3. La fonction $x \mapsto \frac{1}{2(1 + |x|)^2}$ est continue sur \mathbb{R} donc l'intégrale est impropre en $-\infty$ et en $+\infty$.

- Étude de l'intégrale $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{2(1 + |x|)^2} dx$ impropre en $-\infty$.
Soit $A \in]-\infty, 0]$. On a :

$$\int_A^0 \frac{1}{2(1 + |x|)^2} dx = \int_A^0 \frac{1}{2(1 - x)^2} dx = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1 - x} \right]_A^0 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2(1 - A)}.$$

Ainsi : $\lim_{A \rightarrow -\infty} \int_A^0 \frac{1}{2(1 + |x|)^2} dx = \frac{1}{2}$.

L'intégrale converge donc et vaut $\frac{1}{2}$.

- Étude de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{1}{2(1+|x|)^2} dx$ impropre en $+\infty$.
Soit $A \in [0, +\infty[$. On a :

$$\int_0^A \frac{1}{2(1+|x|)^2} dx = \int_0^A \frac{1}{2(1+x)^2} = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{1+x} \right]_0^A = \frac{1}{2} - \frac{1}{2(1+A)}.$$

Ainsi : $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A \frac{1}{2(1+|x|)^2} dx = \frac{1}{2}$.

L'intégrale converge donc et vaut $\frac{1}{2}$.

- Conclusion : comme les intégrales $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{2(1+|x|)^2} dx$ et $\int_0^{+\infty} \frac{1}{2(1+|x|)^2} dx$ convergent alors $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2(1+|x|)^2} dx$ converge et :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2(1+|x|)^2} dx = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{2(1+|x|)^2} dx + \int_0^{+\infty} \frac{1}{2(1+|x|)^2} dx = 1.$$

4. La fonction $f : t \mapsto \frac{1}{t-1}$ est continue sur $]1, 2]$ donc l'intégrale est impropre en 1.
Soit $A \in]1, 2]$. Alors on a :

$$\int_A^2 \frac{1}{t-1} dt = [\ln(t-1)]_A^2 = -\ln(A-1) \xrightarrow[A \rightarrow 1]{} +\infty.$$

Ainsi l'intégrale est divergente.

Correction de l'exercice 3. 1. La fonction $u \mapsto ue^{-u}$ est continue sur $[0, +\infty[$ donc l'intégrale est impropre en $+\infty$. Soit $A \in [0, +\infty[$. Alors, comme les fonctions $u \mapsto u$ et $u \mapsto -e^{-u}$ sont de classe C^1 sur $[0, A]$, par intégration par parties on trouve :

$$\int_0^A ue^{-u} du = [-ue^{-u}]_0^A - \int_0^A -e^{-u} du = -Ae^{-A} - e^{-A} + 1.$$

Ainsi,

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A ue^{-u} du = \lim_{A \rightarrow +\infty} -Ae^{-A} - e^{-A} + 1 = 1.$$

Par conséquent, $\int_0^{+\infty} ue^{-u} du$ converge et sa valeur est 1.

2. La fonction $x \mapsto \frac{\ln(x)}{x^2}$ est continue sur $[1, +\infty[$ donc l'intégrale est impropre en $+\infty$. Soit $A \in [1, +\infty[$.

Les fonctions $x \mapsto \ln(x)$ et $x \mapsto -\frac{1}{x}$ sont de classe C^1 sur \mathbb{R}_+^* donc par intégration par parties on a :

$$\begin{aligned} \int_1^A \frac{\ln(x)}{x^2} dx &= \left[-\frac{\ln(x)}{x} \right]_1^A - \int_1^A \frac{-1}{x} \times \frac{1}{x} dx \\ &= -\frac{\ln(A)}{A} + \left[\frac{-1}{x} \right]_1^A \\ &= -\frac{\ln(A)}{A} + \frac{-1}{A} + 1. \end{aligned}$$

Ainsi : $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_1^A \frac{\ln(x)}{x^2} dx = 1.$

Donc l'intégrale converge et vaut 1.

3. La fonction $t \mapsto \frac{\ln(t)}{t^2}$ est continue sur $[1, +\infty[$ donc l'intégrale est impropre en $+\infty$.

Soit $A \in [1, +\infty[$. La fonction $u : t \mapsto \ln(t)$ est de classe \mathcal{C}^1 et strictement croissante sur $[1, A]$ donc, en effectuant le changement de variable $u = \ln(t)$ et en utilisant la question 1, on obtient :

$$\int_1^A \frac{\ln(t)}{t^2} dt = \int_1^A \frac{u(t)}{e^{u(t)}} u'(t) dt = \int_0^{\ln A} \frac{u}{e^u} du = \int_0^{\ln A} ue^{-u} du = -\frac{\ln A}{A} - \frac{1}{A} + 1$$

en réutilisant la question précédente. Ainsi,

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_1^A \frac{\ln(t)}{t^2} dt = \lim_{A \rightarrow +\infty} -\frac{\ln A}{A} - \frac{1}{A} + 1 = 1.$$

Donc $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(t)}{t^2} dt$ converge et vaut 1.

4. La fonction $u \mapsto \sqrt{\frac{1+u}{1-u}}$ est continue sur $[0, 1[$ donc l'intégrale est impropre en 1.

La fonction $u : t \mapsto \cos(t)$ est de classe \mathcal{C}^1 et strictement décroissante sur $]0, \frac{\pi}{2}]$ donc, en effectuant le changement de variable $u = \cos(t)$, les intégrales

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{1+u}{1-u}} du \quad \text{et} \quad \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sqrt{\frac{1+\cos(t)}{1-\cos(t)}} \times (-\sin(t)) dt$$

sont de même nature. Or :

$$1 + \cos(t) = 2 \cos^2\left(\frac{t}{2}\right) \quad \text{et} \quad 1 - \cos(t) = 2 \sin^2\left(\frac{t}{2}\right).$$

L'étude revient à l'étude de l'intégrale :

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \left| \frac{\cos\left(\frac{t}{2}\right)}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)} \right| \times (-\sin(t)) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \cos^2\left(\frac{t}{2}\right) dt$$

car $\sin(t) = 2 \sin\left(\frac{t}{2}\right) \cos\left(\frac{t}{2}\right)$. Enfin, cette dernière intégrale est une intégrale de fonction continue sur un segment et :

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \cos^2\left(\frac{t}{2}\right) dt &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos(t) + 1) dt \\ &= [\sin(t) + t]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 1 + \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Donc $\int_0^1 \sqrt{\frac{1+u}{1-u}} du$ converge et vaut $1 + \frac{\pi}{2}$.

Correction de l'exercice 4.

$$1. A = \int_1^{+\infty} \frac{x \, dx}{\sqrt{x^3 + 1}}.$$

(a) L'intégrande $x \mapsto \frac{x}{\sqrt{x^3 + 1}}$ est continue sur $[1, +\infty[$. La question de la nature de l'intégrale généralisée en question à un sens, elle a une singularité en $+\infty$.

(b) On a :

$$\frac{x}{\sqrt{x^3 + 1}} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x \cdot x^{-\frac{3}{2}} = x^{-\frac{1}{2}}$$

et donc, par le théorème d'équivalence pour les intégrales généralisées à intégrande positive, A et $\int_1^{+\infty} x^{-\frac{1}{2}} \, dx$ sont de même nature.

Or cette dernière diverge vers $+\infty$ (une primitive est \sqrt{x} , qui a pour limite $+\infty$ en ∞).

Finalement $\int_1^{+\infty} \frac{x \, dx}{\sqrt{x^3 + 1}}$ est divergente.

$$2. B = \int_0^{+\infty} t^5 \cdot e^{-t^2} \, dt.$$

(a) L'intégrande $t \mapsto t^5 \cdot e^{-t^2}$ est continue sur $[0, +\infty[$. La question de la nature de l'intégrale généralisée en question à un sens, elle a une singularité en $+\infty$.

(b) On a, lorsque $t \rightarrow +\infty$, par croissance comparées,

$$\frac{t^5 \cdot e^{-t^2}}{e^{-t}} \rightarrow 0$$

et donc, il existe $T \geq 1$ tel que

$$\forall x \geq T, 0 \leq t^5 \cdot e^{-t^2} \leq e^{-t}$$

Or $\int_T^{+\infty} e^{-t} \, dt$ converge (vers e^{-T}) et donc, par le théorème de comparaison pour les intégrales généralisées à intégrande positive, $\int_T^{+\infty} t^5 \cdot e^{-t^2} \, dt$ converge et par Chasles, il en est de même pour $\int_0^{+\infty} t^5 \cdot e^{-t^2} \, dt$.

$$3. C = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}.$$

(a) L'intégrande $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}$ est continue sur $]0, 1[$ (elle tend vers $+\infty$ à chaque extrémité), il est légitime de considérer la question de la convergence de l'intégrale généralisée qui a deux singularités, l'une en 0, l'autre en 1. On traite la nature de chacune des intégrales $\int_0^{\frac{1}{2}}$ et $\int_{\frac{1}{2}}^1$ séparément.

(b) Convergence de $\int_0^{\frac{1}{2}} \dots$

Si $0 < x < \frac{1}{2}$ alors $\sqrt{1-x} \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$ donc :

$$\forall x \in \left[0, \frac{1}{2}\right], 0 \leq \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} \leq \sqrt{2} \frac{1}{\sqrt{x}}$$

Or l'intégrale généralisée $\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{2} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ est convergente (une primitive de l'intégrande est $Cst \times \sqrt{x}$, qui a une limite en 0^+) et donc, par le théorème de comparaison pour les intégrales généralisées à intégrande positive, $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$ est convergente.

(c) Convergence de $\int_{\frac{1}{2}}^1 \dots$. Sur le même modèle, on a

$$\forall x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right], 0 \leq \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} \leq \sqrt{2} \frac{1}{\sqrt{1-x}}$$

Or l'intégrale généralisée $\int_{\frac{1}{2}}^1 \sqrt{2} \frac{1}{\sqrt{1-x}} dx$ est convergente (une primitive de l'intégrande est $Cst \times \sqrt{1-x}$, qui a une limite en 1^-) et donc, par le théorème de comparaison pour les intégrales généralisées à intégrande positive, $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$ est convergente.

(d) Convergence de $C = \int_0^1 \dots$. Comme $\int_{\frac{1}{2}}^1 \dots$ et $\int_0^{\frac{1}{2}} \dots$ sont convergentes, par définition, l'intégrale généralisée a deux singularités, $\int_0^1 \dots$ est convergente.

4. $D = \int_1^{+\infty} \sin t \cdot e^{-2t} dt$.

(a) L'intégrande $t \mapsto \sin t \cdot e^{-2t}$ est continue sur $[1, +\infty[$. La question de la nature de l'intégrale généralisée en question à un sens, elle a une singularité en $+\infty$.

(b) On a, du fait que $|\sin t| \leq 1$,

$$\forall t \geq 0, 0 \leq |\sin t \cdot e^{-2t}| \leq e^{-2t}$$

Or $\int_0^{+\infty} e^{-2t} dt$ converge (vers $\frac{1}{2}$) et donc, par le théorème de comparaison pour les intégrales généralisées à intégrande positive, $\int_0^{+\infty} \sin t \cdot e^{-2t} dt$ est absolument convergente et donc convergente.

Remarques :

— On a de plus, le nombre $\int_0^{+\infty} \sin t \cdot e^{-2t} dt$ étant bien défini par ce qui vient d'être dit, que

$$\left| \int_0^{+\infty} \sin t \cdot e^{-2t} dt \right| \leq \frac{1}{2}$$

- On peut mener le calcul exact de cette intégrale (en passant en complexes ou par deux IPP), ce n'est pas la question ici.

5. $E = \int_0^1 \frac{\sin x - x}{1 - \cos x} dx.$

- (a) L'intégrande $x \mapsto \frac{\sin x - x}{1 - \cos x}$ est continue sur $]0, 1]$, car, sur cet intervalle $1 - \cos x$ ne s'annule pas (annulation pour $x = 0$ puis $x = 2\pi > 1$). La question de la nature de l'intégrale généralisée en question à un sens, elle a *a priori* une singularité en 0.
- (b) Examinons le comportement de l'intégrande en 0. On a, lorsque $x \rightarrow 0$,

$$\sin x - x \sim -\frac{1}{6}x^3, \quad 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$

et donc

$$\frac{\sin x - x}{1 - \cos x} \sim -\frac{1}{3}x \rightarrow 0^+$$

L'intégrande se prolonge par continuité en 0^+ . On a donc affaire à une intégrale faussement généralisée (elle est convergente, c'est une intégrale classique)

Correction de l'exercice 5. 1. La fonction $t \mapsto \frac{t}{t + \sqrt{t}}$ est continue sur $[1, +\infty[$ donc l'intégrale est impropre en $+\infty$.

Soit $t \geq 1$. Alors $\sqrt{t} \leq t$ donc

$$t + \sqrt{t} \leq 2t$$

et par décroissance de la fonction inverse sur $]0, +\infty[$ on en déduit :

$$\forall t \in [1, +\infty[, \quad \frac{t}{t + \sqrt{t}} \geq \frac{1}{2}.$$

Les fonctions $t \mapsto \frac{t}{t + \sqrt{t}}$ et $t \mapsto \frac{1}{2}$ sont continues et positives sur $[1, +\infty[$ donc, d'après le théorème de comparaison pour les intégrales de fonctions continues positives, comme $\int_1^{+\infty} \frac{1}{2} dt$ diverge, l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{t}{t + \sqrt{t}} dt$ diverge aussi.

2. La fonction $t \mapsto \frac{1}{e^t + e^{-t}}$ est continue sur $[1, +\infty[$ donc l'intégrale est impropre en $+\infty$. Or,

$$\forall t \geq 1, \quad \frac{1}{e^t + e^{-t}} \leq \frac{1}{e^t} = e^{-t}.$$

Les fonctions $t \mapsto \frac{1}{e^t + e^{-t}}$ et $t \mapsto e^{-t}$ sont continues et positives sur $[1, +\infty[$ donc, d'après le théorème de comparaison pour les intégrales de fonctions continues positives, comme $\int_1^{+\infty} e^{-t} dt$ converge (exemple de référence), l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{e^t + e^{-t}}$ converge aussi.

3. La fonction $t \mapsto \frac{1}{1 + t + t^n}$ est continue sur $[1, +\infty[$. L'intégrale est donc impropre en $+\infty$.

- Si $n \geq 2$. Pour tout $t \in [1, +\infty[$ on a

$$1 + t + t^n \geq t^n \quad \text{donc} \quad \frac{1}{1 + t + t^n} \leq \frac{1}{t^n}.$$

Les fonctions $t \mapsto \frac{1}{1 + t + t^n}$ et $t \mapsto \frac{1}{t^n}$ sont continues, positives sur $[1, +\infty[$ et $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^n} dt$ est une intégrale convergente car $n > 1$ (faire le calcul explicite). D'après le critère de comparaison pour les intégrales de fonctions continues positives, on en déduit que $\int_1^{+\infty} \frac{1}{1 + t + t^n} dt$ converge aussi.

- Si $n = 1$. Pour tout $t \in [1, +\infty[$ on a

$$1 + t + t^n = 1 + 2t \leq 3t \quad \text{donc} \quad \frac{1}{1 + t + t^n} \geq \frac{1}{3t}.$$

Les fonctions $t \mapsto \frac{1}{1 + t + t^n}$ et $t \mapsto \frac{1}{3t}$ sont continues, positives sur $[1, +\infty[$ et $\int_1^{+\infty} \frac{1}{3t} dt$ est une intégrale divergente (faire le calcul explicite). D'après le critère de comparaison pour les intégrales de fonctions continues positives, on en déduit que $\int_1^{+\infty} \frac{1}{1 + t + t^n} dt$ diverge aussi.

- Si $n = 0$. Pour tout $t \in [1, +\infty[$ on a

$$1 + t + t^n = 2 + t \leq 3t \quad \text{donc} \quad \frac{1}{1 + t + t^n} \geq \frac{1}{3t}.$$

Et on conclut comme précédemment que l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{1}{1 + t + t^n} dt$ diverge.

4. La fonction $t \mapsto \frac{\ln(t)}{\sqrt{t}}$ est continue sur $[1, +\infty[$. L'intégrale est donc impropre en $+\infty$.

De plus, pour tout $t \geq e$ on a

$$\frac{\ln(t)}{\sqrt{t}} \geq \frac{1}{\sqrt{t}}.$$

Les fonctions $t \mapsto \frac{\ln(t)}{\sqrt{t}}$ et $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t}}$ sont continues, positives sur $[1, +\infty[$ et $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{t}} dt$ est une intégrale divergente (faire le calcul explicite). D'après le critère de comparaison pour les intégrales de fonctions continues positives, on en déduit que $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(t)}{\sqrt{t}} dt$ diverge.

5. La fonction $t \mapsto \frac{1}{t^3 \ln(t)}$ est continue sur $[2, +\infty[$. L'intégrale est donc impropre en $+\infty$.

De plus, pour tout $t \geq 2$ on a

$$\frac{1}{t^3 \ln(t)} \leq \frac{1}{\ln(2)t^3}.$$

Les fonctions $t \mapsto \frac{1}{t^3 \ln(t)}$ et $t \mapsto \frac{1}{t^3 \ln(2)}$ sont continues, positives sur $[2, +\infty[$ et $\int_2^{+\infty} \frac{1}{t^3 \ln(2)} dt$ est une intégrale convergente (faire le calcul explicite). D'après le critère de comparaison pour les intégrales de fonctions continues positives, on en déduit que $\int_2^{+\infty} \frac{1}{t^3 \ln(t)} dt$ converge aussi.

Correction de l'exercice 6.

1. La fonction $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t^2 + t}}$ est continue sur $]0, 1]$. L'intégrale est impropre en 0.

- $\sqrt{t^2 + t} \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} \sqrt{t}$ donc $\frac{1}{\sqrt{t^2 + t}} \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{1}{\sqrt{t}}$;
- les fonctions $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t^2 + t}}$ et $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t}}$ sont continues et positives sur $]0, 1]$

D'après le critère d'équivalence pour les intégrales de fonctions continues positives, on en déduit que $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t^2 + t}} dt$ et $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} dt$ sont de même nature. Comme $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} dt$ converge (faire le calcul explicite), l'intégrale $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t^2 + t}} dt$ converge aussi.

2. La fonction $t \mapsto \frac{\sqrt{t}}{e^t - 1 - t}$ est continue sur $]0, 1]$. L'intégrale est impropre en 0.

- par DL usuels, on sait que

$$e^t - 1 - t = \frac{t^2}{2} + o_{n \rightarrow +\infty}(t^2).$$

En particulier, $e^t - 1 - t \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{t^2}{2}$ et par compatibilité de la relation d'équivalence avec le passage au quotient, on déduit l'équivalent suivant

$$\frac{\sqrt{t}}{e^t - 1 - t} \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{2}{t^{\frac{3}{2}}}.$$

- les fonctions $t \mapsto \frac{\sqrt{t}}{e^t - 1 - t}$ et $t \mapsto \frac{2}{t^{\frac{3}{2}}}$ sont continues et positives sur $]0, 1]$.

D'après le critère d'équivalence pour les intégrales de fonctions continues positives, on en déduit que $\int_0^1 \frac{2}{t^{\frac{3}{2}}} dt$ et $\int_0^1 \frac{\sqrt{t}}{e^t - 1 - t} dt$ sont de même nature. Comme $\int_0^1 \frac{2}{t^{\frac{3}{2}}} dt$ diverge (faire le calcul explicite), l'intégrale $\int_0^1 \frac{\sqrt{t}}{e^t - 1 - t} dt$ diverge aussi.

3. La fonction $t \mapsto \frac{1}{t^2 + 1}$ est continue sur $[0, +\infty[$. L'intégrale est donc impropre en $+\infty$.

- $t^2 + 1 \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} t^2$ donc $\frac{1}{t^2 + 1} \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{t^2}$;
- les fonctions $t \mapsto \frac{1}{t^2 + 1}$ et $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ sont continues et positives sur $[1, +\infty[$.

D'après le critère d'équivalence pour les intégrales de fonctions continues positives, on en déduit que $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2+1} dt$ et $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$ sont de même nature. Comme $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$ converge (faire le calcul explicite), l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2+1} dt$ converge aussi.

Enfin, comme $t \mapsto \frac{1}{t^2+1}$ est continue sur $[0, 1]$, l'intégrale $\int_0^1 \frac{1}{t^2+1} dt$ est bien définie et par la relation de Chasles on déduit que $\int_0^{+\infty} \frac{1}{t^2+1} dt$ converge.

Attention : on ne peut pas appliquer directement le critère sur $[0, +\infty[$ car la fonction $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ n'est pas continue sur $[0, +\infty[$ (elle n'est pas définie en 0 !) et l'intégrale impropre $\int_0^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$ diverge.

Correction de l'exercice 7.

- La fonction $t \mapsto \frac{t^2+2t}{t^4+1}$ est continue sur $[0, +\infty[$. L'intégrale est donc impropre en $+\infty$. De plus, par équivalent usuel et compatibilité des équivalents avec le quotient on a :

$$\frac{t^2+2t}{t^4+1} \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{t^2}.$$

Les fonctions $t \mapsto \frac{t^2+2t}{t^4+1}$ et $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ sont continues, positives sur $[1, +\infty[$. D'après le critère d'équivalence pour les intégrales de fonctions continues positives, on en déduit que et $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$ et $\int_1^{+\infty} \frac{t^2+2t}{t^4+1} dt$ sont de même nature. Comme $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$ est une intégrale convergente, $\int_1^{+\infty} \frac{t^2+2t}{t^4+1} dt$ converge aussi.

Comme de plus, $t \mapsto \frac{t^2+2t}{t^4+1}$ est continue sur $[0, 1]$ l'intégrale $\int_0^1 \frac{t^2+2t}{t^4+1} dt$ existe.

Finalement $\int_0^{+\infty} \frac{t^2+2t}{t^4+1} dt$ converge.

Attention : on ne peut pas appliquer directement le critère sur $[0, +\infty[$ car la fonction $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ n'est pas continue sur $[0, +\infty[$ (elle n'est pas définie en 0 !).

- La fonction $x \mapsto \frac{1}{x^2-x+1}$ est continue sur \mathbb{R} car pour tout réel x , $x^2-x+1 > 0$. L'intégrale est donc impropre en $-\infty$ et en $+\infty$.

- Étude de $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2-x+1} dx$.

Par équivalent usuel et compatibilité des équivalents avec le quotient on a :

$$\frac{1}{x^2-x+1} \underset{x \rightarrow -\infty}{\sim} \frac{1}{x^2}.$$

Les fonctions $x \mapsto \frac{1}{x^2-x+1}$ et $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ sont continues, positives sur $] -\infty, -1]$. D'après le critère d'équivalence pour les intégrales de fonctions conti-

nues positives, on en déduit que $\int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{x^2} dx$ et $\int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{x^2 - x + 1} dx$ sont de même nature. Comme $\int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{x^2} dx$ est une intégrale convergente, $\int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{x^2 - x + 1} dx$ converge aussi.

Comme de plus, $x \mapsto \frac{1}{x^2 - x + 1}$ est continue sur $[-1, 0]$ l'intégrale $\int_{-1}^0 \frac{1}{x^2 - x + 1} dx$ existe.

Finalement $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2 - x + 1} dx$ converge donc.

- On montre de la même façon que $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 - x + 1} dx$ converge.
- Comme $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2 - x + 1} dx$ et $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 - x + 1} dx$ convergent alors $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2 - x + 1} dx$ converge.

3. La fonction $t \mapsto \frac{1}{(1+t^2)\sqrt{1-t^2}}$ est continue sur $]-1, 1[$. L'intégrale est impropre en -1 et en 1 .

- Étude de $\int_{-1}^0 \frac{1}{(1+t^2)\sqrt{1-t^2}} dt$.

On a :

$$\frac{1}{(1+t^2)\sqrt{1-t^2}} = \frac{1}{(1+t^2)\sqrt{(1-t)(1+t)}} \underset{t \rightarrow -1^+}{\sim} \frac{1}{2\sqrt{2}\sqrt{t+1}}.$$

Les fonctions $t \mapsto \frac{1}{(1+t^2)\sqrt{1-t^2}}$ et $t \mapsto \frac{1}{2\sqrt{2}\sqrt{t+1}}$ sont continues et positives sur $]-1, 0[$.

D'après le critère d'équivalence pour les intégrales de fonctions continues positives, on en déduit que $\int_{-1}^0 \frac{1}{(1+t^2)\sqrt{1-t^2}} dt$ et $\int_{-1}^0 \frac{1}{2\sqrt{2}\sqrt{1+t}} dt$ sont de même nature.

Soit $A \in]-1, 0]$. On a

$$\int_A^0 \frac{1}{2\sqrt{2}\sqrt{1+t}} dt = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\sqrt{1+t} \right]_A^0 = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{1+A}}{\sqrt{2}}.$$

Ainsi $\lim_{A \rightarrow -1^+} \int_A^0 \frac{1}{2\sqrt{2}\sqrt{1+t}} dt = \frac{1}{\sqrt{2}}$. En particulier, $\int_{-1}^0 \frac{1}{2\sqrt{2}\sqrt{1+t}} dt$ converge et donc $\int_{-1}^0 \frac{1}{(1+t^2)\sqrt{1-t^2}} dt$ converge aussi.

- On montre de même que $\int_0^1 \frac{1}{(1+t^2)\sqrt{1-t^2}} dt$ converge.
- Comme $\int_{-1}^0 \frac{1}{(1+t^2)\sqrt{1-t^2}} dt$ et $\int_0^1 \frac{1}{(1+t^2)\sqrt{1-t^2}} dt$ convergent, $\int_{-1}^1 \frac{1}{(1+t^2)\sqrt{1-t^2}} dt$ converge.

4. La fonction $t \mapsto \frac{1}{e^{\frac{1}{t}} - 1}$ est continue sur $[1, +\infty[$. L'intégrale est donc impropre en $+\infty$.

On sait par équivalent usuel :

$$e^{\frac{1}{t}} - 1 \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{t}.$$

D'où :

$$\frac{\frac{1}{t}}{e^{\frac{1}{t}} - 1} \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} 1.$$

Les fonctions $t \mapsto \frac{\frac{1}{t}}{e^{\frac{1}{t}} - 1}$ et $t \mapsto 1$ sont continues, positives sur $[1, +\infty[$. D'après le critère d'équivalence pour les intégrales de fonctions continues positives, on en déduit que $\int_1^{+\infty} e^{\frac{1}{t}} dt$ et $\int_1^{+\infty} 1 dt$ sont de même nature. Comme cette dernière est une intégrale divergente, $\int_1^{+\infty} \frac{\frac{1}{t}}{e^{\frac{1}{t}} - 1} dt$ diverge aussi.

5. La fonction $t \mapsto \sqrt{\frac{t}{2t^2 + 1}}$ est continue sur $[0, +\infty[$. L'intégrale est donc impropre en $+\infty$. De plus, on vérifie à l'aide de la caractérisation que l'on a :

$$\sqrt{\frac{t}{2t^2 + 1}} \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{2t}}.$$

Les fonctions $t \mapsto \sqrt{\frac{t}{2t^2 + 1}}$ et $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{2t}}$ sont continues, positives sur $[c, +\infty[$ pour tout $c > 0$. D'après le critère d'équivalence pour les intégrales de fonctions continues positives, on en déduit que et $\int_c^{+\infty} \sqrt{\frac{t}{2t^2 + 1}} dt$ et $\int_c^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2t}} dt$ sont de même nature.

Comme cette dernière est une intégrale divergente, $\int_c^{+\infty} \sqrt{\frac{t}{2t^2 + 1}} dt$ diverge aussi pour tout $c > 0$. Donc $\int_0^{+\infty} \sqrt{\frac{t}{2t^2 + 1}} dt$ diverge.

6. La fonction $t \mapsto \ln\left(1 + \frac{1}{t^2}\right)$ est continue sur $[1, +\infty[$. L'intégrale est donc impropre en $+\infty$. De plus par équivalent usuel, on a :

$$\ln\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{t^2}.$$

Les fonctions $t \mapsto \ln\left(1 + \frac{1}{t^2}\right)$ et $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ sont continues, positives sur $[1, +\infty[$. D'après le critère d'équivalence pour les intégrales de fonctions continues positives, on en déduit que et $\int_1^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) dt$ et $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$ sont de même nature. Comme cette dernière est une intégrale convergente, $\int_1^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) dt$ converge aussi.

Correction de l'exercice 8. Soit $a > 0$.

1. Intégrales de Riemann.

Au niveau du contexte général, l'intégrande $t \mapsto \frac{1}{t^a}$ est continue sur $]0, +\infty[$, considérer la nature (et la valeur éventuelle) des intégrales généralisées $\int_0^1 \frac{dt}{t^a}$, $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^a}$ et $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^a}$ a donc un sens.

- (a) Concernant $\int_0^1 \frac{dt}{t^a}$ qui a une singularité en 0, soit $\epsilon > 0$ un nombre réel destiné à tendre vers 0^+ .

— Si $a \neq 1$, on a

$$\int_{\epsilon}^1 \frac{dt}{t^a} = \left[\frac{1}{1-a} t^{-a+1} \right]_{\epsilon}^1 = \frac{1}{1-a} (\epsilon^{1-a} - 1)$$

Deux cas se distinguent alors

— Si $a > 1$ alors $1 - a < 0$ et

$$\int_{\epsilon}^1 \frac{dt}{t^a} \xrightarrow[\epsilon \rightarrow 0^+]{} +\infty$$

L'intégrale généralisée est divergente vers $+\infty$.

— Si $a < 1$ alors $1 - a > 0$ et

$$\int_{\epsilon}^1 \frac{dt}{t^a} \xrightarrow[\epsilon \rightarrow 0^+]{} \frac{1}{1-a}$$

L'intégrale généralisée est convergente vers $\frac{1}{1-a}$.

— Si $a = 1$, on a

$$\int_{\epsilon}^1 \frac{dt}{t} = [\ln t]_{\epsilon}^1 = -\ln \epsilon \xrightarrow[\epsilon \rightarrow 0^+]{} +\infty$$

L'intégrale généralisée est divergente vers $+\infty$.

- (b) Concernant $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^a}$ qui a une singularité en $+\infty$, soit $T > 0$ un nombre réel destiné à tendre vers $+\infty$.

— Si $a \neq 1$, on a

$$\int_1^T \frac{dt}{t^a} = \left[\frac{1}{1-a} t^{-a+1} \right]_1^T = \frac{1}{1-a} (T^{1-a} - 1)$$

Deux cas se distinguent alors

— Si $a > 1$ alors $1 - a < 0$ et

$$\int_1^T \frac{dt}{t^a} \xrightarrow[T \rightarrow +\infty]{} \frac{1}{a-1}$$

L'intégrale généralisée est convergente vers $\frac{1}{a-1}$.

— Si $a < 1$ alors $1 - a > 0$ et

$$\int_1^T \frac{dt}{t^a} \xrightarrow[T \rightarrow +\infty]{} +\infty$$

L'intégrale généralisée est divergente vers $+\infty$.

— Si $a = 1$, on a

$$\int_1^T \frac{dt}{t} = [\ln t]_1^T = \ln T \xrightarrow[T \rightarrow +\infty]{} +\infty$$

L'intégrale généralisée est divergente vers $+\infty$.

Concernant $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^a}$, la synthèse des cas précédents montre qu'elle divergente dans tous les cas. On peut faire cette synthèse sous forme de tableau

a	0	1	$+\infty$
$\int_0^1 \frac{dt}{t^a}$	\parallel	$\frac{1}{1-a}$	DV
$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^a}$	\parallel	DV	DV
$\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^a}$	\parallel	DV	DV

2. Intégrales de Bertrand.

Pour $a > 0$, $b > 0$ fixés, la fonction $t \mapsto \frac{1}{t^a |\ln t|^b}$ est continue sur chacun des intervalles $\left[0, \frac{1}{2}\right]$, $[2, +\infty[,]1, 2]$, $]1, +\infty[$, les intégrales généralisées dont il est question dans la suite ont toutes un sens avec des singularités précisées dans chacun des cas. Remarquons aussi que cette intégrande est positive.

- (a) Cette intégrale généralisée a une singularité en 0. En effectuant le changement de variable généralisé $u = -\ln t$, $du = -\frac{1}{t} dt$, C^1 strictement décroissant de $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ sur $[\ln 2, +\infty[$, l'intégrale $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^{a-1} |\ln t|^a}$ en question est de même nature que
- $$\int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{1}{u^a} du$$

et, d'après la question sur les intégrales de Riemann, on a

- Si $a \leq 1$: Divergence
- Si $a > 1$: Convergence et vaut $\frac{1}{a-1} (\ln 2)^{1-a}$.

- (b) De façon analogue au cas précédent, cette intégrale généralisée a une singularité en $+\infty$. En effectuant le changement de variable généralisé $u = \ln t$, $du = \frac{1}{t} dt$,

\mathcal{C}^1 strictement croissant de $[2, +\infty[$ sur $[\ln 2, +\infty[$, l'intégrale $\int_2^{+\infty} \frac{dt}{t|\ln t|^a}$ en question est de même nature que

$$\int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{1}{u^a} du$$

et, d'après la question sur les intégrales de Riemann, on a

- Si $a \leq 1$: Divergence
- Si $a > 1$: Convergence et vaut $\frac{1}{a-1}(\ln 2)^{1-a}$.

(c) Cette intégrale généralisée a une singularité en 1. Par le changement de variable affine $t = 1+u$, elle est de même nature (détailler ?) que l'intégrale généralisée

$$\int_0^1 \frac{1}{(1+u)\ln(1+u)^a} du$$

qui a une singularité en 0.

Comme $\ln(1+u) \sim_0 u$, $1+u \sim_0 1$,

$$\frac{1}{(1+u)\ln(1+u)^a} \sim_0 u^{-a}$$

et, en rédigeant l'argument de l'équivalent proprement on montre alors, toujours en se basant sur le critère de convergence des intégrales de Riemann, que

- Si $a < 1$: Convergence
- Si $a \geq 1$: Divergence

(d) L'intégrale généralisée

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t|\ln t|^a}$$

a deux singularités, l'une en 0, l'autre en $+\infty$. Les question précédentes montrent que quelques soit la valeur de $a > 0$, l'une des deux intégrales généralisées $\int_1^2 \frac{dt}{t|\ln t|^a}$ ou $\int_2^{+\infty} \frac{dt}{t|\ln t|^a}$ diverge. Donc $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t|\ln t|^a}$ est divergente, quelque soit la valeur de $a > 0$.

(e) — Pour le cas de $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dt}{t^a |\ln t|^b}$ qui a une singularité en 0.
— Si $a > 1$, prenons $1 < a' < a$. On a

$$\frac{1}{t^a |\ln t|^b} \cdot t^{a'} = \frac{t^{a'-a}}{|\ln t|^b} \xrightarrow[t \rightarrow 0^+]{} +\infty.$$

Il existe donc un nombre réel $\frac{1}{2} > \delta > 0$ tel que

$$\forall t \in]0, \delta], \frac{1}{t^a |\ln t|^b} \cdot t^{a'} \geq 1$$

et donc

$$\forall t \in]0, \delta], \frac{1}{t^a |\ln t|^b} \geq t^{-a'} > 0$$

Comme $\int_0^\delta t^{-a'} dt$ diverge (question 1 car $a' > 1$) alors, par le théorème de comparaison, $\int_0^\delta \frac{1}{t^a |\ln t|^b}$ diverge et, par Chasles, $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{t^a |\ln t|^b}$ diverge.

- Si $a < 1$, prenons $1 > a' > a$. On a

$$\frac{1}{t^a |\ln t|^b} \cdot t^{a'} = \frac{t^{a'-a}}{|\ln t|^b} \xrightarrow[t \rightarrow 0^+]{} 0$$

Il existe donc un nombre réel $\frac{1}{2} > \delta > 0$ tel que

$$\forall t \in]0, \delta], 0 < \frac{1}{t^a |\ln t|^b} \cdot t^{a'} \leq 1$$

et donc

$$\forall t \in]0, \delta], 0 < \frac{1}{t^a |\ln t|^b} \leq t^{-a'} > 0$$

Comme $\int_0^\delta t^{-a'} dt$ converge (question 1, car $a' < 1$) alors, par le théorème de comparaison, $\int_0^\delta \frac{1}{t^a |\ln t|^b}$ converge et, par Chasles, $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{t^a |\ln t|^b}$ converge.

- Concernant l'intégrale généralisée $\int_2^{+\infty} \frac{dt}{t^a |\ln t|^b}$, les mêmes méthodes (comparaison asymptotique lorsque $t \rightarrow +\infty$ conduisent à la conclusion
 - Si $a > 1$, l'intégrale converge.
 - Si $a < 1$, l'intégrale diverge.
- On peut remarquer que dans chaque cas, la discussion ne porte pas sur la valeur de b

2 Autre

Correction de l'exercice 9. On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos(tx)}{t^2} dt.$$

1. Pour montrer que la fonction f est définie sur \mathbb{R} , il s'agit de montrer que, pour $x \in \mathbb{R}$ quelconque, l'intégrale généralisée dans la formule définissant $f(x)$ est convergente. Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé.
 - Si $x = 0$, l'intégrande vaut 0, $f(0) = 0$.
 - On suppose $x \neq 0$. L'intégrande $t \mapsto \frac{1 - \cos(tx)}{t^2}$, est clairement continue sur $]0, +\infty[$, le problème de la nature de l'intégrale généralisée a donc un sens, elle a deux singularités, l'une en 0 et l'autre en $+\infty$.

— En 0, on a, lorsque $t \rightarrow 0^+$:

$$\frac{1 - \cos(tx)}{t^2} \sim \frac{1}{2}(xt)^2 \frac{1}{t^2} = \frac{1}{2}x^2.$$

L'intégrande se prolonge par continuité en 0 et l'intégrale $\int_0^1 \dots$ est une intégrale faussement généralisée.

— En $+\infty$, on a

$$\forall t \geq 1, 0 \leq \left| \frac{1 - \cos(tx)}{t^2} \right| \leq \frac{2}{t^2}$$

Or $\int_1^{+\infty} \frac{2}{t^2} dt$ est convergente (refaire le calcul), donc, par comparaison, $\int_1^{+\infty} \left| \frac{1 - \cos(tx)}{t^2} \right| dt$ converge et donc, l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{1 - \cos(tx)}{t^2} dt$ est *absolument* convergente et donc convergente.

— Les deux intégrales $\int_0^1 \dots$ et $\int_1^{+\infty} \dots$ sont convergentes et par définition, l'intégrale $\int_0^{+\infty} \dots$ est convergente.

2. Il est clair que \mathbb{R} est symétrique par rapport à 0. Soit $x \in \mathbb{R}$, comme, par parité de \cos ,

$$\forall t > 0, \frac{1 - \cos(t(-x))}{t^2} = \frac{1 - \cos(tx)}{t^2}$$

il vient, après intégration, $f(x) = f(-x)$.

La fonction f est donc paire.

3. Supposons que $x > 0$, en effectuant le changement de variable affine $u = t.x$, monotone de $]0, +\infty[$ sur $]0, +\infty[$, ($du = x.dt$), on a

$$\int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos(tx)}{t^2} dt = \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos(u)}{(u/x)^2} \frac{1}{x} \cdot x \cdot du = x \cdot \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos(u)}{u^2} du = x.f(1)$$

Comme f est paire et $f(0) = 0$, on obtient que

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(1).|x|$$

NB : Montrer que $f(1) = \pi/2$ demande beaucoup de travail.

Correction de l'exercice 10.

1. L'intégrale généralisée est impropre en $+\infty$. Soit $A \in [0, +\infty[$.

$$\int_0^A \frac{dt}{1+t^2} = [\arctan(t)]_0^A \xrightarrow[A \rightarrow +\infty]{} \frac{\pi}{2}.$$

Donc $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2}$ est convergente et vaut $\frac{\pi}{2}$.

2. On a pour tout $t \in [0, +\infty[$:

$$0 \leq \frac{1}{(1+t^2)^n} \leq \frac{1}{1+t^2}.$$

Par comparaison pour les intégrales de fonctions continues positives, on déduit de la question précédente que $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)^n}$ converge aussi.

3. On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)^n}$ et $J_n = \int_0^{+\infty} \frac{t^2 dt}{(1+t^2)^{n+1}}$.

(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a :

$$\begin{aligned} J_n + I_{n+1} &= \int_0^{+\infty} \left(\frac{t^2}{(1+t^2)^{n+1}} + \frac{1}{(1+t^2)^{n+1}} \right) dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{t^2 + 1}{(1+t^2)^{n+1}} dt \\ &= I_n. \end{aligned}$$

(b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in [0, +\infty[$. Les fonctions $u : t \mapsto t$ et $v : t \mapsto \frac{1}{2} \frac{-1}{n(1+t^2)^n}$ sont de classe \mathcal{C}^1 sur $[0, A]$ donc par IPP :

$$\begin{aligned} \int_0^A \frac{t^2}{(1+t^2)^{n+1}} dt &= \int_0^A u(t)v'(t)dt \\ &= [u(t)v(t)]_0^A - \int_0^A u'(t)v(t)dt \\ &= \frac{-A}{2n(1+A^2)^n} - \int_0^A \frac{-1}{2n(1+t^2)^n} dt \\ &= \frac{-A}{2n(1+A^2)^n} + \frac{1}{2n} \int_0^A \frac{1}{(1+t^2)^n} dt. \end{aligned}$$

En faisant tendre A vers $+\infty$ on obtient :

$$J_n = \frac{1}{2n} I_n.$$

(c) D'après les deux questions précédentes :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \frac{1}{2n} I_n + I_{n+1} = I_n$$

i.e.

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad I_{n+1} = \frac{2n-1}{2n} I_n.$$

Par récurrence, on obtient alors, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{(2(n-1)-1)(2(n-2)-1)\cdots 1}{(2n-2)(2n-4)\cdots 2} I_1 = \frac{(2n-3)(2n-5)\cdots 1}{2^{n-1}(n-1)!} \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{(2n-2)(2n-3)(2n-4)(2n-5)\cdots 1}{(2^{n-1}(n-1)!)^2} \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{(2n-2)!}{(2^{n-1}(n-1)!)^2} \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Correction de l'exercice 11.

1. La fonction $t \mapsto \frac{\sin(t)}{t}$ est prolongeable par continuité en 0 par 1 donc il s'agit d'une fausse impropreté.

Donc l'intégrale converge.

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La fonction H_n est une somme (finie) de fonctions de classe \mathcal{C}^∞ sur \mathbb{R} donc elle est \mathcal{C}^∞ sur \mathbb{R} .

Par ailleurs :

$$H_n(0) = \sum_{k=1}^n \frac{\sin(k)}{k} = 0.$$

3. Le code :

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def H(n, x):
    s = 0
    for k in range(1, n+1):
        s = s + np.sin(k*x)/k
    return s

X=np.linspace(0, 10, 100)
for n in [2, 10, 15, 20]:
    plt.plot(X, H(n, X))
plt.show()
```

4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En notant f la fonction $t \mapsto \frac{\sin(t)}{t}$ prolongée en 0, continue sur $[0, 1]$, on a :

$$H_n\left(\frac{1}{n}\right) = \sum_{k=1}^n \frac{\sin\left(\frac{k}{n}\right)}{k} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\sin\left(\frac{k}{n}\right)}{\frac{k}{n}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right).$$

On reconnaît une somme de Riemann dont on sait qu'elle tend vers $\int_0^1 \frac{\sin(t)}{t} dt$.

Cette limite est strictement positive car l'intégrande est strictement positif.

Correction de l'exercice 12.

1. Soit $x > 0$. la fonction $t \mapsto \frac{e^{-t}}{t}$ est continue sur $[x, +\infty[$ donc l'intégrale est impropre en $+\infty$. Par croissance comparée, on sait que :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} t^2 \times \frac{e^{-t}}{t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} te^{-t} = 0.$$

$$\text{Ainsi : } \frac{e^{-t}}{t} = \underset{t \rightarrow +\infty}{o}\left(\frac{1}{t^2}\right).$$

De plus, les fonctions $x \mapsto \frac{1}{t^2}$ et $t \mapsto \frac{e^{-t}}{t}$ sont continues et positives sur $[x, +\infty[$. D'après le théorème de comparaison pour les intégrales de fonctions continues positives, comme l'intégrale de Riemann $\int_x^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$ converge alors $J(x)$ converge aussi.

2. (a) Soit $A \in [x, +\infty[$. On a :

$$\forall t \in [x, +\infty[, \quad \frac{e^{-t}}{t^2} \leq e^{-t} \times \frac{1}{x^2}.$$

Donc :

$$\begin{aligned}\int_x^A \frac{e^{-t}}{t^2} dt &\leq \frac{1}{x^2} \int_x^A e^{-t} dt \\ &\leq \frac{1}{x^2} (e^{-x} - e^{-A}) \\ &\leq \frac{1}{x^2} e^{-x}.\end{aligned}$$

En particulier, la fonction $A \mapsto \int_x^A \frac{e^{-t}}{t^2} dt$ est croissante et majorée donc possède une limite en $+\infty$. On en déduit donc que l'intégrale $\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^2} dt$ converge et vérifie :

$$\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^2} dt \leq \frac{1}{x^2} e^{-x}.$$

On en déduit l'encadrement :

$$0 \leq \frac{\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^2} dt}{\frac{e^{-x}}{x}} \leq \frac{1}{x}.$$

Ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^2} dt}{\frac{e^{-x}}{x}} = 0.$$

Cela signifie : $\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^2} dt = \underset{x \rightarrow +\infty}{o} \left(\frac{e^{-x}}{x} \right)$.

- (b) Soient $x > 0$ et $A > x$. Les fonctions $u : t \mapsto \frac{1}{t}$ et $v : t \mapsto -e^{-t}$ sont de classe C^1 sur $[x, A]$. Par intégration par parties, on a donc :

$$\begin{aligned}\int_x^A \frac{e^{-t}}{t} dt &= \int_x^A u(t)v'(t)dt \\ &= [u(t)v(t)]_x^A - \int_x^A u'(t)v(t)dt \\ &= -\frac{e^{-A}}{A} + \frac{e^{-x}}{x} - \int_x^A \frac{e^{-t}}{t^2} dt.\end{aligned}$$

En faisant tendre A vers $+\infty$ et avec la question précédente on obtient donc :

$$J(x) = \frac{e^{-x}}{x} - \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^2} dt = \frac{e^{-x}}{x} + \underset{x \rightarrow +\infty}{o} \left(\frac{e^{-x}}{x} \right).$$

D'après la caractérisation de la relation d'équivalence, on a bien :

$$J(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{e^{-x}}{x}.$$

Correction de l'exercice 13. Soit $I_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \sin x \cdot e^{-x} dx$.

On se ramène à l'intervalle $[0, \pi]$ par « translation » en posant $t = x - n\pi$ (changement de variables affine), pour obtenir

$$I_n = \int_0^\pi \sin(t + n\pi) e^{-(t+n\pi)} dt = (-1)^n e^{-n\pi} \int_0^\pi \sin(t) e^{-t} dt = (-1)^n e^{-n\pi} I_0$$

La suite (I_n) est donc une suite géométrique de raison $-e^{-\pi}$.

Concernant la convergence de l'intégrale généralisée $\int_0^{+\infty} \sin x \cdot e^{-x} dx$:

- Son intégrande $x \mapsto \sin x \cdot e^{-x}$ est continue sur $[0, +\infty[$
- $\forall x \geq 0, 0 \leq |\sin(x)e^{-x}| \leq e^{-x}$,
- Comme $\int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1$ (calcul explicite), on en déduit par le théorème de comparaison que $\int_0^{+\infty} \sin(x)e^{-x} dx$ est absolument convergente et donc convergente.

Si N est un entier (tendant vers $+\infty$), on a, par Chasles,

$$\sum_{n=0}^N I_n = \int_0^{(N+1)\pi} \sin(x) e^{-x} dx \xrightarrow[N \rightarrow +\infty]{} \int_0^{+\infty} \sin(x) e^{-x} dx.$$

Or pour $N \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{n=0}^N I_n = I_0 \cdot \frac{1 - (-e^{-\pi})^N}{1 + e^{-\pi}} \quad (\text{somme géométrique})$$

et donc

$$\sum_{n=0}^N I_n \xrightarrow[N \rightarrow +\infty]{} I_0 \cdot \frac{1}{1 + e^{-\pi}}.$$

Par unicité de la limite, on a donc

$$\int_0^{+\infty} \sin(x) e^{-x} dx = I_0 \cdot \frac{1}{1 + e^{-\pi}}$$

Cette formule donne le lien entre les deux parties de l'exercice.

Concernant la valeur cette intégrale, on peut primitiver $x \mapsto \sin(x)e^{-x}$ en constatant qu'il s'agit de la partie imaginaire de $x \mapsto e^{(-1+i)x}$ dont une primitive est $x \mapsto \frac{1}{-1+i} e^{(-1+i)x} = -\frac{1}{2}(1+i)e^{(-1+i)x}$. Comme

$$\operatorname{Im}\left(-\frac{1}{2}(1+i)e^{(-1+i)x}\right) = -\frac{1}{2}(e^{-x} \cos(x) + e^{-x} \sin(x)),$$

on a alors

$$I_0 \int_0^{+\infty} \sin(x) e^{-x} dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2}(e^{-x} \cos(x) + e^{-x} \sin(x)) \right) + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

On peut aussi (calcul classique, sans utiliser les nombres complexes) effectuer deux intégrations par parties successives