1 Rappels

Théorème 1 (Théorème fondamental du calcul intégral)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un intervalle I . Pour tout $a \in I$, la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est l'unique primitive de f sur I qui s'annule en a .

Exemple 2 (à la maison)

La fonction $f : x \mapsto \int_x^{x^2} e^{-t^2} dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 2xe^{-x^4} - e^{-x^2}$.

Théorème 3 (Inégalité triangulaire)

Pour toute fonction f continue sur un segment $[a, b]$, $\left| \int_{[a,b]} f \right| \leq \int_{[a,b]} |f|$.

Exemple 4 (à la maison)

Montrer l'encadrement suivant : $-\frac{\pi}{4} \leq \int_0^1 \frac{\cos(2t)}{1+t^2} dt \leq \frac{\pi}{4}$.

Théorème 5 (Convergence des sommes de Riemann)

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[0, 1]$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $G_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right)$ et $D_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$.

Les suites $(G_n)_{n \geq 1}$ et $(D_n)_{n \geq 1}$ convergent toutes les deux vers le réel $\int_0^1 f(t) dt$.

Exemple 6 (à la maison)

$$\left\| \text{Montrer que } \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \ln 2. \right.$$

Théorème 7 (Intégration par parties)

Si u et v sont deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur le segment $[a, b]$, alors :

$$\int_a^b u'(t)v(t) dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t) dt.$$

Exemple 8 (à la maison)

$$\left\| \text{Montrer que } \int_0^1 t \arctan t dt = \frac{\pi - 2}{4}. \right.$$

Théorème 9 (Théorème du changement de variable)

Soient $u : I \rightarrow J$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et $f : J \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur J . Alors, pour tout $(a, b) \in I^2$, on a :

$$\int_a^b f(u(t)) u'(t) dt = \int_{u(a)}^{u(b)} f(x) dx.$$

Exemple 10 (à la maison)

|| Montrer que $\int_1^e \frac{dt}{t + t \ln t} = \ln 2$.

2 Notion d'intégrale généralisée**2.1 Intégration sur un intervalle semi-ouvert****2.1.1 Définitions****Définition 11**

Soit f une fonction continue sur $[a, b[$ où $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ et $a < b$.

On dit que l'intégrale de f sur $[a, b[$ **converge** si l'intégrale *partielle* $\int_a^x f(t) dt$ converge lorsque x tend vers b^- .

On note alors :

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t) dt.$$

On dit que l'intégrale **diverge** dans le cas contraire.

Remarque 12 (Interprétation géométrique)

L'intégrale $\int_a^b f(t) dt$ converge si, et seulement si, l'aire sous la courbe entre a et x converge lorsque $x \rightarrow b$.

Exemple 13 ♡

|| Nature de $\int_0^{+\infty} e^{-t} dt$.

Exemple 14 ♡

|| Nature de $\int_0^{+\infty} 1 dt$.

Exemple 15 ♡

|| Nature de $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t} dt$.

Remarque 16 (Attention !)

Une intégrale généralisée est par définition une limite.

On ne peut donc calculer la valeur d'une intégrale généralisée sans avoir **préalablement** justifier sa convergence.

Définition 17

Soit f une fonction continue sur $]a, b]$ où $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, $b \in \mathbb{R}$ et $a < b$.

On dit que l'intégrale de f sur $]a, b]$ **converge** si l'intégrale *partielle* $\int_x^b f(t) dt$ converge lorsque x tend vers a^+ .

On note alors :

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^b f(t) dt.$$

Exemple 18 ♡

|| Nature de $\int_0^1 \frac{1}{t} dt$.

Exemple 19 ♥

|| Nature de $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} dt$.

2.1.2 Propriétés**Proposition 20 (Relation de Chasles)**

(i) Soient f une fonction continue sur $[a, b[$ et $c \in [a, b[$.

Les intégrales $\int_a^b f$ et $\int_c^b f$ sont **de même nature**, i.e. $\int_a^b f$ converge si, et seulement si, $\int_c^b f$ converge.

(ii) Soient f une fonction continue sur $]a, b]$ et $c \in]a, b]$.

Les intégrales $\int_a^b f$ et $\int_a^c f$ sont **de même nature**, i.e. $\int_a^b f$ converge si, et seulement si, $\int_a^c f$ converge.

En cas de convergence (d'une des intégrales), on a :

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt.$$

Démonstration.

Corollaire 21 (À retenir !)

On ne change pas la *nature* d'une intégrale sur un intervalle semi-ouvert en modifiant un nombre fini de valeurs de l'intégrande : la nature de l'intégrale ne dépend que du comportement de la fonction intégrande au voisinage de la borne ouverte de l'intervalle d'intégration.

Théorème 22 (Linéarité)

Soient f et g deux fonctions continues sur le même intervalle semi-ouvert $I (= [a, b[$ ou $]a, b])$ et soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

Si $\int_a^b f$ et $\int_a^b g$ convergent alors $\int_a^b (f + \lambda g)$ converge et :

$$\int_a^b (f(t) + \lambda g(t)) dt = \int_a^b f(t) dt + \lambda \int_a^b g(t) dt.$$

Démonstration admise.

Remarque 23 (Attention !)

Pour pouvoir exploiter la linéarité, il faut préalablement justifier la convergence d'au moins deux intégrales généralisées. Cela évite d'écrire ce genre d'*aberrations* :

$$\int_0^{+\infty} 0 dt = \int_0^{+\infty} 1 dt - \int_0^{+\infty} 1 dt \quad \text{ou encore} \quad \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t(t+1)} = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t} - \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t+1}.$$

Corollaire 24

Si $\int_a^b f$ converge et $\int_a^b g$ diverge, alors $\int_a^b (f + g)$ diverge.

Démonstration admise.

Remarque 25

Si $\int_a^b f$ et $\int_a^b g$ divergent, on ne peut rien dire de la nature de l'intégrale $\int_a^b (f + g)$; pire : tous les cas existent !

Théorème 26 (Positivité de l'intégrale)

Soit f une fonction continue sur un intervalle semi-ouvert $I (= [a, b[$ ou $]a, b])$.

Si f est positive sur I et si $\int_a^b f$ converge, alors $\int_a^b f(t) dt \geq 0$.

Démonstration.

Corollaire 27 (Croissance de l'intégrale)

Soient f et g deux fonctions continues sur le même intervalle semi-ouvert $I (= [a, b[$ ou $]a, b])$ avec $a < b$.

Si $f \leq g$ sur I et si $\int_a^b f$ et $\int_a^b g$ convergent, alors $\int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b g(t) dt$.

Démonstration admise.

2.2 Cas des fonctions continues sur un segment

Proposition-Définition 28

Soit f une fonction continue sur le segment $[a, b]$.

On dit encore que son intégrale sur $[a, b]$ est **convergente** et on a :

$$\underbrace{\int_{[a,b]} f}_{\text{intégrale sur un segment}} \stackrel{(*)}{=} \underbrace{\int_{[a,b[} f = \int_{]a,b]} f}_{\text{intégrales généralisées}} .$$

Cette valeur commune est encore notée $\int_a^b f$ ou $\int_a^b f(t) dt$.

Démonstration de l'égalité (*).

Remarque 29 (Intégrales faussement impropres)

Si une fonction f continue sur $[a, b[$ (resp. $]a, b]$) admet une limite finie en b^- (resp. a^+), on peut prolonger f en une fonction continue sur $[a, b]$. On peut ainsi affirmer que $\int_a^b f$ converge et on dira que l'intégrale $\int_a^b f$ est **faussement impropre** en b (resp. en a).

Exemple 30 ♡

|| Nature de l'intégrale $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt$.

2.3 Intégration sur un intervalle ouvert

Proposition-Définition 31

Soit f une fonction continue sur $]a, b[$ où $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ et $a < b$.

On dit que l'intégrale de f sur $]a, b[$ **converge** s'il existe $c \in]a, b[$ tel que les intégrales de f sur $]a, c[$ et $[c, b[$ convergent. Dans ce cas, on note :

$$\int_{]a, b[} f(t) dt = \int_{]a, c[} f(t) dt + \int_{[c, b[} f(t) dt. \quad \text{ou encore} \quad \int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt.$$

Ni la nature ni la valeur de l'intégrale ne dépendent du choix du réel $c \in]a, b[$.

Démonstration admise.

Exemple 32

|| Nature et calcul de $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2}$.

Exemple 33 ♡

|| Nature et calcul de l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t|} dt$.

Remarque 34

La nature d'une intégrale sur un intervalle ouvert s'étudie en coupant l'intervalle en deux, et non en étudiant conjointement le comportement aux bornes de l'intervalle, comme illustré ci-dessous.

Considérons l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} t dt$.

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{-x}^x t dt = 0$
- $\int_{-x}^{x+1} t dt = x + \frac{1}{2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$
- $\int_{-x}^{x-1} t dt = -x + \frac{1}{2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$.

On ne peut poser $\int_{-\infty}^{+\infty} t dt = 0$ ni même $+\infty$ ou encore $-\infty$ car le raisonnement n'est pas conforme à la définition.

En réalité, l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} t dt$ diverge car les intégrales $\int_{-\infty}^0 t dt$ et $\int_0^{+\infty} t dt$ divergent (la divergence de l'une des deux suffit).

Remarque 35 (Conventions)

Soit f une fonction continue sur un intervalle I .

Pour tout réel a élément ou extrémité de I , on pose $\int_a^a f = 0$.

Pour tous réels a et b éléments ou extrémités de I tels que $a < b$, on pose :

$$\int_b^a f(t) dt = - \int_a^b f(t) dt.$$

lorsque l'intégrale de f sur $[a, b]$, $[a, b[$, $]a, b]$ ou $]a, b[$ converge.

Théorème 36 (Propriétés des intégrales généralisées)

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un singleton.

(i) Linéarité

Soient f et g deux fonctions continues sur I , et $\lambda \in \mathbb{R}$. Si $\int_I f$ et $\int_I g$ convergent alors $\int_I (f + \lambda g)$ converge et

$$\int_I (f + \lambda g) = \int_I f + \lambda \int_I g.$$

(ii) Positivité

Soit f une fonction continue sur I . Si f est positive sur I et $\int_I f$ converge, alors $\int_I f \geq 0$.

(iii) Stricte positivité

Soit f une fonction continue sur I . Si f est positive et non nulle sur I et $\int_I f$ converge, alors $\int_I f > 0$.

(iv) Croissance

Soient f et g deux fonctions continues sur I . Si $f \leq g$ sur I et si $\int_I f$ et $\int_I g$ convergent, alors $\int_I f \leq \int_I g$.

(v) Relation de Chasles

Soit f une fonction continue sur I . Si $\int_I f$ converge, alors, pour tout réels a , b et c éléments ou extrémités de l'intervalle I , alors les trois intégrales $\int_a^b f(t) dt$, $\int_a^c f(t) dt$ et $\int_c^b f(t) dt$ convergent et :

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt,$$

Démonstration admise.

3 Critères de convergence**3.1 Intégrales de références****Proposition 37**

(i) Les intégrales $\int_0^1 \frac{dx}{x}$, $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ et $\int_0^1 \frac{dx}{x^2}$ divergent.

(ii) L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ converge.

(iii) L'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-x} dx$ converge et $\int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1$.

(iv) L'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$ converge et $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1$.

Démonstration. (i), (ii) et (iii) se retrouvent par un simple calcul de primitive. (iv) est admis.

3.2 Cas des fonctions positives

Théorème 38 (*Critère de comparaison de fonctions positives*)

Soient f et g deux fonctions continues et **positives** sur $]a, b[$, telles que $0 \leq f \leq g$ sur $]a, b[$.

(i) Si $\int_a^b g$ converge, alors $\int_a^b f$ converge (et $\int_a^b f \leq \int_a^b g$).

(ii) Si $\int_a^b f$ diverge, alors $\int_a^b g$ diverge.

Démonstration.

Exemple 39

|| Nature de l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+t)}{t} dt$.

Exemple 40

|| Nature de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{1+t} dt$.

Théorème 41 (Critère d'équivalence)

(i) Soient f et g deux fonctions continues et **positives** sur $[a, b[$.

Si $f(x) \underset{x \rightarrow b^-}{\sim} g(x)$, alors les intégrales $\int_a^b f$ et $\int_a^b g$ sont de même nature.

(ii) Soient f et g deux fonctions continues et **positives** sur $]a, b]$.

Si $f(x) \underset{x \rightarrow a^+}{\sim} g(x)$, alors les intégrales $\int_a^b f$ et $\int_a^b g$ sont de même nature.

Démonstration.

Exemple 42

|| Déterminer la nature de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{t-1}{t+1} e^{-t} dt$.

Exemple 43

|| Déterminer la nature de l'intégrale $\int_0^1 \frac{\sin t}{t^2}$.

3.3 Intégrales absolument convergentes**Définition 44**

On dit qu'une intégrale généralisée $\int_I f$ **converge absolument** si $\int_I |f|$ converge.

Théorème 45 (La convergence absolue implique la convergence simple)

Soit f une fonction continue sur un intervalle I . Si $\int_I |f|$ converge, alors $\int_I f$ converge.

Démonstration.

Exemple 46

|| Nature de l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt$.

4 Calcul d'intégrales généralisées

4.1 Intégration par parties

Théorème 47 (Intégration par parties)

Soient u et v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle I d'extrémités a et b .

Si le produit uv converge en a et b , alors les intégrales $\int_a^b u'(t)v(t) dt$ et $\int_a^b u(t)v'(t) dt$ sont de même nature.

De plus, en cas de convergence, on a :

$$\int_a^b u'(t)v(t) dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t) dt.$$

Démonstration admise.

Exemple 48

|| Nature de l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$.

4.2 Intégration par changement de variable

Théorème 49 (Changement de variable)

Soit φ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ et strictement monotone sur $]a, b[$. On note $\alpha = \lim_{t \rightarrow a^+} \varphi(t)$ et $\beta = \lim_{t \rightarrow b^-} \varphi(t)$.

Soit f une fonction continue sur l'intervalle d'extrémités α et β . Alors les intégrales

$$\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t) dt \quad \text{et} \quad \int_\alpha^\beta f(x) dx.$$

sont de même nature. En cas de convergence, ces deux intégrales sont égales.

Démonstration admise.

Exemple 50

|| Nature et calcul de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} dt$.

4.3 Utilisation de la parité**Proposition 51**

Soient $a \in \mathbb{R}_+^* \cup \{+\infty\}$ et f une fonction continue sur $I =]-a, a[$.

(i) Si f est paire, les intégrales $\int_{-a}^a f$ et $\int_0^a f$ sont de même nature.

En cas de convergence, on a $\int_{-a}^a f(t) dt = 2 \int_0^a f(t) dt$.

(ii) Si f est impaire, les intégrales $\int_{-a}^a f$ et $\int_0^a f$ sont de même nature. En cas de convergence, on a $\int_{-a}^a f(t) dt = 0$.

Démonstration (idée) : il suffit de réaliser le changement de variable $x = -t$.

Exemple 52

|| Nature et calcul de l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin(t)e^{-|t|} dt$.

5 Intégration de fonctions continues par morceaux

Définition 53

Soit f une fonction continue par morceaux sur un intervalle $I =]a, b[$. Il existe alors $a = a_0 < \dots < a_n = b$ telle que f est continue sur chaque intervalle $I_k =]a_k, a_{k+1}[$ (on dit que une **subdivision** de I).

Si l'intégrale $\int_{I_k} f$ converge pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, on dit que l'intégrale $\int_I f$ **converge** et on note :

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(x) dx.$$

Exemple 54

Nature et calcul de $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt$ où $f : x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq -1 \\ 1 & \text{si } -1 < x < 0 \\ e^{-x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$