

## Exercice 1

On considère une base de données d'une école dont le schéma relationnel est donné par :

- **étudiant** (num, nom, prenom, dateNaissance, adresse, statut)
- **cours** (numUE, intitulé, professeur, ECTS)
- **inscription** (numEtudiant, numUE, semestre, noteFinale)

1. Écrire en **MySQL** une requête déterminant le nom, prénom et numéro étudiant de tous les étudiants inscrits au semestre 4. *Attention, un étudiant suit généralement plusieurs cours dans un même semestre.*
2. Écrire en **MySQL** une requête déterminant, pour chaque cours (nom et intitulé), le nombre d'étudiants qui le suit.

## Exercice 2

On joue avec une pièce truquée, pour laquelle la probabilité d'obtenir pile est  $p \in ]0, 1[$ , de la façon suivante :

- On lance la pièce jusqu'à obtenir pile pour la première fois. On note  $N$  la variable aléatoire égale au nombre de lancers nécessaires.
- Si  $n$  lancers ont été nécessaires pour obtenir pour la première fois pile, alors on relance  $n$  fois la pièce. On note alors  $X$  le nombre de pile obtenu au cours de ces  $n$  lancers.

On admet que :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall x \in ]-1, 1[, \sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} x^n = \frac{x^k}{(1-x)^{k+1}}.$$

On note  $q = 1 - p$ .

1. Écrire une fonction en Python qui prend en argument un flottant  $p \in ]0, 1[$  et qui simule la variable aléatoire  $X$ .
2. Pour tout  $n \geq 1$ , déterminer la loi conditionnelle de  $X$  sachant  $[N = n]$ .
3. En déduire la loi de  $X$  (on distinguera le calcul de  $\mathbb{P}(X = 0)$ ).
4. Soit  $p' \in ]0, 1[$ . On note  $q' = 1 - p'$ . On considère  $B$  et  $G$  deux variables aléatoires indépendantes suivant respectivement la loi de Bernoulli de paramètre  $p'$  et la loi géométrique de paramètre  $p'$ .
  - a. Déterminer la loi de la variable aléatoire  $BG$ .
  - b. Montrer qu'on peut choisir  $p'$  de manière à ce que les variables aléatoires  $X$  et  $BG$  suivent la même loi.
  - c. En déduire que  $X$  admet une espérance à déterminer.

## Exercice 3

Un sac contient  $n$  jetons numérotés de 1 à  $n$ . On tire successivement et sans remise deux jetons de ce sac et on note  $X$  le premier numéro tiré,  $Y$  le second.

1. Déterminer la loi de  $X$  puis montrer que  $Y$  suit la loi uniforme sur  $\llbracket 1, n \rrbracket$ .
2. Les variables aléatoires  $X$  et  $Y$  sont-elles indépendantes ?
3. Montrer que  $\text{Cov}(X, Y) = -\frac{n+1}{12}$ .

\* \*  
\*