Partie I : définition et propriétés de la fonction A

1. La fonction sinus est continue et strictement croissante sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

Elle réalise donc une bijection entre $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ et $\sin\left([-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]\right) = [-1, 1]$.

2. Puisque $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \in [-1, 1]$ et $\frac{\pi}{6} \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, on en déduit que :

$$A\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6}.$$

Puisque $\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \in [-1, 1]$ et $-\frac{\pi}{4} \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, on en déduit que :

$$A\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{\pi}{4}.$$

3. La représentation graphique de A se déduit de celle de la restriction de fonction sinus à l'intervalle $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ par symétrie par rapport à la première bissectrice (i.e. la droite d'équation $y = x$) :

Figure 1 – Représentation graphique de la fonction A

On notera les tangentes verticales en -1 et 1, ainsi que la tangente de pente 1 en 0.

4. Soit $x \in [-1, 1]$. On a $\cos^2(A(x)) + \sin^2(A(x)) = 1$. Or $\sin(A(x)) = x$ donc :

$$\cos^2(A(x)) = 1 - x^2.$$

Puisque $A(x) \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $\cos(A(x)) \geq 0$ et ainsi :

$$\forall x \in [-1, 1], \cos(A(x)) = \sqrt{1 - x^2}.$$

5. La fonction sinus réalise une bijection continue sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ et $[-1, 1]$. De plus sa dérivée, la fonction cosinus, ne s'annule pas sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Puisque que $\sin\left(]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\right) =]-1, 1[$, La fonction A est dérivable sur $]-1, 1[$ et on a :

$$\forall x \in]-1, 1[, A'(x) = \frac{1}{\sin'(A(x))} = \frac{1}{\cos(A(x))} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

6. a.
$$\frac{1}{\sqrt{1+t}} = (1+t)^{-\frac{1}{2}} \underset{t \rightarrow 0}{=} 1 - \frac{1}{2}t + o(t).$$

b. D'après la question précédente, puisque $\lim_{x \rightarrow 0} -x^2 = 0$, on a :

$$A'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

En intégrant ce développement limité, on obtient :

$$A(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} A(0) + x + \frac{x^3}{6} + o(x^3).$$

Or $\sin(0) = 0$, donc $A(0) = 0$. Ainsi :

$$A(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + \frac{x^3}{6} + o(x^3).$$

Partie II : étude d'une variable aléatoire

1. Puisque $\Theta(\Omega) = [0, \frac{\pi}{2}]$, $X(\Omega) = [0, 1]$. Soit $x \in \mathbb{R}$.

- Si $x < 0$, $F_X(x) = 0$.
- Si $x > 1$, $F_X(x) = 1$.

- Si $0 \leq x \leq 1$, on a :

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(X \leq x) \\ &= P(\sin \Theta \leq x) \\ &= P(\Theta \leq A(x)) \text{ car } A \text{ réalise une bijection croissante sur } [-1, 1] \\ &= \frac{2A(x)}{\pi} \text{ car } \Theta \hookrightarrow \mathcal{U}\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right) \text{ et } A(x) \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]. \end{aligned}$$

La fonction de répartition de X est donc la fonction :

$$F_X : x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{2A(x)}{\pi} & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

2. La fonction F_X est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, 1[$ (par opérations sur les fonctions $\mathcal{C}^1$) ainsi que sur les intervalles $] -\infty, 0[$ et $]1, \infty[$.

Puisque $A(1) = \frac{\pi}{2}$, on a :

$$\lim_{1^+} F_X = 1, \lim_{0^-} F_X = \frac{2A(1)}{\pi} = 1 \text{ et } F_X(1) = 1.$$

De plus :

$$\lim_{0^-} F_X = 0, \lim_{0^+} F_X = \frac{2A(0)}{\pi} = 0 \text{ et } F_X(0) = 0.$$

La fonction de répartition de X est donc continue en 0 et 1. D'après ce qui précède, elle est donc continue sur $\mathbb{R}$ et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$. La variable aléatoire X est donc à densité. De plus, une densité de X est donnée par :

$$F_X : x \mapsto \begin{cases} \frac{2A'(x)}{\pi} & \text{si } x \in]0, 1[\\ 0 & \text{sinon} \end{cases} = \begin{cases} \frac{2}{\pi\sqrt{1-x^2}} & \text{si } x \in]0, 1[\\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

3. La fonction $\left(x \mapsto \frac{2x}{\pi\sqrt{1-x^2}}\right)$ est continue sur $]0, 1[$ Soit $A \in [0, 1[$.

$$\int_0^A \left| \frac{2x}{\pi\sqrt{1-x^2}} \right| dx = \int_0^A \frac{2x}{\pi\sqrt{1-x^2}} dx = \left[\frac{-2}{\pi} \sqrt{1-x^2} \right]_0^A \xrightarrow{A \rightarrow 1^-} \frac{2}{\pi}.$$

On en déduit que l'intégrale $\int_0^A \frac{2x}{\pi\sqrt{1-x^2}} dx$ converge absolument et vaut $\frac{2}{\pi}$. Puisque

F_X est nulle en dehors de $]0, 1[$, il vient que l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} xF_X(x) dx$ converge absolument. Ainsi X admet une espérance et :

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xF_X(x) dx = \frac{2}{\pi}.$$

4. La fonction $\sin$ est une fonction $\mathcal{C}^1$ et strictement croissante sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. En posant $x = \sin t$, on a $dx = \cos t dt$. Puisque $\sin\left(\left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right) = [0, 1[$, les intégrales

$$I = \int_0^1 \frac{2x^2}{\pi\sqrt{1-x^2}} dx \quad \text{et} \quad J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2\sin^2 t}{\pi\sqrt{1-\sin^2 t}} \cos t dt.$$

sont de même nature (et égales en cas de convergence) par changement de variables. Or, pour tout $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\cos t \geq 0$ donc $\cos t = \sqrt{1-\sin^2 t}$ et :

$$\frac{2\sin^2 t}{\pi\sqrt{1-\sin^2 t}} \cos t dt = \frac{2}{\pi} \sin^2 t dt.$$

Puisque la fonction $\sin^2$ est continue sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, l'intégrale J est faussement impropre, donc convergente. L'intégrale I converge donc (absolument), i.e. X^2 admet une espérance. Calculons sa valeur.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{\pi} \sin^2 t dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 - \cos(2t) dt = \frac{1}{\pi} \left[t - \frac{1}{2} \sin(2t) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2}.$$

Ainsi, on trouve $E(X^2) = \frac{1}{2}$.

5. a. Par linéarité de l'espérance, M_n admet une espérance car $X_1, \dots, X_n$ en admettent une et on a :

$$E(M_n) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k) = E(X) = \frac{2}{\pi}.$$

Puisque les variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes et admettent une variance, $X_1 + \dots + X_n$ admet une variance. Ainsi M_n admet une variance et :

$$\begin{aligned} V(M_n) &= \frac{1}{n^2} V(X_1 + \dots + X_n) \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n V(X_k) \\ &= \frac{1}{n} (E(X^2) - E(X)^2) \text{ d'après la formule de König-Huygens} \\ &= \frac{1}{n} \left(\frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \right). \end{aligned}$$

b. Si U admet un moment d'ordre 2, alors, pour tout $a > 0$, on a :

$$P(|U - E(U)| \geq a) \leq \frac{V(U)}{a^2}.$$

c. Puisque M_n admet une variance, en posant $a = \sqrt{\frac{100V(M_n)}{5}}$ on obtient l'inégalité :

$$P(|M_n - E(M_n)| \geq a) \leq \frac{V(M_n)}{a^2} = \frac{5}{100}.$$

Ainsi, par passage au complémentaire :

$$P(E(M_n) - a < M_n < E(M_n) + a) \geq \frac{95}{100}.$$

En posant alors $a_n = E(X) - \frac{a}{n}V(X)$ et $b_n = E(X) + \frac{a}{n}V(X)$ on obtient l'inégalité recherchée $P(M_n \in [a_n, b_n]) \geq 95\%$.

6. a. Pour tout $n \geq 1$, $\frac{1}{n} \in [0, 1]$ donc :

$$P\left(X \leq \frac{1}{n}\right) = \frac{2}{\pi} A\left(\frac{1}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2}{\pi n} + \frac{1}{3\pi n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

Il vient alors que $P\left(X \leq \frac{1}{n}\right) - \frac{2}{\pi n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{3\pi n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)$, c'est-à-dire :

$$P\left(X \leq \frac{1}{n}\right) - \frac{2}{\pi n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{3\pi n^3}.$$

Les constantes a et b recherchées sont $a = \frac{2}{\pi}$ et $b = \frac{1}{3\pi}$.

b. (i) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $p_n = 1 - F_X\left(1 - \frac{1}{n}\right)$. Par continuité de F_X en 1, on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 1 - F_X(1) = 0$$

(ii) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}(1 - p_n)\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}P\left(X \leq 1 - \frac{1}{n}\right)\right) = \sin\left(A\left(1 - \frac{1}{n}\right)\right) = 1 - \frac{1}{n}.$$

(iii) $\cos(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2).$

(iv) Pour tout n non nul, on a :

$$1 - \frac{1}{n} = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}p_n\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}p_n\right).$$

ou encore :

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}p_n\right) - 1 = -\frac{1}{n}.$$

D'après la question précédente, $\cos x - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{x^2}{2}$. Ainsi, puisque la suite $(p_n)_{n \geq 1}$

converge vers 0, $-\frac{\pi^2 p_n^2}{8} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \cos\left(\frac{\pi}{2}p_n\right) - 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{n}$, soit $p_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2\sqrt{2}}{\pi\sqrt{n}}$.

La constante c recherchée est $c = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}$.

Partie III : étude d'une suite de fonctions définies à l'aide de la fonction arcsinus

1. Il vient immédiatement que $f_0 : x \mapsto 1$ et ainsi $P_0 = 1$.

$$\forall x \in [-1, 1], f_1(x) = \cos(2A(x)) = 1 - 2\sin^2(A(x)) = 1 - 2x^2.$$

Ainsi $f_1 : x \mapsto 1 - 2x^2$ et $P_1 = 1 - 2X^2$.

$$\forall x \in [-1, 1], f_2(x) = \cos(2 \times 2A(x)) = 2\cos^2(2A(x)) - 1 = 2(1 - 2x^2)^2 - 1.$$

Ainsi $f_2 : x \mapsto 2(1 - 2x^2)^2 - 1$ et $P_2 = 2(1 - 2X^2)^2 - 1$.

2. a. On trouve via les formules de sommation : $\cos(a + b) + \cos(a - b) = 2 \cos a \cos b$.

b. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [-1, 1]$.

$$\begin{aligned} f_{n+2}(x) + f_n(x) &= \cos(2(n+2)A(x)) + \cos(2nA(x)) \\ &= \cos(2(n+1)A(x) + 2A(x)) + \cos(2(n+1)A(x) - 2A(x)) \\ &= 2 \cos(2(n+1)A(x)) \cos(2A(x)) \text{ d'après la question précédente} \\ &= 2(1 - 2x^2)f_{n+1}(x). \end{aligned}$$

On en déduit que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in [-1, 1], f_{n+2}(x) + f_n(x) = 2(1 - 2x^2)f_{n+1}(x).$$

3. Montrons le résultat par récurrence double¹.

Le résultat est trivial pour $n = 0$ et $n = 1$: $P_0 = 1$ et $P_1 = 1 - 2X^2$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons qu'il existe un polynôme P_n de degré $2n$ et un polynômes P_{n+1} de degré $2(n+1)$ tels que :

$$\forall x \in [-1, 1], f_n(x) = P_n(x) \text{ et } f_{n+1}(x) = P_{n+1}(x).$$

D'après la question précédente,

$$\forall x \in [-1, 1], f_{n+2}(x) = 2(1 - 2x^2)f_{n+1}(x) - f_n(x) = 2(1 - 2x^2)P_{n+1}(x) - P_n(x).$$

Le polynôme $P_{n+2} = 2(1 - 2X^2)P_{n+1} - P_n$ est bien de degré $2(n+2)$ et vérifie :

$$\forall x \in [-1, 1], f_{n+2}(x) = P_{n+2}(x) \text{ et } f_{n+1}(x) = P_{n+1}(x),$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$ il existe un polynôme P_n de degré $2n$ tel que :

$$\forall x \in [-1, 1], f_n(x) = P_n(x).$$

4. a. La fonction A est dérivable sur $] - 1, 1[$ et la fonction $\cos$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ donc f_n est dérivable sur $] - 1, 1[$ par composition et :

$$\forall x \in] - 1, 1[, f'_n(x) = -\frac{2n \sin(2nA(x))}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

La fonction A est dérivable sur $] - 1, 1[$, la fonction $\sin$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et la fonction

$\left(x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}\right)$ donc f'_n est dérivable sur $] - 1, 1[$ par composition et :

$$\forall x \in] - 1, 1[, f''_n(x) = -\frac{4n^2 \cos(2nA(x))}{1 - x^2} - \frac{2nx \sin(2nA(x))}{(1 - x^2)\sqrt{1 - x^2}}.$$

b. Pour tout $x \in] - 1, 1[$, on a :

$$\begin{aligned} (x^2 - 1)f''_n(x) + xf'_n(x) - 4n^2 f_n(x) \\ = 4n^2 \cos(2nA(x)) + \frac{2nx \sin(2nA(x))}{\sqrt{1 - x^2}} - \frac{2nx \sin(2nA(x))}{\sqrt{1 - x^2}} - 4n^2 \cos(2A(x)) = 0. \end{aligned}$$

On en déduit que f_n est solution sur $] - 1, 1[$ de l'équation différentielle :

$$(x^2 - 1)y'' + xy' - 4n^2y = 0.$$

Partie IV : étude d'un endomorphisme lié à la suite de polynômes $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$

1. Soit $P \in \mathbb{R}_{2n+1}[X]$.

Puisque $\deg P' \leq 2n$ et $\deg P'' \leq 2n - 1$, alors $(X^2 - 1)P'' \in \mathbb{R}_{2n+1}[X]$, $XP' \in \mathbb{R}_{2n+1}[X]$. Ainsi :

$$\forall P \in \mathbb{R}_{2n+1}[X], (X^2 - 1)P'' + XP' \in \mathbb{R}_{2n+1}[X].$$

2. a. Puisque $\Phi(1) = 0$, $\Phi(X) = X$, $\Phi(X^2) = 4X^2 - 2$, et $\Phi(X^3) = 9X^3 - 6X$, on a :

$$M = \text{Mat}_{(1, X, X^2, X^3)}(\Phi) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

b. La matrice M étant triangulaire (supérieure), on lit son spectre sur la diagonale ; M admet quatre valeurs propres distinctes : 0, 1, 4 et 9.

Puisque $M \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$, la matrice M est diagonalisable.

Il vient immédiatement que tous les espaces propres sont de dimension 1 et :

$$E_0(M) = \text{Ker } M = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \text{ et } E_1(M) = \text{Ker}(M - I_3) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right).$$

¹On montre le résultat pour tout $n \in \mathbb{N}$ au lieu de $n \in \mathbb{N}^*$ comme demandé dans l'énoncé, car on remarque que le résultat est encore vrai pour $n = 0$.

Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})$.

$X \in E_4(M) \Leftrightarrow X \in \text{Ker}(M - 4I_3)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -4x - 2z = 0 \\ -3y - 6t = 0 \\ 5t = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} z = -2x \\ y = t = 0 \end{cases} .$$

$X \in E_9(M) \Leftrightarrow X \in \text{Ker}(M - 9I_3)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -9x - 2z = 0 \\ -8y - 6t = 0 \\ -5z = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 6t = -8y \\ x = z = 0 \end{cases} .$$

On en déduit que :

$$E_4(M) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \text{ et } E_9(M) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 0 \\ -8 \end{pmatrix} \right) .$$

3. On a déjà calculé $\Phi(1)$, $\Phi(X)$ et $\Phi(X^2)$. Soit $k \in \llbracket 3, 2n + 1 \rrbracket$.

$$\Phi(X^k) = k(k - 1)(X^2 - 1)X^{k-2} + kX^k = k^2X^k - k(k - 1)X^{k-2} .$$

On en déduit alors la matrice de Φ dans la base canonique $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}_{2n+1}[X]$:

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\Phi) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 & \dots & 0 \\ & 1 & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & 4 & \ddots & \ddots & 0 \\ (0) & & & \ddots & \ddots & -2n(2n + 1) \\ & & & & \ddots & 0 \\ & & & & & (2n + 1)^2 \end{pmatrix} .$$

4. La matrice A étant triangulaire supérieure, on peut lire son spectre sur la diagonale :

$$\text{Sp}(\Phi) = \text{Sp}(A) = \{k^2, k \in \llbracket 0, 2n + 1 \rrbracket\} .$$

La fonction carré étant strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, l'endomorphisme Φ admet $2n + 2$ valeurs propres distinctes. Puisque c'est un endomorphisme de $\mathbb{R}_{2n+1}[X]$ qui est de dimension $2n + 2$, l'endomorphisme Φ est diagonalisable.

5. Soit $k \in \llbracket 0, 2n + 1 \rrbracket$.

D'après la partie III, P_k est solution de l'équation différentielle $(x^2 - 1)y'' + xy' - 4k^2y = 0$ sur $] - 1, 1[$. Ainsi le polynôme $(X^2 - 1)P_k'' + XP_k' - 4k^2P_k$ admet une infinité de racines (car $] - 1, 1[$ est infini). C'est donc le polynôme nul.

On en déduit alors que $\Phi(P_k) = 4k^2P_k = (2k)^2P_k$. Il vient alors que $P_k \in E_{(2k)^2}$.

Remarquons que ϕ admet $2n + 2$ valeurs propres distinctes implique que la dimension de chaque espace propre est égale à 1. Puisque $\deg P_k = k$, $P_k \neq 0$ et ainsi :

$$E_{(2k)^2} = \text{Vect}(P_k) .$$

* *
*