Exercice 0

1) Soit $p \in [0, 1]$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} - p(1-p) &= \frac{1}{4} - p + p^2 \\ &= \left(p - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

donc pour tout $p \in [0, 1]$, $p(1-p) \leq \frac{1}{4}$

2) $f : x \mapsto \cos^{n+1}(x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, ($f = u^{n+1}$ avec u dérivable sur $\mathbb{R}$ donc $f' = (n+1)u^n u'$)

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = -(n+1)\sin(x)\cos^n(x)}$$

Exercice 1

1) La fonction f est dérivable sur $[1; +\infty[$, ($f = \frac{u}{v}$ avec u et v dérivables, $f' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$)Pour $x \in [1; +\infty[$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(\ln(x) + 1)(x + 1) - x \ln(x)}{(x + 1)^2} \\ &= \frac{\ln(x) + x + 1}{(x + 1)^2} \\ &> 0 \quad (\text{car } x \geq 1) \end{aligned}$$

En remarquant que $f(x) = \frac{x}{x+1} \times \ln(x)$, on obtient $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

et ainsi :

x	1	$+\infty$
f	0	$+\infty$

2) (*J'ai cherché la rédaction qui évitera les erreurs.*)Soit $n \in \mathbb{N}^*$, f est continue et strictement croissante sur l'intervalle $[1, +\infty[$ donc (*Théorème de la bijection*)

$$\textcircled{1} f([1, +\infty[) = \left[f(1), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[= [0; +\infty[$$

$$\textcircled{2} f \text{ est bijective de } [1, +\infty[\text{ dans } [0; +\infty[$$
or $n \in [0; +\infty[$ donc (*définition d'une bijection*),il existe un unique $\alpha \in [1, +\infty[$ tel que $f(\alpha) = n$ Autrement dit : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $f(x) = n$ admet une unique solution sur $[1, +\infty[$ 3) D'une part $e^n \in [1; +\infty[$ et $f(e^n) = \frac{ne^n}{e^n + 1} = n \times \frac{e^n}{e^n + 1}$ donc $f(e^n) < n$.D'autre part par définition de α_n , $\alpha_n \in [1; +\infty[$ et $f(\alpha_n) = n$.on a $f(e^n) < f(\alpha_n)$ et comme de plus f est strictement croissante sur $[1; +\infty[$ on en déduit bien

$$\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}^*, \quad \alpha_n > e^n}$$

on en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leq \frac{n}{\alpha_n} \leq \frac{n}{e^n}$

or (croissances comparées) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{e^n} = 0$ donc (théorème des gendarmes) :

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\alpha_n} = 0}$$

4) Raisonnons par équivalence pour un $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \frac{\alpha_n}{e^n} = e^{\frac{n}{\alpha_n}} &\iff \ln(\alpha_n) - n = \frac{n}{\alpha_n} \\ &\iff \alpha_n \ln(\alpha_n) - n\alpha_n = n \\ &\iff \frac{\alpha_n \ln(\alpha_n)}{1 + \alpha_n} = n \\ &\iff f(\alpha_n) = n \end{aligned}$$

or on sait que $f(\alpha_n) = n$ donc

$$\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}^*, \frac{\alpha_n}{e^n} = e^{\frac{n}{\alpha_n}}}$$

5) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\alpha_n} = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\alpha_n}{e^n} = e^{\frac{n}{\alpha_n}}$ donc $\frac{\alpha_n}{e^n} = 1$. Autrement dit $\boxed{\alpha_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} e^n}$

Exercice 2

1) a) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_{n+1} - S_n = \frac{1}{n+1} > 0$ donc $\boxed{(S_n) \text{ est strictement croissante.}}$

b) i. Soit $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} D_{n+1} - D_n &= S_{2n+2} - S_{n+1} - S_{2n} + S_n \\ &= S_{2n+2} - S_{2n} - (S_{n+1} - S_n) \\ &= \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} \\ &= \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} \\ &= \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} > 0 \end{aligned}$$

donc $\boxed{(D_n) \text{ est croissante}}$

ii. (D_n) est croissante et $D_1 = 1 + \frac{1}{2} - 1 = \frac{1}{2} > 0$ donc $\boxed{(D_n) \text{ ne converge pas vers } 0}$

En effet, sachant que pour tout n , $D_n \geq D_1$, si (D_n) convergerait vers 0, alors on aurait : $0 \geq \frac{1}{2}$

c) Si (S_n) convergerait alors la suite $(D_n) = (S_{2n} - S_n)$ convergerait vers 0, or on vient de voir que (D_n) ne converge pas vers 0 donc (S_n) ne converge pas, or (S_n) est croissante donc $\boxed{(S_n) \text{ diverge vers } +\infty}$

2) a) (S_n) diverge vers $+\infty$ donc $\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N, S_n \geq A$

En particulier $\boxed{\text{il existe un entier } n \text{ pour lequel } S_n \geq 10}$

```
b)  n = 1
    s = 1
    while s < 10:
        n += 1
        u += 1/n
    print(n)
```

3) a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned}
 A_{2n} &= \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \\
 &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k-1} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k} \\
 &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k-1} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k} \\
 &= \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \\
 &= S_{2n} - S_n
 \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{Pour tout } n \in \mathbb{N}^*, A_{2n} = D_n}$$

b) pour tout entier naturel n ,

$$\begin{aligned}
 D_n &= S_{2n} - S_n \\
 &= \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \\
 &= \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \\
 &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}
 \end{aligned}$$

$$\boxed{D_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}}$$

$$\begin{aligned}
 D_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \quad \text{avec } f : x \mapsto \frac{1}{x+1} \\
 &\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \int_0^1 f(t) dt
 \end{aligned}$$

or $\int_0^1 \frac{1}{t+1} dt = \ln(2)$ donc

$$\boxed{(D_n) \text{ converge vers } \ln(2)}$$

c) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $A_{2n} = D_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} D_n = \ln(2)$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_{2n} = \ln(2)$

de plus pour $n \in \mathbb{N}$, $A_{2n+1} = A_{2n} + \frac{1}{2n+1}$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_{2n+1} = \ln(2)$

ce qui permet d'affirmer que (*théorème des suites extraites*) :

$$\boxed{(A_n) \text{ converge vers } \ln(2)}$$

4) a)

$$\begin{aligned}
 B_6 &= \sum_{k=1}^6 u_{\sigma(k)} \\
 &= u_1 + u_2 + u_4 + u_3 + u_6 + u_8 \\
 &= 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8}
 \end{aligned}$$

$$B_6 = \frac{7}{24}$$

b)

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{4k-2} - \frac{1}{4k} &= \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2} \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{4k} \\
 &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{4k}
 \end{aligned}$$

$$\text{Pour tout } k \in \mathbb{N}^*, \quad \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{4k-2} - \frac{1}{4k} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k} \right)$$

c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{3n} u_{\sigma(k)} &= \sum_{k=1}^n (u_{\sigma(3k-2)} + u_{\sigma(3k-1)} + u_{\sigma(3k)}) \\
 &= \sum_{k=1}^n (u_{2k-1} + u_{4k-2} + u_{4k}) \\
 &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{4k-2} - \frac{1}{4k} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k} \right) \quad (\text{question 3) c.}) \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k}
 \end{aligned}$$

$$\sum_{k=1}^{3n} u_{\sigma(k)} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{2n} u_k$$

d) Sachant que la série (A_n) converge vers $\ln(2)$, la relation précédente permet d'affirmer que (B_{3n}) converge vers $\frac{\ln(2)}{2}$. on a, de plus, les relations :

$$B_{3n+1} = B_{3n} + \frac{1}{2n+1} \quad B_{3n+2} = B_{3n+1} - \frac{1}{4n+2}$$

qui montrent que (B_{3n+1}) et (B_{3n+2}) convergent aussi vers $\frac{\ln(2)}{2}$.

En conclusion :

$$\text{La suite } (B_n) \text{ converge vers } \frac{\ln(2)}{2}$$

5) En étudiant (A_n) on somme les éléments de U dans un certain ordre et on trouve une limite égale à $\ln(2)$.

En étudiant (B_n) on somme les éléments de U dans un certain ordre et on trouve une limite égale à $\frac{\ln(2)}{2}$.

On trouve deux résultats différents, il semble difficile de parler de la somme des éléments de U .

Pour aller plus loin (*mais pas si loin du programme de BCPST*) : "Théorème de réarrangement de Riemann"

Exercice 3

Partie 1.

- 1) • On note g la fonction $x \mapsto x - \ln(1+x)$,

g est dérivable sur $[0; +\infty[$ et $\forall x \in [0; +\infty[$, $g'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x} \geq 0$

donc g est croissante ce qui avec $g(0) = 0$ permet d'affirmer que $\forall x \in [0; +\infty[$, $g(x) \geq 0$.

ce qui entraîne bien : $\boxed{\forall x \geq 0, \ln(1+x) \leq x}$

- On note ici $g : x \mapsto \ln(1+x) + \frac{x^2}{2} - x$,

g est dérivable sur $[0; +\infty[$ et $\forall x \in [0; +\infty[$, $g'(x) = \frac{x^2}{1+x} \geq 0$, g est croissante sur $[0; +\infty[$ et comme

$g(0) = 0$, on obtient l'inégalité : $\forall x \in \mathbb{R}_+$, $x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x)$

$$\boxed{\forall x \in [0; +\infty[, \quad x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x}$$

- 2) Pour tracer la parabole $y = x - \frac{x^2}{2}$ on remarque que $x - \frac{x^2}{2} = \frac{1}{2}x(2-x)$

Partie 2.

- 1) $u_1 = \frac{3}{2}$, $u_2 = u_1 \times \left(1 + \frac{1}{4}\right)$ et $u_3 = u_2 \times \left(1 + \frac{1}{8}\right)$ donc $\frac{u_2}{u_1} \neq \frac{u_3}{u_2}$

(u_n) n'est pas géométrique.

- 2) Pour $n \in \mathbb{N}$, on note : P_n la propriété : " $u_n > 0$ et $\ln(u_n) = \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{2^k}\right)$ "

- Pour $n = 1$,

d'une part : $u_1 = \frac{3}{2} > 0$ et $\ln(u_1) = \ln\left(\frac{3}{2}\right)$, d'autre part : $\sum_{k=1}^1 \ln\left(1 + \frac{1}{2^{k+1}}\right) = \ln\left(\frac{3}{2}\right)$

donc P_1 est vraie

- Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que P_n est vraie,

$u_n > 0$ et $u_{n+1} = u_n \times \left(1 + \frac{1}{2^{n+1}}\right)$ donc $u_{n+1} > 0$ et

$$\begin{aligned} \ln(u_{n+1}) &= \ln(u_n) + \ln\left(1 + \frac{1}{2^{n+1}}\right) \\ &= \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{2^{k+1}}\right) + \ln\left(1 + \frac{1}{2^{n+1}}\right) \quad \text{avec l'hypothèse de récurrence} \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} \ln\left(1 + \frac{1}{2^{k+1}}\right) \quad \text{On a ainsi montré } P_{n+1} \end{aligned}$$

En conclusion :

$$\text{pour tout entier naturel } n \geq 1, \quad \ln(u_n) = \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{2^k}\right)$$

3) Soit $k \in \mathbb{N}^*$,

$$\text{on sait que : } \forall x \in \mathbb{R}_+, \quad x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x$$

or $\frac{1}{2^k} \geq 0$ donc,

$$\frac{1}{2^k} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{4^k} \leq \ln\left(1 + \frac{1}{2^k}\right) \leq \frac{1}{2^k}$$

en sommant pour k entre 1 et un entier naturel n , on obtient :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{4^k} \leq \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{2^k}\right) \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k}$$

$$\text{pour tout entier naturel } n \geq 1, \quad S_n - \frac{1}{2} T_n \leq \ln(u_n) \leq S_n$$

4) a) On reconnaît des sommes de premiers termes de suites géométriques,

$$S_n = \frac{1}{2} \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} \quad T_n = \frac{1}{4} \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n}{1 - \frac{1}{4}}$$

donc

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad S_n = 1 - \frac{1}{2^n} \quad \text{et} \quad T_n = \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{4^n}\right)$$

b) On sait que $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$, lorsque $q \in]-1; 1[$ donc les deux relations précédentes donnent :

$$(S_n) \text{ converge vers } 1 \quad \text{et} \quad (T_n) \text{ vers } \frac{1}{3}$$

5) a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\ln(u_{n+1}) - \ln(u_n) = \ln\left(1 + \frac{1}{2^{n+1}}\right) > 0$ (d'après 3)) donc

$$(\ln(u_n)) \text{ est une suite croissante}$$

b) Sachant que $(\ln(u_n))$ est croissante et que la fonction exponentielle est croissante on peut affirmer que :

(u_n) est une suite croissante

De plus d'après les questions 4) et 5) , on a pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\ln(u_n) \leq 1 - \frac{1}{2^n} \leq 1$

(u_n) est majorée (par e)

On a montré que (u_n) est une suite croissante et majorée donc :

$$(u_n) \text{ est convergente.}$$

c) On a : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\exp\left(S_n - \frac{T_n}{2}\right) \leq u_n \leq \exp(S_n)$

de plus (continuité de la fonction exponentielle),

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \exp\left(S_n - \frac{T_n}{2}\right) = \exp\left(\frac{5}{6}\right) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \exp(S_n) = \exp(1)$$

donc (passage à la limite sur des inégalités larges) :

$$e^{\frac{5}{6}} \leq \ell \leq e$$