Correction de la Feuille-Activité 1 : Suites et sommes.

Ex 1:
$$S_1 = 2\sum_{k=0}^{n} \left(\frac{1}{3}\right)^k = 2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}}$$
 donc $S_1 = 3 - \frac{1}{3^n}$

$$S_2 = n \times \frac{(3+2n+1)}{2}$$
 ou $S_2 = 2 \times \frac{n(n+1)}{2} + n$ donc $S_2 = n(n+2)$

$$S_3 = 4\left(\sum_{i=1}^n i - 1 - 2\right)$$
 ou $S_3 = (n-2)\frac{12+4n}{2}$ donc $S_3 = 2(n-2)(n+3)$

$$S_4 = \sum_{i=1}^{n} (-2)^i = (-2)\frac{1 - (-2)^n}{1 - (-2)}$$
 donc $S_4 = \frac{2}{3}((-2)^n - 1)$

Ex 2: On a: $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = -\frac{1}{4}u_n + \frac{1}{2}$ (suite arithmetico-géométrique)

1) Le point fixe est :
$$\ell = \frac{2}{5}$$
 en effet : $\ell = -\frac{1}{4}\ell + \frac{1}{2} \iff \frac{5}{4}\ell = \frac{1}{2}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $\ell = -\frac{1}{4}\ell + \frac{1}{2}$ et $u_{n+1} = -\frac{1}{4}u_n + \frac{1}{2}$ donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} - \ell = -\frac{1}{4} (u_n - \ell)$$

la suite $(u_n - \ell)$ est donc géométrique de raison $-\frac{1}{4}$ ce qui permet d'écrire que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n - \ell = (u_0 - \ell) \left(-\frac{1}{4} \right)^n$$

En conclusion:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \frac{8}{5} \left(-\frac{1}{4}\right)^n + \frac{2}{5}$$

2) Pour $n \in \mathbb{N}$,

$$S_n = \sum_{k=0}^n \left(\frac{8}{5} \left(-\frac{1}{4} \right)^k + \frac{2}{5} \right)$$

$$= \frac{8}{5} \frac{1 - \left(-\frac{1}{4} \right)^{n+1}}{1 - \left(-\frac{1}{4} \right)} + \frac{2}{5} (n+1)$$

$$= \frac{32}{25} \left(1 - \left(-\frac{1}{4} \right)^{n+1} \right) + \frac{2}{5} n + \frac{2}{5}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad S_n = \frac{8}{25} \left(-\frac{1}{4} \right)^n + \frac{2n}{5} + \frac{42}{25}$$

3) $-\frac{1}{4} \in]-1;1[$ donc $\lim_{n \to +\infty} \left(-\frac{1}{4}\right)^n = 0$ et ainsi : $\lim_{n \to +\infty} u_n = \frac{2}{5}$ et comme de plus : $\lim_{n \to +\infty} \frac{2n}{5} + \frac{42}{25} = +\infty$ on a : $\lim_{n \to +\infty} S_n = +\infty$

Ex 3: 1) On reconnait une suite récurrente linéaire d'ordre 2 à coefficients constants d'équation caractéristique :

$$x^{2} - 6x + 9 = 0$$
 (\iff $(x - 3)^{2} = 0$)

Cette équation a une unique racine réelle donc il existe α et β tels que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = (\alpha + \beta n)3^n$. de plus α et β vérifient le système :

$$\begin{cases} \alpha = 1 (= u_0) \\ \alpha + \beta = 0 (= u_1) \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = -1 \end{cases}$$

En conclusion:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = (1-n) \, 3^n$$

2) On reconnait une suite récurrente linéaire d'ordre 2 à coefficients constants d'équation caractéristique :

$$2x^2 + x - 1 = 0$$
 (\iff $(x+1)(2x-1) = 0$)

Cette équation a deux racines réelles distinctes donc il existe α et β tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \alpha(-1)^n + \beta\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

de plus α et β vérifient le système :

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 1 \ (= u_0) \\ -\alpha + \frac{1}{2}\beta = 1 \ (= u_1) \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha = -\frac{1}{3} \\ \beta = \frac{4}{3} \end{cases}$$

En conclusion:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = -\frac{1}{3}(-1)^n + \frac{4}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

3) On reconnait une suite récurrente linéaire d'ordre 2 à coefficients constants d'équation caractéristique :

$$x^{2} - x + 1 = 0$$
 $(\iff (x - e^{\frac{i\pi}{3}})(x - e^{\frac{-i\pi}{3}}) = 0)$

Cette équation a deux racines complexes distinctes conjuguées donc il existe α et β tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \alpha \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) + \beta \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)$$

de plus α et β vérifient le système :

$$\begin{cases} \alpha = 1 \ (= u_0) \\ \frac{1}{2}\alpha + \frac{\sqrt{3}}{2}\beta = 1 \ (= u_1) \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = \frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

En conclusion:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) + \frac{\sqrt{3}}{3}\sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)$$

 $\mathbf{Ex} \ \mathbf{4:} \ 1) \ \mathrm{Pour} \ n \in \mathbb{N}^*, \quad \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \exp\left(n\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right)$ or $\lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n} = 0$ donc $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$ ou encore $\lim_{n \to +\infty} n\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1$.

et sachant que $\lim_{x\to 1} e^x = e$, on peut alors en conclure que : $\left|\lim_{n\to +\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e\right|$

Ex 5: • On peut encadrer, mais on peut aussi utiliser la valeur absolue.

$$|u_n| = \frac{n}{n^2 + n + 1}$$

$$= \frac{1}{n} \times \frac{1}{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}$$

$$\xrightarrow{n \to +\infty} 0$$

 $((|u_n - 0|) \text{ converge vers } 0), \text{ donc } [u_n] \text{ converge vers } 0]$

2 On factorise "en haut et en bas" par le terme prépondérant.

$$u_n = \frac{n3^n - 4^n}{-4^n + n^2}$$

$$= \frac{-4^n}{-4^n} \times \frac{1 - n\left(\frac{3}{4}\right)^n}{1 - \frac{n^2}{4^n}}$$

$$= \frac{1 - n\left(\frac{3}{4}\right)^n}{1 - \frac{n^2}{4^n}}$$

$$\xrightarrow[n \to +\infty]{} 1$$

En effet (croissances comparées): $\lim_{n \to +\infty} n \left(\frac{3}{4}\right)^n = 0$ et $\lim_{n \to +\infty} \frac{n^2}{4^n} = 0$ $\boxed{(u_n) \text{ converge vers 1}}$

Ex 6: • Etudions (a_{2n}) , (en posant $u_n = a_{2n}$, $u_{n+1} - u_n = a_{2n+2} - a_{2n}$) Pour n dans \mathbb{N} ,

$$a_{2n+2} - a_{2n} = \sum_{k=1}^{2n+2} \frac{(-1)^{k+1}}{k} - \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$$

$$= \frac{(-1)^{2n+1+1}}{2n+1} + \frac{(-1)^{2n+2+1}}{2n+2}$$

$$= \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2}$$

$$= \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} > 0$$

La suite (a_{2n}) est croissante.

• De même pour n dans \mathbb{N} ,

$$a_{2n+3} - a_{2n+1} = \frac{(-1)^{2n+2+1}}{2n+2} + \frac{(-1)^{2n+3+1}}{2n+3}$$
$$= -\frac{1}{2n+2} + \frac{1}{2n+3}$$
$$= -\frac{1}{(2n+3)(2n+2)} < 0$$

La suite (a_{2n+1}) est décroissante.

• De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_{2n+1} - a_{2n} = \frac{1}{2n+1} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$

Les trois résultats précédents permettent de conclure que

les suite
$$(a_{2n})$$
 et (a_{2n+1}) sont adjacentes


Le théorème de suites adjacentes permet alors d'affirmer que :

les suites (a_{2n}) et (a_{2n+1}) sont convergentes et vers la même limite.


On peut alors en déduire que : (Théorème sur les suites extraites)

$$(a_n)$$
 est convergente

Ex 7: 1) Pour tout
$$x \in \mathbb{R}$$
, $f(x) - x = \frac{x^2 + x}{2} - x = \frac{x^2 - x}{2} = \frac{x(x-1)}{2}$ donc



2) L'étude de f donne le tableau de variations suivant : (à faire, mais sans difficulté)



On peut en déduire que $f([0,1]) \subset [0,1]$. ([0,1] est stable par f)

Montrons par récurrence sur n que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in [0, 1]$,

- \bullet Pour n=0, $u_0=\frac{1}{2} \text{ donc on a bien } \quad u_0 \in [0,1]$
- Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n \in [0, 1]$, on a $u_n \in [0, 1]$ et [0, 1] et stable par f donc $f(u_n) \in [0, 1]$ et ainsi $u_{n+1} \in [0, 1]$

En conclusion:

pour tout
$$n \in \mathbb{N}$$
, $u_n \in [0,1]$

3) D'après a) $\forall x \in [0,1], \ f(x) - x \leq 0$ et d'après b) $\forall n \in \mathbb{N}, \ u_n \in [0,1],$ donc $\forall n \in \mathbb{N}, \ f(u_n) - u_n \leq 0$ ou encore $u_{n+1} - u_n \leq 0$ ce qui permet de conclure :

$$(u_n)$$
 est décroissante

Ex 8: (non corrigé)

Ex 9:

$$S_1 = \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$$

$$= \sum_{k=1}^n \left(\ln(k+1) - \ln(k)\right)$$

$$= \ln(n+1) - \ln(1)$$
 Somme télescopique

$$S_1 = \ln(n+1)$$

$$S_2 = \sum_{k=2}^n \left(\ln(k-1) - \ln(k) \right) + \sum_{k=2}^n \left(\ln(k+1) - \ln(k) \right)$$

= $\ln(1) - \ln(n) + \ln(n+1) - \ln(2)$ Sommes télescopiques

$$S_2 = \ln\left(\frac{n+1}{2n}\right)$$

$$S_3 = \sum_{k=1}^{n} k \times k!$$

$$= \sum_{k=2}^{n+1} (k-1) \times (k-1)! \qquad \text{(changement d'indice)}$$

$$= \sum_{k=2}^{n+1} \left(k! - (k-1)! \right)$$

$$= (n+1)! - 1! \qquad \text{(Somme télescopique)}$$

$$S_3 = (n+1)! - 1$$

Ex 10: Soient $n \in \mathbb{N}$ et $(a, b) \in \mathbb{C}^2$:

$$(a-b)\sum_{k=0}^{n}a^{n-k}b^{k} = \sum_{k=0}^{n}a^{n+1-k}b^{k} - \sum_{k=0}^{n}a^{n-k}b^{k+1}$$

$$= \sum_{k=0}^{n}a^{n+1-k}b^{k} - \sum_{k=1}^{n+1}a^{n-k+1}b^{k}$$

$$= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n}a^{n+1-k}b^{k} - \sum_{k=1}^{n}a^{n-k+1}b^{k} - b^{n+1}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall (a,b) \in \mathbb{C}^2, \quad a^{n+1} - b^{n+1} = (a-b) \sum_{k=0}^n a^{n-k} b^k$$

Ex 11: (non corrigé)

Ex 12:

$$S_n = \sum_{i=1}^n i2^i$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i 2^i$$

$$= \sum_{j=1}^n \sum_{i=j}^n 2^i$$

$$= \sum_{j=1}^n 2^j \frac{1 - 2^{n-j+1}}{1 - 2}$$

$$= \sum_{j=1}^n (2^{n+1} - 2^j)$$

$$= n2^{n+1} - 2 \frac{1 - 2^n}{1 - 2}$$

$$S_0 = (n-1)2^{n+1} + 2$$

Ex 13: 1)
$$\frac{I_{n+1,n+1}}{I_{n,n}} = \frac{(n+1)!(n+1)!}{(2n+3)!} \times \frac{(2n+1)!}{n!n!} = \frac{(n+1)(n+1)}{(2n+3)(2n+2)} \underset{n \to +\infty}{\sim} \frac{n^2}{4n^2} = \frac{1}{4}.$$

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{I_{n+1,n+1}}{I_{n,n}} = \frac{1}{4}$$

2) Dire que $\lim_{n\to +\infty} u_n = \ell$ signifie que :

$$\forall \varepsilon > 0, \ \exists n_0 \in \mathbb{N}: \ \forall n \in \mathbb{N}, \ n \geqslant n_0 \Rightarrow |u_n - \ell| \leqslant \varepsilon$$

3) $\lim_{n\to+\infty}\frac{I_{n+1,n+1}}{I_{n,n}}=\frac{1}{4}$ donc en utilisant la définition avec $\varepsilon=\frac{1}{4}$ et $u_n=\frac{I_{n+1,n+1}}{I_{n,n}}$ il vient :

il existe
$$n_0$$
 tel que : $\forall n \geqslant n_0, \ \frac{I_{n+1,n+1}}{I_{n,n}} \leqslant \frac{1}{2}$

4) On peut raisonner ici par récurrence sur $n \geqslant n_0$ ou en faisant un produit comme ci-dessus :

On a:
$$\forall k \geqslant n_0, \ \frac{I_{k+1,k+1}}{I_{k,k}} \leqslant \frac{1}{2},$$

donc en faisant le produit pour k entre n_0 et n-1 il vient (produit télescopique) : $\frac{I_{n,n}}{I_{n_0,n_0}} \leqslant \frac{1}{2^{n-n_0}}$

Pour tout
$$n \geqslant n_0$$
, $I_{n,n} \leqslant \frac{2^{n_0}}{2^n} I_{n_0,n_0}$

5)
$$\ln\left(\frac{2n}{2n+1}\right) = \ln\left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) \underset{n \to +\infty}{\sim} \frac{-1}{2n+1}$$
 puisque $\lim_{n \to +\infty} \frac{-1}{2n+1} = 0$.

6) On déduit de la question précédente que : $\lim_{n \to +\infty} (2n+1) \ln \left(\frac{2n}{2n+1} \right) = -1$ et par composition avec exp on obtient

$$\lim_{n \to +\infty} \exp\left((2n+1)\ln\left(\frac{2n}{2n+1}\right)\right) = e^{-1}$$

7)

$$4^{n}I_{n,n} = 4^{n} \frac{n!n!}{(2n+1)!}$$

$$\sim 4^{n} \frac{n^{n} \cdot n^{n}}{(2n+1)^{2n+1}} \frac{e^{2n+1}}{e^{n} \cdot e^{n}} \frac{2\pi n}{\sqrt{2\pi(2n+1)}}$$

$$\sim \frac{1}{2n} \exp\left((2n+1)\ln\left(\frac{2n}{2n+1}\right)\right) \cdot e \cdot \sqrt{\frac{2\pi n^{2}}{2n+1}}$$

$$\sim \frac{1}{2n} \cdot e^{-1} \cdot e \cdot \sqrt{\pi n}$$

$$\boxed{4^n I_{n,n} \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}}$$

Ex 14: 1) Pour $i \ge 2$

$$t \longmapsto \frac{1}{t} \text{ est continue et décroissante sur } [i-1;i+1] \text{ donc } \boxed{\int_i^{i+1} \frac{1}{t} \; \mathrm{d}t \leqslant \frac{1}{i} \leqslant \int_{i-1}^i \frac{1}{t} \; \mathrm{d}t}$$

En effet

d'une part :
$$\forall t \in [i-1,i], \ \frac{1}{i} \leqslant \frac{1}{t}$$
 donc $\frac{1}{i} \leqslant \int_{i-1}^{i} \frac{1}{t} dt$

d'autre part :
$$\forall t \in [i, i+1], \ \frac{1}{t} \leqslant \frac{1}{i}$$
 donc $\int_{i}^{i+1} \frac{1}{t} dt \leqslant \frac{1}{i}$

2) Pour
$$n \ge 2$$
, $\frac{\ln(n+1)}{\ln(n)} = 1 + \frac{1}{\ln(n)} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$

or
$$\ln(n) \xrightarrow[n \to +\infty]{} +\infty$$
 et $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$ donc $\frac{\ln(n+1)}{\ln(n)} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 1$

$$\frac{\ln(n+1)}{n \to +\infty} \frac{\ln(n)}{\ln(n)}$$

3) On note
$$A_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

En sommant la relation de la question 3 (a) pour i allant de 2 à un entier $n \ge 2$, et en utilisant la relation de Chasles on obtient :

$$\int_{2}^{n+1} \frac{1}{t} dt \leqslant \sum_{i=2}^{n} \frac{1}{i} \leqslant \int_{1}^{n} \frac{1}{t} dt$$

On en déduit :

$$\ln(n+1) - \ln(2) \leqslant A_n - 1 \leqslant \ln(n)$$

Ce qui nous donne l'encadrement :

$$\frac{\ln(n+1)}{\ln(n)} - \frac{\ln(2) - 1}{\ln(n)} \leqslant \frac{A_n}{\ln(n)} \leqslant 1 + \frac{1}{\ln(n)}$$

donc (théorème des gendarmes et le résultat de la question 2)) $\lim_{n\to+\infty} \frac{A_n}{\ln(n)} = 1$, ou encore :

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \underset{n \to +\infty}{\sim} \ln(n)}$$