

Exercices à faire ensemble

1. Soit $f : E \rightarrow F$ une application entre deux espaces vectoriels.

Quelle hypothèse sur f permet d'écrire : $\forall (a, b) \in E^2, f(a) = f(b) \iff a = b$?

f est linéaire f est bijective f est surjective f est injective

2. On note f la forme linéaire de \mathbb{R}^3 définie par : $(x, y, z) \mapsto x + y + z$.

On démontre que le rang de f est 1 et son noyau admet pour base $((1, -1, 0), (1, 0, -1))$

- 1) Le noyau de f est fini : vrai faux
- 2) L'image de f est de dimension finie : vrai faux
- 3) Le noyau est de dimension 3 : vrai faux

3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

- 1) L'expression « dimension de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ » a-t-elle un sens mathématique ? Oui Non

Si oui, que vaut-elle :

- 2) L'expression « dimension de A » a-t-elle un sens mathématique ? Oui Non

Si oui, qu'est-ce que cela signifie :

- 3) L'expression « rang de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ » a-t-elle un sens mathématique ? Oui Non

Si oui, qu'est-ce que cela désigne :

- 4) L'expression « rang de A » a-t-elle un sens mathématique ? Oui Non

Si oui, qu'est-ce que c'est :

- 5) L'expression « noyau de A » a-t-elle un sens mathématique ? Oui Non

Si oui, qu'est-ce que c'est :

- 6) L'expression « noyau de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ » a-t-elle un sens mathématique ? Oui Non

Si oui, dans quel cadre :

4. On note $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

on remarque en faisant : $L_3 - L_1 \rightarrow L_3$ que $\text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

- 1) A est une matrice triangulaire : vrai faux

- 2) A est une matrice inversible : vrai faux

- 3) A est une matrice symétrique : vrai faux

5. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$,

- 1) Affirmation : $(\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), AX = 0_{n,1}) \iff A = 0_n$

Vrai Faux

- 2) Affirmation : $(\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), AX = 0_{n,1} \iff X = 0_{n,1}) \iff \text{rg}(A) = n$

Vrai Faux

- 3) Affirmation : $\forall B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), (AB = 0_n \iff B = 0_n)$

Vrai Faux

- 4) Affirmation : $\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), (AX = 0_{n,1} \iff X = 0_{n,1})$

Vrai Faux

6. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice inversible

- 1) Affirmation : $\forall B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), (AB = 0_n \iff B = 0_n)$
 Vrai Faux
- 2) Affirmation : $\forall B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), AB = BA$
 Vrai Faux
- 3) Affirmation : $\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), (AX = 0_{n,1} \iff X = 0_{n,1})$
 Vrai Faux

7. Soit E un espace vectoriel, \mathcal{B} une base de E et f un endomorphisme de E .

- 1) L'expression « dimension de \mathcal{B} » a-t-elle un sens mathématique ? Oui Non
 Si oui, qu'est-ce que cela signifie :
- 2) L'expression « image de f » a-t-elle un sens mathématique ? Oui Non
 Si oui, qu'est-ce que c'est :
- 3) L'expression « rang de \mathcal{B} » a-t-elle un sens mathématique ? Oui Non
 Si oui, qu'est-ce que c'est :
- 4) L'expression « image de \mathcal{B} » (sans préciser par quoi) a-t-elle un sens mathématique ? Oui Non
 Si oui, qu'est-ce que cela signifie :
- 5) L'expression « dimension de f » a-t-elle un sens mathématique ? Oui Non
 Si oui, qu'est-ce que cela signifierait :
- 6) L'expression « rang de $\text{Vect}(\mathcal{B})$ » a-t-elle un sens mathématique ? Oui Non
 Si oui, de quoi s'agit-il :
- 7) L'expression « dimension de $\text{Vect}(\mathcal{B})$ » a-t-elle un sens mathématique ? Oui Non
 Si oui, que vaut-elle :
- 8) L'expression « image de \mathcal{B} par f » a-t-elle un sens mathématique ? Oui Non
 Si oui, qu'est-ce que c'est :

8. Soit E un espace vectoriel de dimension 3 sur \mathbb{R} , et soit (e_1, e_2, e_3) une base de E .

On note f l'endomorphisme dont la matrice dans \mathcal{B} est $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 5 & 4 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$

On s'intéresse à l'équivalence :

$$f(u) = 0_E \iff \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 5 & 4 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Quelles propriétés de $\text{Coord}_{\mathcal{B}}(\cdot)$ permettent d'assurer cette équivalence ?

$\text{Coord}_{\mathcal{B}}(\cdot)$ est linéaire Pour justifier :

$\text{Coord}_{\mathcal{B}}(\cdot)$ est bijective Pour justifier :

$\text{Coord}_{\mathcal{B}}(f(\cdot)) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) \text{Coord}_{\mathcal{B}}(\cdot)$ Pour justifier :