TD 3 : Intégrales et équations différentielles

Solutions à prendre avec des pincettes (rédaction/justification *etc.*)

Exercice 1

1. $\int_0^1 \frac{e^x - 1}{e^x + 1} dx$. Posons $u = e^x$ ($dx = \frac{du}{u}$). Alors

$$\int_0^1 \frac{e^x - 1}{e^x + 1} dx = \int_1^e \frac{u - 1}{u(u + 1)} du = \int_1^e \left(-\frac{1}{u} + \frac{2}{u + 1} \right) du.$$

Donc

$$\boxed{\int_0^1 \frac{e^x - 1}{e^x + 1} dx = -1 + 2 \ln\left(\frac{e + 1}{2}\right)}.$$

2. $\int_1^2 \frac{1}{t(t + 1)} dt$.

$$\frac{1}{t(t + 1)} = \frac{1}{t} - \frac{1}{t + 1} \Rightarrow \boxed{\int_1^2 \frac{1}{t(t + 1)} dt = \ln \frac{4}{3}}.$$

3. $\int_0^{\pi/4} \frac{\cos x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$. Posons $u = \cos^2 x$ ($du = -2 \cos x \sin x dx$).

$$\int_0^{\pi/4} \frac{\cos x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \frac{1}{2} \int_{1/2}^1 \frac{du}{1 + u} = \frac{1}{2} [\ln(1 + u)]_{1/2}^1 = \boxed{\frac{1}{2} \ln \frac{4}{3}}.$$

4. $\int_0^{\sqrt{3}} x \arctan x dx$ (intégration par parties). Avec $u = \arctan x$, $v' = x \Rightarrow v = \frac{x^2}{2}$:

$$\int_0^{\sqrt{3}} x \arctan x dx = \left[\frac{x^2}{2} \arctan x \right]_0^{\sqrt{3}} - \frac{1}{2} \int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^2}{1 + x^2} dx.$$

Comme $\frac{x^2}{1 + x^2} = 1 - \frac{1}{1 + x^2}$,

$$\int_0^{\sqrt{3}} x \arctan x dx = \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{3} - \frac{1}{2} \left[x - \arctan x \right]_0^{\sqrt{3}} = \boxed{\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}}.$$

5. On pose

$$I = \int e^{ax} \sin(bx) dx, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

(a) **Première intégration par parties.** Choisissons $u = \sin(bx)$, $dv = e^{ax} dx$. Alors $du = b \cos(bx) dx$, $v = \frac{e^{ax}}{a}$ (si $a = 0$, la formule finale reste vraie et la preuve est immédiate).

$$I = \frac{e^{ax}}{a} \sin(bx) - \frac{b}{a} \int e^{ax} \cos(bx) dx.$$

Notons

$$J = \int e^{ax} \cos(bx) dx.$$

Alors

$$I = \frac{e^{ax}}{a} \sin(bx) - \frac{b}{a} J. \quad (1)$$

(b) Deuxième intégration par parties (pour J). Cette fois $u = \cos(bx)$, $dv = e^{ax} dx$.
Donc $du = -b \sin(bx) dx$, $v = \frac{e^{ax}}{a}$.

$$J = \frac{e^{ax}}{a} \cos(bx) + \frac{b}{a} \int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a} \cos(bx) + \frac{b}{a} I. \quad (2)$$

(c) Résolution du système. En reportant (2) dans (1) :

$$I = \frac{e^{ax}}{a} \sin(bx) - \frac{b}{a} \left(\frac{e^{ax}}{a} \cos(bx) + \frac{b}{a} I \right) = \frac{e^{ax}}{a} \sin(bx) - \frac{b e^{ax}}{a^2} \cos(bx) - \frac{b^2}{a^2} I.$$

Donc

$$\left(1 + \frac{b^2}{a^2} \right) I = \frac{e^{ax}}{a} \sin(bx) - \frac{b e^{ax}}{a^2} \cos(bx),$$

et finalement

$$I = \int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin(bx) - b \cos(bx)) + C.$$

Application à l'intégrale 5 :

$$\int_0^{\pi/2} e^{2x} \sin(3x) dx = \left[\frac{e^{2x}}{13} (2 \sin(3x) - 3 \cos(3x)) \right]_0^{\pi/2} = \boxed{\frac{3 - 2e^\pi}{13}}.$$

6. $\int_0^1 \frac{dx}{x^2 + x + 1}.$

$$x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 \Rightarrow \int \frac{dx}{x^2 + x + 1} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right).$$

Ainsi

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^2 + x + 1} = \frac{2}{\sqrt{3}} \left[\arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) \right]_0^1 = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

7. $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$. Avec $x = \cos t$, $dx = -\sin t dt$:

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \int_{\pi/2}^0 \sin t (-\sin t) dt = \int_0^{\pi/2} \sin^2 t dt = \left[\frac{t}{2} - \frac{\sin(2t)}{4} \right]_0^{\pi/2} = \boxed{\frac{\pi}{4}}.$$

Exercice 2

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$I_n = \int_0^{\pi/2} (\sin x)^n dx.$$

1) Calcul de I_0, I_1, I_2 .

$$I_0 = \int_0^{\pi/2} 1 dx = \boxed{\frac{\pi}{2}}, \quad I_1 = \int_0^{\pi/2} \sin x dx = \boxed{1},$$

$$I_2 = \int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx = \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \cos(2x)}{2} dx = \boxed{\frac{\pi}{4}}.$$

2) **Convergence de $(I_n)_{n \geq 0}$.** Pour $x \in [0, \pi/2]$ et $n \geq 0$, $(\sin x)^{n+1} \leq (\sin x)^n$. Donc $I_{n+1} \leq I_n$: la suite est décroissante. Comme $I_n \geq 0$, elle converge.

$$\boxed{(I_n) \text{ est décroissante et converge }}.$$

3) **Relation de récurrence.** Pour $n \geq 0$, intégration par parties sur I_{n+2} avec $u = \sin^{n+1} x$, $v' = \sin x \Rightarrow v = -\cos x$:

$$I_{n+2} = \left[-\sin^{n+1} x \cos x \right]_0^{\pi/2} + (n+1) \int_0^{\pi/2} \sin^n x \cos^2 x dx = (n+1) \int_0^{\pi/2} \sin^n x (1 - \sin^2 x) dx.$$

Ainsi

$$I_{n+2} = (n+1) I_n - (n+1) I_{n+2} \implies \boxed{(n+2) I_{n+2} = (n+1) I_n}.$$

4) **La suite $a_n = n I_n I_{n-1}$ est constante.** En écrivant la relation précédente avec l'indice $n-1$: $(n+1) I_{n+1} = n I_{n-1}$. En multipliant par I_n ,

$$a_{n+1} = (n+1) I_{n+1} I_n = n I_{n-1} I_n = a_n.$$

Donc (a_n) est constante et, pour $n=1$, $a_1 = 1 \cdot I_1 \cdot I_0 = 1 \cdot 1 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$.

$$\boxed{n I_n I_{n-1} = \frac{\pi}{2} \text{ pour tout } n \geq 1}.$$

5) **Limite de (I_n) .** Comme $I_{n-1} \geq I_n \geq 0$,

$$n I_n^2 \leq n I_n I_{n-1} = \frac{\pi}{2} \implies I_n \leq \sqrt{\frac{\pi}{2n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

La suite étant positive, par encadrement, sa limite est donc 0 :

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 0}.$$

Exercice 3

On définit

$$F(x) = \int_x^{2x} \frac{dt}{t^4 + t^2 + 1} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

1) **Domaine de définition.** Le dénominateur vaut $t^4 + t^2 + 1 = (t^2 + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$ pour tout t . Donc

$$\boxed{\mathcal{D}_F = \mathbb{R}}.$$

2) **Parité.** La fonction $\varphi(t) = \frac{1}{t^4 + t^2 + 1}$ est paire. Alors

$$F(-x) = \int_{-x}^{-2x} \varphi(t) dt = - \int_{-2x}^{-x} \varphi(t) dt = - \int_x^{2x} \varphi(u) du = -F(x).$$

F est impaire.

3) **Tableau de variations.** Par la règle de Leibniz,

$$F'(x) = \varphi(2x) \cdot 2 - \varphi(x) = \frac{2}{16x^4 + 4x^2 + 1} - \frac{1}{x^4 + x^2 + 1} = \frac{1 - 2x^2 - 14x^4}{(16x^4 + 4x^2 + 1)(x^4 + x^2 + 1)}.$$

Ainsi $\text{sgn } F'(x) = \text{sgn}(1 - 2x^2 - 14x^4)$. Posons $y = x^2 \geq 0$. Alors $1 - 2x^2 - 14x^4 > 0 \iff 14y^2 + 2y - 1 < 0$, dont la racine positive est $y_0 = \frac{-1 + \sqrt{15}}{14}$. En notant $\alpha = \sqrt{y_0} = \sqrt{\frac{-1 + \sqrt{15}}{14}}$, on obtient

$$F'(x) \begin{cases} < 0, & |x| > \alpha, \\ = 0, & x = \pm\alpha, \\ > 0, & |x| < \alpha. \end{cases}$$

Donc F décroît sur $]-\infty, -\alpha]$, croît sur $[-\alpha, \alpha]$, puis décroît sur $[\alpha, +\infty[$. Comme F est impaire, $F(-\alpha) = -F(\alpha)$. (On peut poser $M = F(\alpha) > 0$.)

4) (a) **Encadrement utile.** Pour $t > 0$ (ce qui suffira car on l'appliquera à $t = x^2 \geq 0$),

$$1 + t + t^2 \geq t^2 \quad \Rightarrow \quad 0 \leq \frac{1}{1 + t + t^2} \leq \frac{1}{t^2}.$$

(b) **Limites aux bornes de $\mathcal{D}_F$.** Pour $|t| \geq 1$, en appliquant l'encadrement précédent à $t = x^2$,

$$0 \leq \frac{1}{t^4 + t^2 + 1} = \frac{1}{(t^2)^2 + t^2 + 1} \leq \frac{1}{t^4}.$$

Ainsi, pour $x > 1$,

$$0 \leq F(x) \leq \int_x^{2x} \frac{dt}{t^4} = \left[-\frac{1}{3t^3} \right]_x^{2x} = \frac{7}{24} \cdot \frac{1}{x^3} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

Par impairté, la limite en $-\infty$ est également 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0.$$

5) **Valeur de $F'(0)$ et aspect de la courbe.** On a $\varphi(0) = 1$, d'où

$$F'(0) = 2\varphi(0) - \varphi(0) = 1.$$

La courbe est *symétrique par rapport à l'origine* (fonction impaire), passe par $(0, 0)$ avec une tangente de pente 1, croît sur $[-\alpha, \alpha]$ et décroît au-delà, avec $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} F(x) = 0$.

Remarque : la valeur de α vaut $\sqrt{\frac{\sqrt{15}-1}{14}}$, car on pourrait montrer que $F(x) = G(2x) - G(x)$, si on pose

$$G(t) = \frac{1}{4} \ln\left(\frac{t^2 + t + 1}{t^2 - t + 1}\right) + \frac{1}{2\sqrt{3}} \left(\arctan\left(\frac{2t+1}{\sqrt{3}}\right) + \arctan\left(\frac{2t-1}{\sqrt{3}}\right) \right).$$

Exercice 4

On pose pour $t \in \mathbb{R}^*$: $f(t) = \frac{e^t}{t}$, et pour $x \in \mathbb{R}$:

$$F(x) = \int_x^{3x} f(t) dt = \int_x^{3x} \frac{e^t}{t} dt.$$

1) Régularité et variations sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$. Sur chacun des ouverts $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$, l'intégrande est continue ; par la règle de Leibniz,

$$F'(x) = 3f(3x) - f(x) = \frac{e^{3x}}{x} - \frac{e^x}{x} = \frac{e^x(e^{2x} - 1)}{x}.$$

Ainsi, pour $x > 0$, $e^{2x} - 1 > 0$ et $x > 0 \Rightarrow F'(x) > 0$; pour $x < 0$, $e^{2x} - 1 < 0$ et $x < 0 \Rightarrow F'(x) > 0$.

F est C^1 et strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$.

2) Limites à l'infini et croissance asymptotique. Pour $x > 0$, comme f est croissante (pour $t \geq 1$),

$$2x f(x) \leq F(x) \leq 2x f(3x) \quad \Rightarrow \quad 2e^x \leq F(x) \leq \frac{2}{3}e^{3x}.$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x} = +\infty.$$

Pour $x < 0$, on a

$$0 \leq F(x) = \int_{3x}^x \frac{e^t}{|t|} dt \leq \frac{1}{|3x|} \int_{3x}^x e^t dt = \frac{e^x - e^{3x}}{3|x|} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0,$$

d'où

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0.$$

3) Extension continue de g . Posons $g(t) = \frac{e^t - 1}{t}$ pour $t \in \mathbb{R}^*$. Alors

$$\lim_{t \rightarrow 0} g(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$$

(dérivée de e^t en 0). En posant $g(0) = 1$, on obtient

g se prolonge en une fonction continue sur $\mathbb{R}$.

4) Prolongement par continuité de F en 0 — détails.

On écrit

$$f(t) = \frac{e^t}{t} = \frac{1}{t} + g(t), \quad g(t) = \frac{e^t - 1}{t} \quad (t \neq 0), \quad g(0) = 1.$$

La fonction g ainsi prolongée est continue sur $\mathbb{R}$.

Pour $x \neq 0$,

$$F(x) = \int_x^{3x} f(t) dt = \underbrace{\int_x^{3x} \frac{dt}{t}}_{=\ln 3} + \int_x^{3x} g(t) dt = \ln 3 + \int_x^{3x} g(t) dt.$$

Théorème des accroissements finis pour les intégrales (T.A.F.I.), appelé aussi théorème de la valeur moyenne. Si g est **continue** sur le segment $[a, b]$ (avec $a < b$), alors

$$\exists \xi \in [a, b] \quad \text{tel que} \quad \int_a^b g(t) dt = g(\xi) (b - a).$$

Application.

- Si $x > 0$, g est continue sur $[x, 3x]$, donc

$$\int_x^{3x} g(t) dt = g(\xi_x) (3x - x) = 2x g(\xi_x) \quad \text{pour un } \xi_x \in [x, 3x].$$

- Si $x < 0$, on applique le T.A.F.I. sur $[3x, x]$ (où $3x < x$) :

$$\int_{3x}^x g(t) dt = g(\eta_x) (x - 3x) = -2x g(\eta_x).$$

Ainsi

$$\int_x^{3x} g(t) dt = - \int_{3x}^x g(t) dt = 2x g(\eta_x).$$

En posant $\xi_x = \eta_x$, dans tous les cas

$$\boxed{\int_x^{3x} g(t) dt = 2x g(\xi_x) \quad \text{avec} \quad \xi_x \in [\min(x, 3x), \max(x, 3x)]}.$$

Pourquoi $\xi_x \rightarrow 0$ *quand* $x \rightarrow 0$? Comme ξ_x est entre x et $3x$, on a

$$|\xi_x| \leq \max(|x|, |3x|) = 3|x| \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0,$$

donc $\xi_x \rightarrow 0$. Par continuité de g en 0, $g(\xi_x) \rightarrow g(0) = 1$, et

$$\int_x^{3x} g(t) dt = 2x g(\xi_x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0.$$

Conclusion.

$$F(x) = \ln 3 + \int_x^{3x} g(t) dt \xrightarrow{x \rightarrow 0} \ln 3.$$

Ainsi F se prolonge par continuité en 0 en posant

$$\boxed{F(0) = \ln 3}.$$

Exercice 5

Sur $I =]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, on a $\cos x \neq 0$, donc on peut diviser par $\cos^3 x$. L'équation différentielle est donc linéaire d'ordre un, homogène, à coefficients continus sur I , et sous forme normalisée.

On détermine une primitive de $x \mapsto \frac{2 \sin(x)}{\cos^3(x)}$, qui est par exemple $x \mapsto \frac{1}{\cos^2(x)}$. Ainsi, par théorème

de Cauchy linéaire l'ensemble de solutions est $\boxed{\text{la droite vectorielle dirigée par } x \mapsto \exp\left(-\frac{1}{\cos^2(x)}\right)}$.

Exercice 6

On résout sur $I =]-\infty, -1[$, $J =]-1, 1[$ et $K =]1, +\infty[$:

$$(1-x^2)y' - 2y + x + 1 = 0 \iff y' - \frac{2}{1-x^2}y = -\frac{x+1}{1-x^2}.$$

L'équation différentielle est donc linéaire d'ordre un, à coefficients continus sur I , J et K , et sous forme normalisée.

On décompose

$$-\frac{2}{1-x^2} = -\frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+x},$$

donc

$$\int -\frac{2}{1-x^2} dx = \int \left(-\frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+x} \right) dx = \ln|1-x| - \ln|1+x| = \ln \left| \frac{1-x}{1+x} \right|.$$

On peut donc choisir comme facteur intégrant

$$\mu(x) = \exp\left(\ln \left| \frac{1-x}{1+x} \right| \right) = \left| \frac{1-x}{1+x} \right|.$$

Sur chacun des intervalles I, J, K (où le signe est constant), on prend simplement

$$\mu(x) = \frac{1-x}{1+x} \quad (\text{tout multiple non nul conviendrait}).$$

Alors, par la méthode de variation de la constante

$$(\mu y)' = \mu \left(y' - \frac{2}{1-x^2}y \right) = \mu \left(-\frac{x+1}{1-x^2} \right) = -\frac{1}{1+x}.$$

En intégrant :

$$\mu(x)y(x) = -\ln|1+x| + C \implies \boxed{y(x) = \frac{1+x}{1-x} (C - \ln|1+x|)}.$$

Cette formule décrit la solution sur chacun des intervalles I, J, K (avec des constantes C éventuellement différentes sur chaque intervalle).

Exercice 7

On considère, pour $x \neq 0$,

$$x y'(x) + y(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2+1}} \iff y'(x) + \frac{1}{x}y(x) = \frac{2}{\sqrt{x^2+1}}.$$

C'est une équation linéaire d'ordre 1 (sur $] -\infty, 0[$ puis sur $]0, +\infty[$). Un facteur intégrant est $\mu(x) = x$ (car $\mu'/\mu = 1/x$). Alors

$$(xy)' = \frac{2x}{\sqrt{x^2+1}} \implies xy = \int \frac{2x}{\sqrt{x^2+1}} dx = 2\sqrt{x^2+1} + C.$$

Ainsi, sur chaque intervalle $] -\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$,

$$\boxed{y(x) = \frac{2\sqrt{x^2+1}}{x} + \frac{C}{x}}.$$

(La constante C peut être différente de part et d'autre de 0.)

Existe-t-il des solutions sur $\mathbb{R}$? Pour qu'une solution soit définie sur $\mathbb{R}$, elle doit être C^1 en 0. Or, près de 0,

$$y(x) = \frac{2\sqrt{1+x^2} + C}{x} = \frac{2+C}{x} + x + o(x).$$

Il faut donc annuler le terme $\frac{2+C}{x}$, d'où $C = -2$ (à gauche et à droite). On obtient la fonction

$$y(x) = \frac{2(\sqrt{1+x^2} - 1)}{x} = \frac{2x}{\sqrt{1+x^2} + 1},$$

qui se prolonge par $y(0) = 0$. Cette expression est C^1 sur $\mathbb{R}$ et, pour tout x , vérifie $xy'(x) + y(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2+1}}$ (on peut vérifier par dérivation directe).

Il existe une unique solution C^1 sur $\mathbb{R}$: $y(x) = \frac{2x}{\sqrt{1+x^2} + 1}$ (avec $y(0) = 0$).

Exercice 8

On cherche, pour chaque équation, la solution générale, puis la solution vérifiant $y(0) = y'(0) = 0$.

1) $y'' - 3y' + 2y = -x - 1$.

Éq. homogène : $r^2 - 3r + 2 = 0 \Rightarrow r = 1, 2$, donc $y_h = C_1e^x + C_2e^{2x}$. Particulière $y_p = ax + b$: $y_p'' - 3y_p' + 2y_p = (2a)x + (2b - 3a) = -x - 1 \Rightarrow a = -\frac{1}{2}, b = -\frac{5}{4}$. Ainsi

$$y(x) = C_1e^x + C_2e^{2x} - \frac{1}{2}x - \frac{5}{4}.$$

Conditions initiales : $\begin{cases} y(0) = C_1 + C_2 - \frac{5}{4} = 0, \\ y'(0) = C_1 + 2C_2 - \frac{1}{2} = 0 \end{cases} \Rightarrow C_2 = -\frac{3}{4}, C_1 = 2.$

$$y_1(x) = 2e^x - \frac{3}{4}e^{2x} - \frac{1}{2}x - \frac{5}{4}.$$

2) $y'' - 2y' + 5y = 3 + \sin(2x)$.

Éq. homogène : $r^2 - 2r + 5 = 0 \Rightarrow r = 1 \pm 2i$, $y_h = e^x(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$.

Particuliers :

$$y_{p,1} = c \Rightarrow 5c = 3 \Rightarrow c = \frac{3}{5}, \quad y_{p,2} = a \cos 2x + b \sin 2x.$$

En substituant, $(a - 4b) \cos 2x + (4a + b) \sin 2x = \sin 2x \Rightarrow a = \frac{4}{17}, b = \frac{1}{17}$. Donc

$$y(x) = e^x(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + \frac{3}{5} + \frac{4}{17} \cos 2x + \frac{1}{17} \sin 2x.$$

Conditions initiales : $\begin{cases} y(0) = C_1 + \frac{3}{5} + \frac{4}{17} = 0, \\ y'(0) = C_1 + 2C_2 + \frac{2}{17} = 0 \end{cases} \Rightarrow C_1 = -\frac{71}{85}, C_2 = \frac{61}{170}.$

$$y_2(x) = e^x \left(-\frac{71}{85} \cos 2x + \frac{61}{170} \sin 2x \right) + \frac{3}{5} + \frac{4}{17} \cos 2x + \frac{1}{17} \sin 2x.$$

3) $y'' - 4y' + 4y = 3xe^{2x}$.

Éq. homogène : $(r - 2)^2 = 0 \Rightarrow y_h = (C_1 + C_2x)e^{2x}$. Posons $y = e^{2x}z$. Alors $(D - 2)^2y = e^{2x}z'' = 3xe^{2x} \Rightarrow z'' = 3x$. On peut choisir $z_p = \frac{1}{2}x^3$, donc $y_p = \frac{1}{2}x^3e^{2x}$.

$$y(x) = (C_1 + C_2x)e^{2x} + \frac{1}{2}x^3e^{2x}.$$

CI : $y(0) = C_1 = 0, y'(0) = C_2 = 0$.

$$y_3(x) = \frac{1}{2}x^3e^{2x}.$$

4) $y'' + y = \sin^3 x$.

On écrit $\sin^3 x = \frac{3}{4}\sin x - \frac{1}{4}\sin 3x$. Éq. homogène : $y_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x$.

Particulière pour $\frac{3}{4}\sin x$ (résonance) : essayons $y_{p,1} = \alpha x \cos x$. Alors $y''_{p,1} + y_{p,1} = -2\alpha \sin x$, donc $-2\alpha = \frac{3}{4} \Rightarrow \alpha = -\frac{3}{8}$.

Particulière pour $-\frac{1}{4}\sin 3x$ (pas de résonance) : $y_{p,2} = A \cos 3x + B \sin 3x \Rightarrow y''_{p,2} + y_{p,2} = -8(A \cos 3x + B \sin 3x) = -\frac{1}{4}\sin 3x$. Donc $A = 0, B = \frac{1}{32}$.

Ainsi

$$y(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{3}{8}x \cos x + \frac{1}{32}\sin 3x.$$

CI : $y(0) = C_1 = 0$, et $y'(0) = C_2 - \frac{3}{8} + \frac{3}{32} = 0 \Rightarrow C_2 = \frac{9}{32}$.

$$y_4(x) = \frac{9}{32}\sin x - \frac{3}{8}x \cos x + \frac{1}{32}\sin 3x.$$

Exercice 9

On cherche les solutions sur $]0, +\infty[$ (à cause de $\ln x$). Posons

$$x = e^t \quad (t = \ln x), \quad Y(t) = y(e^t) = y(x).$$

Alors

$$y'(x) = \frac{1}{x}Y'(t), \quad y''(x) = \frac{Y''(t) - Y'(t)}{x^2}.$$

L'équation

$$x^2y'' - 2y = \frac{1}{x} + \ln x$$

devient, en remplaçant $x = e^t$ (donc $e^{-t} = 1/x$ et $t = \ln x$),

$$Y'' - Y' - 2Y = e^{-t} + t. \tag{*}$$

Résolution de (*). Homogène : $r^2 - r - 2 = 0 \Rightarrow r = 2, -1$,

$$Y_h = C_1e^{2t} + C_2e^{-t}.$$

Particulières :

$$Y_{p,1} = ct e^{-t} \Rightarrow Y''_{p,1} - Y'_{p,1} - 2Y_{p,1} = -3ce^{-t} \Rightarrow c = -\frac{1}{3},$$

$$Y_{p,2} = at + b \Rightarrow Y''_{p,2} - Y'_{p,2} - 2Y_{p,2} = -2at - (a + 2b) = t \Rightarrow a = -\frac{1}{2}, b = \frac{1}{4}.$$

Donc

$$Y(t) = C_1e^{2t} + C_2e^{-t} - \frac{1}{3}te^{-t} - \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}.$$

Retour à x . Comme $e^{2t} = x^2, e^{-t} = 1/x$ et $t = \ln x$, on obtient, pour $x > 0$,

$$y(x) = C_1x^2 + \frac{C_2}{x} - \frac{1}{3}\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{2}\ln x + \frac{1}{4}.$$

Exercice 10

On résout sur $\mathbb{R}_+^*$ l'équation

$$x^2 y'' + 4xy' + 2y = 1.$$

Changement de fonction : $z = x^2 y$ (donc $y = \frac{z}{x^2}$). Alors

$$y' = \frac{z'}{x^2} - \frac{2z}{x^3}, \quad y'' = \frac{z''}{x^2} - \frac{4z'}{x^3} + \frac{6z}{x^4}.$$

En remplaçant dans l'équation :

$$x^2 \left(\frac{z''}{x^2} - \frac{4z'}{x^3} + \frac{6z}{x^4} \right) + 4x \left(\frac{z'}{x^2} - \frac{2z}{x^3} \right) + 2 \frac{z}{x^2} = 1.$$

Les termes en z' et z se simplifient, il reste

$$\boxed{z'' = 1}.$$

On intègre :

$$z'(x) = x + C_1, \quad z(x) = \frac{x^2}{2} + C_1 x + C_2.$$

En revenant à $y = z/x^2$,

$$\boxed{y(x) = \frac{1}{2} + \frac{C_1}{x} + \frac{C_2}{x^2} \quad (x > 0)}.$$

Exercice 11

On considère (E) : $(x-1)y'' - y' - xy = 0$.

1) **Recherche d'une solution** $f(x) = e^{ax}$. En substituant $y = e^{ax}$ dans (E) :

$$e^{ax}((x-1)a^2 - a - x) = 0 \iff (a^2 - 1)x - (a^2 + a) = 0 \quad (\text{pour tout } x).$$

Il faut donc $a^2 - 1 = 0$ et $a^2 + a = 0$, d'où $a = -1$.

$$\boxed{f(x) = e^{-x} \text{ est une solution de } (E)}.$$

2) **Changement** $y = f z = e^{-x} z$ sur $]1, +\infty[$. On a

$$y' = e^{-x}(z' - z), \quad y'' = e^{-x}(z'' - 2z' + z).$$

En remplaçant dans (E) et en simplifiant par e^{-x} :

$$(x-1)(z'' - 2z' + z) - (z' - z) - xz = 0 \iff (x-1)z'' - (2x-1)z' = 0.$$

Posons $w = z'$. On résout l'équation linéaire du premier ordre

$$w' - \frac{2x-1}{x-1}w = 0$$

Puisque $\frac{2x-1}{x-1} = 2 + \frac{1}{x-1}$, alors

$$w = z' = C(x-1)e^{2x}.$$

Intégration :

$$z(x) = C \int (x-1)e^{2x} dx + C_2 = C \frac{e^{2x}}{2} \left(x - \frac{3}{2} \right) + C_2.$$

Finalement,

$$y(x) = e^{-x} z(x) = C e^x \left(\frac{x}{2} - \frac{3}{4} \right) + C_2 e^{-x} = A e^{-x} + B e^x \left(x - \frac{3}{2} \right),$$

où $A, B \in \mathbb{R}$.

$$\boxed{\text{Sur }]1, +\infty[: y(x) = A e^{-x} + B e^x \left(x - \frac{3}{2} \right)}.$$

Exercice 12

1) **Résolution de** (E_1) : $y'' - 4y = ax + b$.

Homogène : $r^2 - 4 = 0 \Rightarrow r = \pm 2$, $y_h = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$. *Particulière* : on cherche $y_p = \alpha x + \beta$. Alors $-4(\alpha x + \beta) = ax + b$, d'où $\alpha = -\frac{a}{4}$, $\beta = -\frac{b}{4}$.

$$y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x} - \frac{a}{4} x - \frac{b}{4}.$$

2) **Résolution de** (E_2) : $y'' - 4y = a|x| + b$.

On résout sur $] -\infty, 0]$ et $[0, +\infty[$, puis on recolle en imposant $y \in C^1(\mathbb{R})$.

Sur $[0, +\infty[$ ($|x| = x$) :

$$y_+(x) = A e^{2x} + B e^{-2x} - \frac{a}{4} x - \frac{b}{4}.$$

Sur $] -\infty, 0]$ ($|x| = -x$) :

$$y_-(x) = C e^{2x} + D e^{-2x} + \frac{a}{4} x - \frac{b}{4}.$$

La condition $y \in C^1(\mathbb{R})$ impose $y_-(0) = y_+(0)$ et $y'_-(0) = y'_+(0)$, soit

$$C + D = A + B, \quad -C + D = -A + B + \frac{a}{4}.$$

En fonction de A, B :

$$C = A - \frac{a}{8}, \quad D = B + \frac{a}{8}.$$

Ainsi, l'ensemble des solutions C^2 sur $\mathbb{R}$ est donné par

$$y(x) = \begin{cases} A e^{2x} + B e^{-2x} - \frac{a}{4} x - \frac{b}{4}, & x \geq 0, \\ (A - \frac{a}{8}) e^{2x} + (B + \frac{a}{8}) e^{-2x} + \frac{a}{4} x - \frac{b}{4}, & x \leq 0, \end{cases} \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

(La continuité de y et y' en 0 assure que $y''(0)$ existe et satisfait $y''(0) = 4y(0) + b$.)