Applications linéaires de $\mathbb{K}^p$ dans $\mathbb{K}^n$

Rappels. Notations

- L'ensemble des applications linéaires de $\mathbb{K}^p$ dans $\mathbb{K}^n$ est noté $\mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$.
- Si $n = p$, on note $\mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ au lieu de $\mathcal{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^n)$.
- La base canonique de $\mathbb{K}^p$ est notée $\mathcal{B}_c$.

I VOCABULAIRE

- Une application linéaire est appelée homomorphisme.
- Une application linéaire de $\mathbb{K}^n$ dans lui-même est appelée endomorphisme.
- Un endomorphisme de $\mathbb{K}^n$ de surcroît bijectif est appelé automorphisme.

II MATRICE D'UNE APPLICATION LINÉAIRE : MODE D'EMPLOI

A) DÉFINITION

[Matrice d'une application linéaire] Déf. 1

Notons $\mathcal{B}_c = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_p)$ la base canonique de $\mathbb{K}^p$. Si $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$, la matrice de f sur les bases canoniques $\mathcal{B}_c$ de $\mathbb{K}^p$ et $\mathbb{K}^n$ est la matrice notée $\text{Mat}(f)$ et définie par :

- $\text{Mat}(f) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
- Pour tout entier j , la j -ème colonne de $\text{Mat}(f)$ contient les coordonnées canoniques de $f(\mathbf{e}_j)$.

a. ou la matrice de f tout court.

Rem.1 | Définie ainsi, la matrice d'une application linéaire se lit en **colonnes**.

Exple.1 | Notons $A = \text{Mat}(f)$

A	$f \in$
$f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^4, \mathbb{K}^2)$
$f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^3, \mathbb{K}^4)$
$f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^3)$

Exple.2 | Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$,

A représente une application linéaire de

$\mathcal{L}(\mathbb{K}^3, \mathbb{K}^4)$. En notant $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ la base canonique de $\mathbb{K}^3$, on lit que :

- $f(\mathbf{e}_1) = (1, 1, 1, 1) \in \mathbb{K}^4$
- $f(\mathbf{e}_2) = (2, 0, 2, 1) \in \mathbb{K}^4$
- $f(\mathbf{e}_3) = (3, 1, 2, 1) \in \mathbb{K}^4$

B) CALCUL DE $f(\mathbf{x})$

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$, $A = \text{Mat}(f)$. Soit $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^p$ et $X = \text{Mat}(\mathbf{x})$ (rappel : $X = \mathbf{x}^T$). Alors $\text{Mat}(f(\mathbf{x})) = AX$.

Exple.3 |

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $\mathbf{x} = (1, -1, 2) \in \mathbb{K}^3$.

Alors $X = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$. On obtient $f(\mathbf{x})$

en calculant le produit matriciel AX :
 $AX = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$. Donc $f(\mathbf{x}) = (5, 3, 3, 2)$.

C) LECTURE DE LA MATRICE EN LIGNES

Si $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{K}^p$, pour tout entier $i \in \{1, \dots, n\}$, la i -ème ligne de A donne la i -ème coordonnée de $f(\mathbf{x})$.

Exple.4 | Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ et

$\mathbf{x} = (x, y, z) \in \mathbb{K}^3$, les coordonnées de $f(\mathbf{x})$ sont données par :
 $f(\mathbf{x}) = (\underbrace{x + 2y + 3z}_{\text{ligne 1 de } A}, \dots, \underbrace{x + y + z}_{\text{ligne 4 de } A})$

III IMAGE ET NOYAU. RANG

A) DÉFINITIONS

[Image d'un homomorphisme] Déf. 2

Si $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$, l'image de f est l'ensemble :

$$\text{Im}(f) = \{f(\mathbf{x}) \mid \mathbf{x} \in \mathbb{K}^p\}$$

C'est un sev de $\mathbb{K}^n$.

Rem.2 | C'est un ensemble défini paramétriquement.

[Rang d'une application linéaire] Déf. 3

C'est la dimension de son image.

[Noyau d'un homomorphisme] Déf. 4

Si $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$, le noyau de f est l'ensemble :

$$\text{Ker}(f) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{K}^p \mid f(\mathbf{x}) = 0\}$$

C'est un sev de $\mathbb{K}^p$.

Rem.3 | C'est un ensemble défini par équations.

B) THÉORÈME DU RANG

[Théorème du rang] Thm. 1

Si $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$ alors :
 $p = \dim \text{Im } f + \dim \text{Ker } f$

Rem.4 |

T1> Très utile pour des petites matrices : le rang de f se devine parfois assez facilement, ce qui permet d'en déduire la dimension du noyau de f , et même parfois une base du noyau en combinant judicieusement les colonnes de A .

C) SURJECTIVITÉ ET INJECTIVITÉ ...

[Surjectivité] Déf. 5

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$. On dit que f est surjective si et seulement pour tout second membre $\mathbf{y} \in \mathbb{K}^n$, il existe au moins une solution $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^p$ à l'équation $f(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$.

[Injectivité] Déf. 6

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$. On dit que f est injective si et seulement pour tout second membre $\mathbf{y} \in \mathbb{K}^n$, il existe au plus une solution $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^p$ à l'équation $f(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$.

IV PROPRIÉTÉS DE L'IMAGE ET DU NOYAU. CALCUL

[Propriétés de l'image] Prop.1

Soit $f \in \mathcal{L}(K^p, K^n)$ et A sa matrice.

- a. $\text{Im} f = \text{Vect}(f(e_1), \dots, f(e_p))$.
- b. $\text{Im} f$ est un sev de K^n .
- c. Une famille génératrice de $\text{Im} f$ est donnée par les colonnes de A .
- d. $\dim \text{Im} f = \text{rang}(A)$, ainsi le rang de f et celui de A .
- e. Une base de $\text{Im} f$ s'obtient en extrayant une base des colonnes de A .
- f. Un système d'équations de $\text{Im} f$ est donné par les équations de compatibilité du système :

$$\left(\begin{array}{c|c} A & \begin{matrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{matrix} \end{array} \right)$$

- g. f est surjective si et seulement si $\text{Im} f = K^n$.
- h. f est surjective si et seulement si $\text{rang}(A) = n$.

Exple.5 | Si f a pour matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, alors $f \in \mathcal{L}(K^3, K^2)$.

- Visiblement, le rang r de A est 1 (il y a une ligne non nulle donc $r \geq 1$, et les deux lignes de A sont proportionnelles, donc $r < 2$. Ainsi la dimension de $\text{Im} f$ est 1 (point d.).)
- Comme $\text{Im} f = \text{Vect}(u, u, u)$, où $u = (1, 2)$ (point a.), la famille (u) est une base de $\text{Im} f$ (point e.).)
- Enfin, f n'est pas surjective puisque son rang n'est pas 2 (point h.).)
- Un système d'équations de l'image est donné par les équations de compatibilité du système :

$$\begin{array}{l} \ell_2 \leftarrow \ell_2 - 2\ell_1 \\ \Leftrightarrow \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & x \\ 2 & 2 & 2 & y \\ \hline 1 & 1 & 1 & x \\ 0 & 0 & 0 & y - 2x \end{array} \right)$$

c'est-à-dire (point f.) : $2x - y = 0$.

[existence de surjections linéaires] Cor.1

Si $p < n$ et $f \in \mathcal{L}(K^p, K^n)$ ne peut être surjective.

Rem.5 | En effet, dans ce cas d'après les inégalités sur le rang, $r \leq p$, donc $r < n$.

[Propriétés du noyau] Prop.2

Soit $f \in \mathcal{L}(K^p, K^n)$ et A sa matrice.

- a. Un système d'équations de $\text{Ker} f$ est donné par le système linéaire homogène : $(H) \left(\begin{array}{c|c} & \begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix} \end{array} \right)$
- b. $\text{Ker} f$ est un sev de K^p .
- c. Une base de $\text{Ker} f$ est obtenue en résolvant le système linéaire (H) .
- d. $\dim \text{Ker} f = p - \text{rang}(A)$ (c'est le nombre de variables libres du système (H)).
- e. f est injective si et seulement si $\text{rang}(A) = p$.
- f. f est injective si et seulement si $\text{Ker} f = \{0\}$.

Exple.6 | Si on reprend f dont la matrice est $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

- D'après le théorème du rang (Thm. 1 ou point d.), et le fait que le rang de f est 1, $\text{Ker} f$ est de dimension $3 - 1 = 2$.
- Ainsi f n'est pas injective (point f.).)
- Un système d'équations du noyau est $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x + 2y + 2z = 0 \end{cases}$ (point a.)
- Une base du noyau s'obtient en résolvant ce système (point c.), ou en trouvant deux vecteurs libres du noyau par le point précédent. Or on voit que dans $A : \text{col}1 = \text{col}2$, donc $\text{col}1 - \text{col}2 = 0$, c'est-à-dire $f(e_1) - f(e_2) = 0$, (voir Déf. 1.), soit, par linéarité : $f(e_1 - e_2) = 0$. Ainsi $v = e_1 - e_2 = (1, -1, 0)$ est dans le noyau. De même, en notant que $\text{col}1 = \text{col}3$, $w = (1, 0, -1)$ est dans le noyau. Comme v, w sont non colinéaires, ils forment une base de $\text{Ker} f$.

[existence d'injections linéaires] Cor.2

Si $p > n$ et $f \in \mathcal{L}(K^p, K^n)$ ne peut être injective.

Rem.6 | En effet, dans ce cas d'après les inégalités sur le rang, $r \leq n$, donc $r < p$.

v BIJECTIVITÉ

[Injectivité] Déf.7

Soit $f \in \mathcal{L}(K^p, K^n)$. On dit que f est bijective si et seulement pour tout second membre $y \in K^n$, il existe une unique solution $x \in K^p$ à l'équation $f(x) = y$.

Rem.7 | Cela signifie que f est à la fois injective et surjective.

[Caractérisation de la bijectivité] Thm.2

Soit $f \in \mathcal{L}(K^p, K^n)$.

- a. Si $p \neq n$, f ne peut être bijective.
- b. Si $p = n$ (donc f est un endomorphisme), sont équivalents :
 - 1) f est bijective.
 - 2) f est injective et surjective.
 - 3) f est injective ou surjective.
- c. Si f bijective de matrice A , sa bijection réciproque f^{-1} est aussi linéaire, et a pour matrice A^{-1} : $\text{Mat}(f^{-1}) = (\text{Mat}(f))^{-1}$

VI CHANGEMENT DE BASE POUR LES ENDOMORPHISMES ($n = p$)

A) DÉFINITION

[Matrice d'un endomorphisme sur une autre base] Déf.8

Si $\mathcal{B}' = (\epsilon_1 \dots \epsilon_n)$ est une base de K^n , et f un endomorphisme de K^n , la matrice de f sur la base $\mathcal{B}'$ est la matrice dont la j -ème colonne est la matrice des coordonnées de $f(\epsilon_j)$ sur la base $\mathcal{B}'$.

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = \begin{array}{c} f(\epsilon_1) \dots f(\epsilon_n) \\ \downarrow \quad \downarrow \\ \begin{array}{ccc|c} \epsilon_1 & & & \\ \vdots & & & \\ \epsilon_n & & & \end{array} \end{array} \text{ décomposé sur}$$

Rem.8 | Ainsi le schéma ci-dessus s'applique aussi à la définition Déf.1 avec $\mathcal{B}' = \mathcal{B}_c$ (et donc $\epsilon_j = e_j$)

[Deuxième formule du changement de base] Thm.3

Mêmes notations que dans la définition Déf.8. Soit A la matrice de f , A' la matrice de f sur la base $\mathcal{B}'$, et P la matrice de passage de $\mathcal{B}_c$ à $\mathcal{B}'$. Alors :

$$A' = P^{-1}AP.$$

Rem.9 |

T2> En pratique, on ne calcule pas A' par le produit matriciel ci-dessous, mais essaie de trouver la décomposition des $f(\epsilon_j)$ sur $\epsilon_1 \dots \epsilon_n$ pour obtenir A' .