

## 0. Logique, raisonnements

- Quantificateurs universels, existentiels. Règles d'usage
- Implication, équivalence : règles d'usage. Vocabulaire : CN, CS, CNS, ssi....
- Modes de raisonnement : absurde, contraposition, disjonction de cas.

## I. Généralités sur les fonctions

- Inégalités dans  $\mathbb{R}$ . Résolution d'inéquations. Méthodes pratiques pour prouver une inégalité.
- Les bonnes hypothèses pour appliquer une fonction à une égalité/inégalité :

$$a \leq b \Leftrightarrow f(a) \leq f(b) \quad a = b \Leftrightarrow f(a) = f(b).$$

- Valeur absolue. Inégalité triangulaire.
- Fonctions usuelles du lycée.
- Composition des fonctions: notation  $\circ$ .
- Calcul de limites. Opérations sur les limites Composition des limites.

**Attention.** En ce début d'année rien sur la définition de la limite avec  $\varepsilon$ .  
Limites usuelles du lycée :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$$

- Fonctions monotones. Opérations sur les fonctions monotones.
- Continuité en un point, sur un intervalle. Opérations sur les fonctions continues.
- Dérivabilité en un point, sur un intervalle. Opérations sur les fonctions dérivables (y compris la composition).
- Fonctions de classe  $\mathcal{C}^k$ .
- Plan d'étude d'une fonction
- Bijection, théorème de la bijection monotone, théorème de la dérivabilité réciproque.
- Courbe représentative de  $x \mapsto f(x+a)$ ,  $x \mapsto f(x)+b$ ,  $x \mapsto f(-x)$ ,  $x \mapsto f(ax)$ ,  $x \mapsto af(x)$ .

## Questions de cours (preuve à connaître)

- Inégalité triangulaire.
- Inégalité triangulaire renversée :  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, ||x| - |y|| \leq |x - y|$ .
- Propriété calculatoire de la valeur absolue :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |xy| = |x||y|.$$

- Propriété calculatoire de la valeur absolue :  $\forall x \in \mathbb{R}^*, \forall n \in \mathbb{Z}, |x^n| = |x|^n$ .

## Exercices extraits du TD et exemples du cours

- Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . Écrire à l'aide de quantificateurs :  $f$  est majorée,  $f$  est bornée,  $f$  ne s'annule jamais,  $f$  n'est pas la fonction nulle,  $f$  est croissante,  $f$  ne prend que des valeurs distinctes,  $f$  atteint toutes les valeurs de  $n$ ,  $f$  est inférieure à  $g$ ,  $f$  n'est pas inférieure à  $g$ .
- Montrer par l'absurde que  $\sqrt{2}$  est irrationnel.
- Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Montrer par contraposition que si  $n^2 - 1$  n'est pas divisible par 8 alors  $n$  est pair.
- Montrer par disjonction de cas, que pour tout entier naturel  $n$  l'entier  $n(n+1)(2n+1)$  est un multiple de 3.

- Résoudre l'inéquation (E):  $\sqrt{2-x} \leq \sqrt{x+1}$ .
- Résoudre l'inéquation (E):  $\ln(x+2) \leq \ln(x)+3$ .
- Résoudre (E):  $x = \sqrt{x+2}$ .

- Montrer que:  $\forall x \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R}, x + \sqrt{a^2 + x^2} \geq 0$
- Calculer l'une des limites suivantes:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}, \quad \lim_{x \rightarrow 9} \frac{x\sqrt{x} - 27}{x - 9},$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{3x+2} - \sqrt{2x-4}), \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - x^2 - x - 2}{x^2 - x - 2}$$

- Résoudre (E):  $\ln(x+3) - \ln(x+1) = \ln(2-x)$ .
- Résoudre :  $|2-4x| = |3x-4|$
- Résoudre :  $|3x-4| = |x^2-x+3|$
- Résoudre :  $\sqrt{|x-1|} \leq x-2$
- Résoudre :  $2x = \sqrt{2x^2-3x+2}$
- Résoudre :  $x|x-1| = |x|(x-1)$
- Résoudre :  $|x| + |x+1| + |x+2| \leq 3$ .
- Montrer que  $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, ab \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2)$ .  
En déduire  $\forall (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, ab + ac + bc \leq a^2 + b^2 + c^2$
- Montrer que  $\forall (a, b) \in (\mathbb{R}_+)^2, |\sqrt{a} - \sqrt{b}| \leq \sqrt{|a-b|}$
- Montrer que:  $\forall x \in \mathbb{R}_+, \frac{4+x}{4\sqrt{x}} \geq 1$

- Étudier la continuité en 0 de  $x \mapsto \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 0 \\ \sqrt{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$ .
- Étudier la continuité et la dérivabilité de ces fonctions puis calculer les dérivées de l'une des fonctions d'expression suivante:

$$e^x \sin(2x) \cos^4(3x+1), \quad \sqrt{x^2 - x + 3}, \quad \sqrt{x^2 + x - 6},$$

$$\frac{\sin x}{\cos x + 1}, \quad e^{\sqrt{x+3}}, \quad \ln \left| \frac{x}{2-x} \right|$$

- On définit la fonction  $f$  par  $f(x) = x(1 + \sqrt{|x|})$ . Déterminer l'ensemble de définition, puis étudier la continuité et la dérivabilité sur l'ensemble de définition.
- Etudier la fonction  $f : x \mapsto \ln(|x|)$  et en tracer la courbe représentative.
- Etudier la fonction  $f : x \mapsto \cos x - \cos^2 x$  et en tracer la courbe représentative.
- Etudier la fonction  $f : x \mapsto \frac{2}{e^x - 1}$  et en tracer la courbe représentative.
- Montrer que pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ ,  $\sin x \leq x$ .
- Montrer que pour tout  $x \in \mathbb{R}^+$ ,  $x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1 + x) \leq x$ .
- Montrer l'existence et l'unicité d'une solution réelle à l'équation  $e^x = 2 - x$ . Puis montrer que cette solution appartient à l'intervalle  $[0, 1]$ .
- On pose  $f : x \mapsto \ln(x^2 + 1) + 1$ . Montrer que  $f$  réalise une bijection de  $[0, +\infty[$  vers un intervalle  $J$  à préciser. Puis donner l'expression de la réciproque.