

**Exercice 1.** (♥) Les démonstrations du cours non traitées (ne sera pas corrigé en TD)

Prouver:

1) la formule donnant  $\sum_{k=0}^n k^2$  (par récurrence)

2) la formule donnant  $\sum_{k=0}^n k^3$  (par récurrence et par télescopage)

**Correction -**

1) Posons pour  $n \in \mathbb{N}$  la propriété  $\mathcal{P}(n)$ : " $\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ".

- **Initialisation.** Pour  $n = 0$ ,  $\sum_{k=0}^0 k^2 = 0^2 = 0$  et  $\frac{0(0+1)(2 \times 0 + 1)}{6} = 0$  donc  $\mathcal{P}(0)$  est vraie.

- **Hérédité.** Soit  $n \in \mathbb{N}$ , supposons  $\mathcal{P}(n)$  vraie. Alors au rang  $n + 1$ ,

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} k^2 &= \sum_{k=0}^n k^2 + (n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \quad (\text{HR}) \\ &= \frac{n+1}{6} (2n^2 + n + 6n + 6) = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} \quad \text{donc } \mathcal{P}(n+1) \text{ est vraie.} \end{aligned}$$

- **Conclusion.** Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ .

2) On calcule de deux façons la somme,  $\sum_{k=0}^n ((k+1)^4 - k^4)$ .

- D'une part, pour  $k \in \mathbb{N}$ ,  $(k+1)^4 - k^4 = (k^4 + 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1) - k^4 = 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1$  (on a développé  $(1+k)^4$  à l'aide de la formule du binôme et obtenu les coefficients à l'aide du triangle de Pascal). Donc par linéarité:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n ((k+1)^4 - k^4) &= 4 \sum_{k=0}^n k^3 + 6 \sum_{k=0}^n k^2 + 4 \sum_{k=0}^n k + (n+1) \\ &= 4 \sum_{k=0}^n k^3 + n(n+1)(2n+1) + 2n(n+1) + (n+1) \quad (*) \end{aligned}$$

- D'autre part, par télescopage [*détails laissés au lecteur*],  $\sum_{k=0}^n ((k+1)^4 - k^4) = (n+1)^4 - 0^4 = (n+1)^4 \quad (**)$ .

On rapproche alors (\*) et (\*\*),

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n k^3 &= \frac{1}{4} ((n+1)^4 - n(n+1)(2n+1) - 2n(n+1) - (n+1)) \\ &= \frac{n+1}{4} (n^3 + 3n^2 + 3n + 1 - 2n^2 - n - 2n - 1) \\ &= \frac{n(n+1)}{4} (n^2 + n) \quad \text{Donc } \sum_{k=0}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} \end{aligned}$$

**Exercice 2.** (♥)

3)-c-  $S_n = \sum_{k=1}^n (-1)^k k^2$

4)-d  $S_n = \sum_{k=1}^n k \times k!$

4)-e  $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!}$

**Correction -**

3)-c- On effectue une disjonction de cas selon la parité de  $n$ .

► Si  $n$  est pair, posons  $n = 2N$  où  $N \in \mathbb{N}^*$ . Alors, regroupant les termes selon les  $k$  pairs et impairs, il vient:

$$\begin{aligned}
 S_n &= \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ pair}}}^{2N} k^2 - \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ impair}}}^{2N} k^2 \\
 &= \sum_{p=1}^N 4p^2 - \sum_{p=1}^N (4p^2 - 4p + 1) \quad (k = 2p \text{ et } k = 2p - 1 \text{ dans la première et la deuxième somme respectivement}) \\
 &= \sum_{p=1}^N (4p - 1) \quad (\text{par linéarité}) \\
 &= \frac{3 + (4N - 1)}{2} N \quad (\text{somme des termes d'une suite arithmétique}) \\
 &= (2N + 1)N \\
 &= \frac{n(n + 1)}{2} \text{ en utilisant } N = \frac{n}{2}.
 \end{aligned}$$

► Si  $n$  est impair, posons  $n = 2N + 1$  où  $N \in \mathbb{N}$ . Alors, regroupant les termes selon les  $k$  pairs et impairs, il vient:

$$\begin{aligned}
 S_n &= \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ pair}}}^{2N+1} k^2 - \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ impair}}}^{2N+1} k^2 \\
 &= \sum_{p=1}^N 4p^2 - \sum_{p=1}^{N+1} (4p^2 - 4p + 1) \quad (k = 2p \text{ et } k = 2p - 1 \text{ dans la première et la deuxième somme respectivement}) \\
 &= \sum_{p=1}^N (4p - 1) - (4(N + 1)^2 - 4(N + 1) + 1) \quad (\text{par linéarité}) \\
 &= \frac{3 + (4N - 1)}{2} N - (4N^2 + 4N + 1) \quad (\text{somme des termes d'une suite arithmétique}) \\
 &= -2N^2 - 3N - 1 \\
 &= -(2N + 1)(N + 1) \\
 &= -\frac{n(n + 1)}{2} \text{ en utilisant } N = \frac{n-1}{2}.
 \end{aligned}$$

Donc,  $\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n = (-1)^n \frac{n(n+1)}{2}}$ .

4)-d-  $S_n = \sum_{k=1}^n k \times k! = \sum_{k=1}^n ((k+1) - k) \times k! = \sum_{k=1}^n (k+1)! - \sum_{k=1}^n k!$

On reconnaît alors un télescopage, et donc  $\boxed{S_n = (n+1)! - 1}$ .

4)-e-  $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!} = \sum_{k=1}^n \frac{(k+1) - 1}{(k+1)!} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{(k+1)!}$

On reconnaît alors un télescopage, et donc  $\boxed{S_n = 1 - \frac{1}{(n+1)!}}$ .

**Exercice 3.** ( $\heartsuit$ ) Soit  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ . Montrer que  $\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \frac{n+1}{2n}$ . [On pourra faire apparaître un télescopage...]

**Correction -**

$$\begin{aligned}
 P_n &= \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \prod_{k=2}^n \left(\frac{k^2 - 1}{k^2}\right) = \prod_{k=2}^n \left(\frac{(k-1)(k+1)}{k^2}\right) \\
 &= \frac{\prod_{k=2}^n (k-1) \prod_{k=2}^n (k+1)}{\prod_{k=2}^n k \prod_{k=2}^n k} = \frac{\prod_{k=2}^n (k-1) \prod_{k=2}^n (k+1)}{\prod_{k=2}^n k \prod_{k=2}^n k} \\
 &= \frac{1}{n} \frac{n+1}{2} \quad \boxed{P_n = \frac{n+1}{2n}}.
 \end{aligned}$$

**Exercice 4.** ( $\ast$ ) Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$ .

1) Déterminer les réels  $a$ ,  $b$  et  $c$  tels que pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ ,  $\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1} + \frac{c}{k+2}$ .

2) En déduire la valeur de la somme  $S_n$ .

**Correction -**

1) Soit  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ ,  $k \in \mathbb{N}^*$ ,

$$\begin{aligned} \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1} + \frac{c}{k+2} &= \frac{a(k+1)(k+2) + bk(k+2) + ck(k+1)}{k(k+1)(k+2)} \\ &= \frac{(a+b+c)k^2 + (3a+2b+c)k + 2a}{k(k+1)(k+2)}. \end{aligned}$$

On souhaite l'égalité à  $\frac{1}{k(k+1)(k+2)}$ , on pose le système:

$$\begin{cases} a + b + c = 0 \\ 3a + 2b + c = 0 \\ 2a = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b + c = -\frac{1}{2} \\ 2b + c = -\frac{3}{2} \\ a = \frac{1}{2} \end{cases} \left| \begin{array}{l} -1 \\ 1 \\ -1 \end{array} \right. \begin{array}{l} 2 \\ -1 \end{array}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = -1 \\ c = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

On déduit:

$$\boxed{\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2k} - \frac{1}{k+1} + \frac{1}{2(k+2)}}$$

2) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ ,

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{2k} - \frac{1}{k+1} + \frac{1}{2(k+2)} \right) \quad (\text{d'après 1}) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \right) \quad (\text{linéarité}) \\ &= \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{1}{n+1} \right) - \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2} \right) \quad (\text{téléscopage}) \\ &= \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)} + \frac{1}{2(n+2)} \\ &= \frac{(n+1)(n+2) - 2(n+2) + 2(n+1)}{4(n+1)(n+2)} \end{aligned}$$

$$\boxed{S_n = \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}}$$

**Exercice 7. (\*\*)** Soit  $a \in ]0, 1[$ . Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{a^k}{(1-a^k)(1-a^{k+1})}$  que l'on souhaite calculer. En calculant  $(1-a)S_n$  faire apparaître une somme télescopique.

**Correction -** Soit  $a \in ]0, 1[$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ ,

$$(1-a)S_n = \sum_{k=1}^n \frac{(1-a)a^k}{(1-a^k)(1-a^{k+1})} = \sum_{k=1}^n \frac{a^k - a^{k+1}}{(1-a^k)(1-a^{k+1})}.$$

Notons que,  $\frac{1}{1-a^k} - \frac{1}{1-a^{k+1}} = \frac{a^k - a^{k+1}}{(1-a^k)(1-a^{k+1})}$ . Donc,

$$(1-a)S_n = \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{1-a^k} - \frac{1}{1-a^{k+1}} \right) = \frac{1}{1-a} - \frac{1}{1-a^{n+1}}.$$

Donc, 
$$\boxed{S_n = \frac{1}{(1-a)^2} - \frac{1}{(1-a^{n+1})(1-a)}}$$

**Exercice 10. (♥)** Montrer que pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\sum_{k=1}^n k! \leq (n+1)!$ .

**Correction -** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Pour majorer la somme  $\sum_{k=1}^n k!$ , on majore chaque terme de la somme. Ici, pour tout  $k \in [1, n]$ ,  $k! \leq n!$ . Donc en sommant,

$$\sum_{k=1}^n k! \leq \sum_{k=1}^n n! = n \times n! \leq (n+1)n! = (n+1)! \quad \boxed{\sum_{k=1}^n k! \leq (n+1)!}.$$

**Exercice 11.** (\*) Montrer, par récurrence, que pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\binom{2n}{n} \geq \frac{4^n}{2n+1}$ .

**Correction -** Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $\mathcal{P}(n) : \binom{2n}{n} \geq \frac{4^n}{2n+1}$ .

- **Initialisation.** Pour  $n = 1$ ,  $\binom{2}{1} = 2$  et  $\frac{4^1}{2+1} = \frac{4}{3} < 2$  donc  $\mathcal{P}(1)$  vraie.
- **Hérédité.** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Supposons  $\mathcal{P}(n)$  vraie, alors au rang  $n+1$ ,

$$\binom{2(n+1)}{n+1} = \frac{(2n+2)!}{(n+1)!^2} = \frac{(2n+2)(2n+1)(2n)!}{(n+1)(n+1)n!^2} = \frac{2(2n+1)}{n+1} \binom{2n}{n}.$$

Or par hypothèse de récurrence,  $\binom{2n}{n} \geq \frac{4^n}{2n+1}$ , donc

$$\binom{2(n+1)}{n+1} \geq \frac{2(2n+1)}{n+1} \frac{4^n}{2n+1} = \frac{2 \times 4^n}{n+1} = \frac{4 \times 4^n}{2(n+1)} = \frac{4^{n+1}}{2n+2} \geq \frac{4^{n+1}}{2n+3}.$$

On a donc démontré que  $\mathcal{P}(n+1)$  est vraie.

- **Conclusion.** Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\binom{2n}{n} \geq \frac{4^n}{2n+1}$ .

**Exercice 12** Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Calculer

4) (\*)  $\sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k}$ . En déduire  $\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k}$

**Correction -**

- 4) Soit  $n \in \mathbb{N}$ , posons  $S_n = \sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k}$ . Pour  $n = 0$  et  $n = 1$  la somme vaut 0. Prenons donc  $n \geq 2$ , on remarque que la somme  $S_n$  peut partir de  $k = 2$  car les deux premiers termes (pour  $k = 0$  et  $k = 1$ ) sont nuls. En appliquant deux fois la formule du sélectionneur,

$$S_n = \sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} = n(n-1) \sum_{k=2}^n \binom{n-2}{k-2}.$$

On effectue le changement d'indice  $j = k - 2$ ,

$$S_n = n(n-1) \sum_{j=0}^{n-2} \binom{n-2}{j} = n(n-1) \sum_{j=0}^{n-2} \binom{n-2}{j} 1^j 1^{n-2-j} \quad \boxed{S_n = n(n-1)2^{n-2}}.$$

Puis pour le calcul de  $T_n = \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k}$ , on utilise  $k^2 = k(k-1) + k$  et donc par linéarité puis en reconnaissant  $S_n$  et la somme de 2):

$$T_n = \sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} + \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n(n-1)2^{n-2} + n2^{n-1} \quad \boxed{T_n = n(n+1)2^{n-2}}.$$

**Exercice 14.** (\*) Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $S_n = \sum_{k=0}^n \binom{2n+1}{k}$ .

- 1) En effectuant le changement d'indice  $j = 2n+1 - k$ , déterminer une autre expression de  $S_n$ .
- 2) En déduire la valeur de  $2S_n$ , puis celle de  $S_n$ .

**Correction -** Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $S_n = \sum_{k=0}^n \binom{2n+1}{k}$ .

- 1) En effectuant le changement d'indice  $j = 2n+1 - k$ , on obtient:

$$S_n = \sum_{j=n+1}^{2n+1} \binom{2n+1}{2n+1-j} = \sum_{j=n+1}^{2n+1} \binom{2n+1}{j} \quad (\text{formule de symétrie}).$$

Et donc:

$$S_n = \sum_{j=0}^{2n+1} \binom{2n+1}{j} - \sum_{j=0}^n \binom{2n+1}{j} = 2^{2n+1} - S_n.$$

2) D'où  $2S_n = 2^{2n+1}$  c'est-à-dire  $S_n = 2^{2n}$ .

**Exercice 15.** (\*\*) Soient  $n, p, q$  des entiers naturels tels que  $n \leq p + q$ .

En développant de deux manières différentes  $(1+x)^p(1+x)^q$  calculer la somme :  $S_n(p, q) = \sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k}$ .

Rappel : l'égalité de deux fonctions polynomiales entraîne l'égalité des coefficients.

**Correction** - Soit  $x \in \mathbb{R}$ . On détermine le coefficient devant  $x^n$  dans  $(1+x)^p(1+x)^q$ . D'une part,

$$(1+x)^p(1+x)^q = (1+x)^{p+q} = \sum_{k=0}^{p+q} \binom{p+q}{k} x^k.$$

Le coefficient devant  $x^n$  est  $\binom{p+q}{n}$ .

D'autre part,

$$(1+x)^p(1+x)^q = \left( \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} x^k \right) \left( \sum_{k=0}^q \binom{q}{k} x^k \right).$$

Les termes de degré  $n$  de ce produit sont obtenus en multipliant  $x^k$  dans la première somme par  $x^{n-k}$  dans la deuxième somme avec  $0 \leq k \leq n$ , les coefficients obtenus sont  $\binom{p}{k} \binom{q}{n-k}$ , avec  $0 \leq k \leq n$ . On somme tous ces coefficients pour obtenir le coefficient devant  $x^n$ ,

soit  $\sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k}$ . On identifie alors les coefficients obtenus dans chacun de ces calculs,  $\binom{p+q}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k}$ .

**Exercice 16.** (\*\*) Soient  $k, p$  et  $n$  entiers naturels vérifiant  $p \leq k \leq n$ .

1) Montrer que  $\binom{n-p}{k-p} \binom{n}{p} = \binom{n}{k} \binom{k}{p}$ .

2) En déduire la valeur des sommes:

$$S = \sum_{p=0}^k \binom{n-p}{k-p} \binom{n}{p} \quad T = \sum_{k=p}^n (-1)^k \binom{n}{k} \binom{k}{p}.$$

**Correction** - Soient  $k, p$  et  $n$  entiers naturels vérifiant  $p \leq k \leq n$ .

1) Pour montrer  $\binom{n-p}{k-p} \binom{n}{p} = \binom{n}{k} \binom{k}{p}$ , il suffit de revenir à la définition des coefficients binomiaux à l'aide de factorielles [...l'écrire...]

2) On déduit

$$S = \sum_{p=0}^k \binom{n-p}{k-p} \binom{n}{p} = \sum_{p=0}^k \binom{n}{k} \binom{k}{p} = \binom{n}{k} \sum_{p=0}^k \binom{k}{p} \quad \boxed{S = \binom{n}{k} 2^k}.$$

$$T = \sum_{k=p}^n (-1)^k \binom{n}{k} \binom{k}{p} = \sum_{k=p}^n (-1)^k \binom{n-p}{k-p} \binom{n}{p} = \binom{n}{p} \sum_{k=p}^n (-1)^k \binom{n-p}{k-p}.$$

On effectue le changement d'indice  $j = k - p$ ,

$$T = \binom{n}{p} \sum_{j=0}^{n-p} (-1)^{j+p} \binom{n-p}{j} = (-1)^p \binom{n}{p} \sum_{j=0}^{n-p} \binom{n-p}{j} (-1)^j 1^{n-p-j} = (-1)^p \binom{n}{p} (1-1)^{n-p}.$$

Donc  $T = \begin{cases} (-1)^p \binom{n}{p} = (-1)^n & \text{si } n = p \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ .

## Sommes doubles

**Exercice 17.** (♡) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Calculer les sommes:

1)  $\sum_{1 \leq i, j \leq n} i$

3)  $\sum_{1 \leq i, j \leq n} (i+1)^2$

5)  $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} (ij)$

2)  $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} i$

4)  $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} (i+j)$

6)  $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j}$

**Correction -**

- 1)  $\frac{n^2(n+1)}{2}$                       3)  $\frac{n^2(2n^2+9n+13)}{6}$                       5)  $\frac{n(n+1)(n+2)(3n+1)}{24}$   
 2)  $\frac{n(n+1)(n+2)}{6}$                       4)  $\frac{n(n+1)^2}{2}$                       6)  $\frac{n(n+3)}{4}$

**Exercice 18.** (\*) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Calculer les sommes:

- 1)  $\sum_{1 \leq i, j \leq n} \max(i, j)$                       2)  $\sum_{0 \leq i, j \leq n} \binom{i}{j}$

**Correction -**

1) On pose  $S_n = \sum_{1 \leq i, j \leq n} \max(i, j)$ . L'objectif étant de remplacer  $\max(i, j)$  par  $i$  ou  $j$  selon que  $i \leq j$  ou  $i > j$ , cela nous amène à découper cette somme sur un rectangle en une somme sur deux triangles,

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} j + \sum_{1 \leq j < i \leq n} i \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j j + \sum_{i=2}^n \sum_{j=1}^{i-1} i \\ &= \sum_{j=1}^n j^2 + \sum_{i=2}^n (i^2 - i) \text{ on peut faire partir cette dernière somme de 1 car le terme obtenu est nul} \\ &= 2 \sum_{j=1}^n j^2 - \sum_{i=1}^n i \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{3} - \frac{n(n+1)}{2} \quad \boxed{S_n = \frac{n(n+1)(4n-1)}{6}} \end{aligned}$$

**Autre méthode :** on peut ruser davantage pour ne pas avoir à gérer la somme sur le triangle où  $i > j$ . On considère les deux sommes sur les triangles où  $i \leq j$  et  $i \geq j$ , on compte alors deux fois les termes où  $i = j$ , que l'on retranche, on trouve donc:

$$S_n = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} j + \sum_{1 \leq j \leq i \leq n} i - \sum_{i=1}^n i.$$

On constate alors que les deux premières sommes sont égales car  $i$  et  $j$  jouent des rôles symétriques, donc

$$S_n = 2 \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} j - \sum_{i=1}^n i = 2 \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j j - \frac{n(n+1)}{2} = 2 \sum_{j=1}^n j^2 - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{3} - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(4n-1)}{6}.$$

2) On pose  $S_n = \sum_{0 \leq i, j \leq n} \binom{i}{j}$ . Dans cette somme on peut restreindre  $j \leq i$  car dans le cas contraire le coefficient  $\binom{i}{j}$  est nul. Alors

$$S_n = \sum_{j=0}^n \left( \sum_{i=0}^j \binom{i}{j} \right) = \sum_{j=0}^n 2^j = \frac{1-2^{n+1}}{1-2} \text{ (somme des termes d'une suite géométrique de raison 2 et de premier terme 1).}$$

Donc  $\boxed{S_n = 2^{n+1} - 1}$ .

**Systèmes**

**Correction -** de l'exercice 20 On donne les ensembles-solutions.

- 1)  $(S_1)$ :  $\{(1, 2, 3)\}$                       4)  $(S_4)$ :  $\{(1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1)\}$   
 2)  $(S_2)$ :  $\emptyset$                       5)  $(S_5)$ :  $\{(x, y, 1 - 3x - 4y, 1) / (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$   
 3)  $(S_3)$ :  $\{(x, 1, -x) / x \in \mathbb{R}\}$                       6)  $(S_6)$ :  $\{(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, z, \frac{1}{3} - z) / z \in \mathbb{R}\}$

**Correction -** de l'exercice 21 On donne les ensembles-solutions en distinguant les cas pour  $m$ .

- 1) Si  $m \neq 2$ :  $\emptyset$ .  
 Si  $m = 2$ ,  $\{(4 - 11z, -1 + 7z, z) / z \in \mathbb{R}\}$   
 2) Si  $m = 1$ :  $\{(1 - y, y) / y \in \mathbb{R}\}$ .  
 Si  $m = -1$ :  $\emptyset$   
 Sinon:  $\{(\frac{1}{1+m}, \frac{1}{1+m})\}$ .  
 3) Si  $m = -1$ :  $\{(\frac{1}{2}, y, \frac{3}{2} - y) / y \in \mathbb{R}\}$ .  
 Si  $m = 3$ :  $\emptyset$   
 Sinon:  $\{(\frac{m-1}{m-3}, \frac{1}{3-m}, \frac{m-4}{m-3})\}$ .  
 4) Si  $m = 1$ :  $\emptyset$  Si  $m = -3$ :  $\{(t - \frac{1}{2}, t, t - \frac{1}{2}, t) / t \in \mathbb{R}\}$   
 Sinon:  $\{(\frac{1}{m-1}, -\frac{1}{m-1}, \frac{1}{m-1}, -\frac{1}{m-1})\}$ .