Correction du DM n° 3

Le 04/10/23

1. La fonction $x \mapsto -\frac{1}{x^2}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$, la fonction $\exp$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, donc par composition, f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$.

En particulier f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$. Comme

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

On en déduit par composition que

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$$

Donc f est continue en 0. Ainsi f est bien continue sur $\mathbb{R}$.

2. On calcule le taux d'accroissement de f en 0. Pour $x \neq 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{e^{-1/x^2}}{x}$$

On pose $u = 1/x^2$, alors $\frac{e^{-1/x^2}}{x} = \frac{\pm\sqrt{u}}{e^u}$. Par croissances comparées, on montre que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{\pm\sqrt{u}}{e^u} = 0$$

Donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

3. Comme f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$, en particulier f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$.

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad f'(x) = \frac{2}{x^3} f(x)$$

On gardant le changement $u = 1/x^2$

$$-\frac{2}{x^3} e^{-1/x^2} = \frac{\pm 2u^{3/2}}{e^u}$$

Par croissances comparées, on montre alors que

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{\pm u^{3/2}}{e^u} = 0 = f'(0)$$

Donc f' est continue en 0 et f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

4. Comme pour tout $x \in \mathbb{R}_+$ $f(x) \geq 0$, alors $f'(x) \geq 0$ et ne s'annule qu'en 0. Donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$. Comme elle est continue, le théorème de la bijection nous assure alors que f réalise une bijection de $\mathbb{R}_+$ dans $f(\mathbb{R}_+)$.

Comme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = e^0 = 1$$

f réalise une bijection de $\mathbb{R}_+$ dans $[0, 1[$.

5. Nous venons de calculer la limite en $+\infty$. La limite en $-\infty$ donne également

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = e^0 = 1$$

On obtient le tableau suivant :

x	$-\infty$	0	$+\infty$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$
f	1	0	1	

La tangente en 0 a pour équation

$$y = f'(0)x + f(0) = 0$$

On tape dans Python

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 def f(x):
5     if x==0:
6         return(0)
7     else:
8         return(np.exp(-1/(x**2)))
9
10 f1=np.vectorize(f)
11 x=np.linspace(-10,10,10000)
12 y=f1(x)
13 plt.plot(x,y,label='f')
14 plt.legend()
15 plt.grid()
16 plt.show()

```

On obtient la représentation graphique suivante :

6. Comme f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$, g est en particulier de classe $\mathcal{C}^2$ sur $]0, 1]$ et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$.

$$\forall x \neq 0, \quad g'(x) = f'(x) - 1 \quad g''(x) = f''(x) = -\frac{6}{x^4}e^{-1/x^2} + \frac{4}{x^6}e^{-1/x^2} = \frac{4 - 6x^2}{x^4}e^{-1/x^2}$$

$$\frac{g'(x) - g'(0)}{x} = \frac{\frac{2}{x^3}e^{-1/x^2} - 1 - (-1)}{x} = \frac{2e^{-1/x^2}}{x^4}$$

Le même changement de variable que précédemment montre que, par croissances comparées, $g''(0)$ existe et vaut 0, et que

$$\lim_{x \rightarrow 0} -\frac{6}{x^4}e^{-1/x^2} + \frac{4}{x^6}e^{-1/x^2} = 0 = g''(0)$$

On montre ainsi que g est de classe $\mathcal{C}^2$ en 0 et donc g est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[0, 1]$.

7. Sur l'intervalle $[0, 1]$, l'expression $g''(x)$ est du signe de $4 - 6x^2$, à avoir négative sur $\left[\sqrt{\frac{2}{3}}; 1\right]$, positive sur $\left[0; \sqrt{\frac{2}{3}}\right]$.

Dès lors, la fonction g' est croissante $\left[0; \sqrt{\frac{2}{3}}\right]$ et décroissante sur $\left[\sqrt{\frac{2}{3}}; 1\right]$. Or d'après l'énoncé, $f' \left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right) \simeq 0.82$, en particulier $g' \left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right) < 0$, donc g' est négative sur $[0, 1]$, et g est décroissante. Comme $g(0) = 0$, la fonction g est également négative sur $[0, 1]$.

8. `import numpy as np`

```
def suite(n):
    u=3
    for k in range(n):
        u=np.exp(-1/(u**2))
    return(u)
```

9. On raisonne par récurrence.

Initialisation :

Pour $n = 1$, on a $u_1 = f(3) = e^{-1/3}$, donc $u_1 \in]0, 1[$.

Hérédité :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose que $u_n \in]0, 1[$. Montrons que $u_{n+1} \in]0, 1[$.

En partant de l'hypothèse de récurrence et en appliquant la fonction stricte croissance de f , on trouve

$$f(0) < u_{n+1} < f(1)$$

soit

$$0 < u_{n+1} < e^{-1}$$

donc $u_{n+1} \in]0, 1[$.

Hérédité :

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n \in]0, 1[$.

10. Comme, d'après la question 7, on a pour tout $x \in [0, 1]$, $g(x)$ négative, et que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n \in]0, 1[$, on peut remplacer x par u_n , et obtenir, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$g(u_n) \leq 0 \Leftrightarrow f(u_n) \leq u_n \Leftrightarrow u_{n+1} \leq u_n$$

et comme $u_1 \leq u_0$, on a bien $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ décroissante.

Comme elle est minorée, le théorème de la limite monotone nous assure qu'elle converge vers un réel $\ell \in [0, 1]$.

Comme la fonction f est continue sur $[0, 1]$, le théorème du point fixe renvoie que ℓ est solution de l'équation $f(x) = x$, ou encore $g(x) = 0$. Donc d'après la question 7,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

11. La fonction h_n est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}_+$, et comme pour tout $x > 0$, $h_n(x) = xe^{-n/x}$:

$$h'_n(x) = \left(1 + \frac{n}{x^2}\right) e^{-n/x} \quad h'_n(0) = 0$$

La fonction h_n est donc strictement croissante et continue sur $\mathbb{R}_+$, à valeurs dans $[0; +\infty[$ ($\lim_{x \rightarrow +\infty} h_n(x) = +\infty$).

Comme $1 \in f(\mathbb{R}_+)$, le théorème de la bijection nous dit qu'il existe un $\alpha_n \in \mathbb{R}_+$, tel que $h_n(\alpha_n) = 1$.

12. Comme $h_n(1) = e^{-n} < 1$, c'est à dire $h_n(1) < h_n(\alpha_n)$, la stricte croissance de h_n nous assure que $\alpha_n > 1$.
Par ailleurs,

$$h_n(\alpha_n) = 1 \Leftrightarrow \alpha_n e^{-n\alpha_n} = 1 \Leftrightarrow \ln(\alpha_n) - \frac{n}{\alpha_n} = 0 \Leftrightarrow \alpha_n \ln(\alpha_n) = n$$

13. La fonction $\varphi : x \mapsto x \ln(x)$, de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[1; +\infty[$ comme produit de fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[1; +\infty[$.
Pour tout $x \geq 1$

$$\varphi'(x) = 1 + \ln(x) > 0$$

, donc φ est strictement croissante sur $[1; +\infty[$ donc d'après le théorème de la bijection, elle est bijective de $[1; +\infty[$ dans $\mathbb{R}_+$.

De plus, comme vu précédemment

$$\alpha_n \ln(\alpha_n) = n \quad \text{ou encore } \alpha_n \varphi^{-1}(n)$$

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi^{-1}(n) = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = +\infty$.

14. On applique la fonction $\ln$ à l'expression trouvée à la question 12 :

$$\ln(\alpha_n) + \ln(\ln(\alpha_n)) = \ln(n)$$

On en déduit que

$$\frac{\ln(\alpha_n)}{\ln(n)} = 1 - \frac{\ln(\ln(\alpha_n))}{\ln(n)}$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\alpha_n)}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\alpha_n} = 0$, donc $\ln(\alpha_n) = o(n)$. De plus $\ln(x) = o(x)$ par croissances comparées, et comme α_n tend vers $+\infty$,

$$\ln(\ln(\alpha_n)) = o(\ln(\alpha_n))$$

ou encore

$$\ln(\ln(\alpha_n)) = o(n)$$

Donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\alpha_n)}{\ln(n)} = 1.$$

15. On en déduit que $\ln(\alpha_n) \underset{+\infty}{\sim} \ln(n)$, et comme $\alpha = \frac{n}{\ln(\alpha_n)}$, $\alpha_n \underset{+\infty}{\sim} \frac{n}{\ln(n)}$.