HEC 2013 - Corrigé - Non relu

Exercice

1. (a) $\dim E = 4$.

(b) • Soit $P, Q \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$f(\lambda P + Q) = -3X(\lambda P + Q) + X^2(\lambda P + Q)' = \lambda(-3XP + X^2P') + (-3XQ + X^2Q') = \lambda f(P) + f(Q),$$

donc f est linéaire.

• Soit $P = aX^3 + bX^2 + cX + d \in E$. Alors

$$f(P) = -3X(aX^3 + bX^2 + cX + d) + X^2(3aX^2 + 2bX + c) = -bX^3 - 2cX^2 - 3dX \in E,$$

donc f est bien un endomorphisme de E .

(c) On a $f(1) = -3X$, $f(X) = -2X^2$, $f(X^2) = -X^3$ et $f(X^3) = 0$, donc

$$M = \text{Mat}_{(1, X, X^2, X^3)}(f) = \text{Mat}_{(1, X, X^2, X^3)}(f(1), f(X), f(X^2), f(X^3)) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(d) • M est triangulaire inférieure avec des zéros sur la diagonale, donc non-inversible.

• Comme M est triangulaire, ses valeurs propres se lisent sur sa diagonale, donc $\text{Sp}(M) = \{0\}$.

Si M était diagonalisable, il existerait alors P inversible telle que $M = P \cdot (0I) \cdot P^{-1} = 0 \dots$ Or $M \neq 0$, donc M n'est pas diagonalisable.

• On a

$$M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 12 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad M^4 = 0,$$

et, par suite, pour tout $n \geq 4$, $M^n = M^4 M^{n-4} = 0 M^{n-4} = 0$.

(e) $aX^3 + bX^2 + cX + d \in \text{Ker } f \Leftrightarrow f(aX^3 + bX^2 + cX + d) = 0 \Leftrightarrow -bX^3 - 2cX^2 - 3dX = 0 \Leftrightarrow b = c = d = 0$, donc $\text{Ker } f = \{aX^3, a \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}(X^3)$.

La famille (X^3) est libre (un seul polynôme, non nul) et génératrice de $\text{ker } f$, donc c'est une base de $\text{ker } f$, qui est donc de dimension 1.

(f) $\text{Im } f = \text{Vect}(f(1), f(X), f(X^2), f(X^3)) = \text{Vect}(-3X, -2X^2, -X^3, 0) = \text{Vect}(X, X^2, X^3)$.

2. (a) Soit $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ tels que $aP + bu(P) + cu^2(P) + du^3(P) = 0$. (*)

Alors, en composant (*) par u^3 , on obtient $au^3(P) + bu^4(P) + cu^5(P) + du^6(P) = 0$, c'est-à-dire $au^3(P) = 0$ (car $u^4 = 0$), et donc $a = 0$ (car $u^3(P) \neq 0$).

Puis, en composant (*) cette fois par u^2 , on obtient $bu^3(P) + cu^4(P) + du^5(P) = 0$, c'est-à-dire $bu^3(P) = 0$ et donc $b = 0$.

Ensuite, en composant (*) cette fois par u , on obtient $cu^3(P) + du^4(P) = 0$, c'est-à-dire $cu^3(P) = 0$ et donc $c = 0$.

Enfin, (*) est devenue $du^3(P) = 0$, et on a donc aussi $d = 0$.

La famille $(P, u(P), u^2(P), u^3(P))$ est donc libre, et, comme elle est composée de 4 éléments dans un espace, E , de dimension 4, c'est une base de E .

(b) • On a $g(P) = P + u(P) + u^2(P) + u^3(P)$, $g(u(P)) = u(P) + u^2(P) + u^3(P)$, $g(u^2(P)) = u^2(P) + u^3(P)$ et $g(u^3(P)) = u^3(P)$, donc

$$T = \text{Mat}_{(P, u(P), u^2(P), u^3(P))}(g) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Comme T est triangulaire inférieure sans zéro sur la diagonale, T est inversible, donc g est bijectif et, par suite, g est bien un automorphisme de E .

• Via Gauss-Jordan (calculs sur la copie) ou en voyant T comme une matrice de changement de base, on obtient

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \text{Id} - \text{Mat}_{(P, u(P), u^2(P), u^3(P))}(u),$$

donc $g^{-1} = Id - u$.

Rq : on aurait pu procéder complètement autrement en remarquant que

$$g \circ (Id - u) = (Id + u + u^2 + u^3) \circ (Id - u) = Id + u + u^2 + u^3 - (u + u^2 + u^3 + u^4) = Id - u^4 = Id,$$

et donc directement que g est bijectif et $g^{-1} = Id - u$.

- (c) Pour tout $Q \in \ker u$, on a $u(Q) = 0$, donc $(g - Id)(Q) = u(Q) + u^2(Q) + u^3(Q) = 0$, donc $Q \in \ker(g - Id)$.
Par suite, on a $\ker u \subset \ker(g - Id)$.

De plus, comme $Mat_{(P,u(P),u^2(P),u^3(P))}(g - Id) = T - I$ est de rang 3, $g - Id$ est de rang 3, donc d'après le théorème du rang, $\dim(\ker(g - Id)) = 4 - rg(g - Id) = 1$.

De même, comme $Mat_{(P,u(P),u^2(P),u^3(P))}(u) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ est de rang 3, u est de rang 3, donc d'après le

théorème du rang, $\dim(\ker u) = 4 - rg(u) = 1$.

Par suite, on a $\dim(\ker u) = \dim(\ker(g - Id))$ (et $\ker u \subset \ker(g - Id)$), donc

$$\ker u = \ker(g - Id).$$

- (d) Comme $T = Mat_{(P,u(P),u^2(P),u^3(P))}(g)$ est triangulaire, ses valeurs propres se lisent sur sa diagonale, donc $Sp(g) = \{1\}$.

Problème

Partie I. Prix d'équilibre

1. (a) $D(p) = O(p) \Leftrightarrow 40 - 8p = 2p + 20 \Leftrightarrow p = 2$, donc il existe un unique prix d'équilibre $p^* = 2$.
(b) Pour tout $n \geq 2$,

$$\begin{aligned} D_n = O_n &\Leftrightarrow 40 - 8p_n = 2\hat{p}_n + 20 \Leftrightarrow 40 - 8p_n = 4p_{n-1} - 2p_{n-2} + 20 \\ &\Leftrightarrow 8p_n = 20 - 4p_{n-1} + 2p_{n-2} \Leftrightarrow p_n = -\frac{1}{2}p_{n-1} + \frac{1}{4}p_{n-2} + \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

- (c) fonction p (p0,p1:real ; n:integer) : real
begin
if n=0 then p:=p0
else if n=1 then p:=p1
else p:= -p(p0,p1,n-1)/2+p(p0,p1,n-2)/4+5/2;
end;

- (d) Pour tout $n \geq 2$,

$$\begin{aligned} v_n = p_n - p^* &= -\frac{1}{2}p_{n-1} + \frac{1}{4}p_{n-2} + \frac{5}{2} - 2 \\ &= -\frac{1}{2}(p_{n-1} - 2) + \frac{1}{4}(p_{n-2} - 2) - 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}v_{n-1} + \frac{1}{4}v_{n-2}, \end{aligned}$$

donc (v_n) est bien une suite récurrente linéaire d'ordre 2.

- (e) Son équation caractéristique est $r^2 + \frac{1}{2}r - \frac{1}{4} = 0$.

$\Delta = \frac{1}{4} + 1 = \frac{5}{4} > 0$, donc elle admet deux racines

$$r_1 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{4} \quad \text{et} \quad r_2 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{4}.$$

- (f) D'où il existe α et $\beta \in \mathbb{R}$ tels que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_n = \alpha r_1^n + \beta r_2^n \Leftrightarrow p_n = \alpha r_1^n + \beta r_2^n + 2.$$

En identifiant pour $n = 0$ et $n = 1$, on obtient :

$$\begin{cases} \alpha + \beta + 2 = p_0 \\ \alpha r_1 + \beta r_2 + 2 = p_1 \end{cases} \Leftrightarrow_{L_2 \leftarrow L_2 - r_1 L_1} \begin{cases} \alpha + \beta + 2 = p_0 \\ (r_2 - r_1)\beta = p_1 - 2 - r_1 p_0 + 2r_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{p_1 - 2 - r_2 p_0 + 2r_2}{r_2 - r_1} \\ \beta = \frac{p_1 - 2 - r_1 p_0 + 2r_1}{r_2 - r_1} \end{cases}$$

D'où
$$p_n = \frac{p_1 - 2 - r_2 p_0 + 2r_2}{r_1 - r_2} r_1^n + \frac{p_1 - 2 - r_1 p_0 + 2r_1}{r_2 - r_1} r_2^n + 2.$$

- (g) Comme $|r_1| < 1$ et $|r_2| < 1$, on a $\lim r_1^n = \lim r_2^n = 0$ et, par suite, $\lim p_n = 2 = p^*$.
 Dans ces hypothèses, le prix pratiqué tend vers le prix d'équilibre.

2. (a) On a

$$D_n = O_n \Leftrightarrow a - bp_n = cp_n + d \Leftrightarrow p_n = \frac{a - cp_n - d}{b}$$

$$\text{et } \hat{p}_n = \frac{a - bp_n - d}{c}.$$

(b) En utilisant la formule donnée pour $\hat{p}_n$, on obtient :

$$\begin{aligned} p_n = \frac{a - c\hat{p}_n - d}{b} &\Leftrightarrow p_n = \frac{a - cp_{n-1} - c\beta p_{n-1} + c\beta p_{n-1} - d}{b} \\ &\Leftrightarrow p_n = \frac{cp_{n-1}}{b}(\beta - 1) - \frac{c\beta}{b}p_{n-1} + \frac{a-d}{b} \\ &\Leftrightarrow p_n = \frac{c}{b} \frac{a - bp_{n-1} - d}{c}(\beta - 1) - \frac{c\beta}{b}p_{n-1} + \frac{a-d}{b} \\ &\Leftrightarrow p_n = \left(1 - \beta \frac{b+c}{b}\right) p_{n-1} + \beta \frac{a-d}{b}. \end{aligned}$$

(c) • $D(p) = O(p) \Leftrightarrow a - bp = cp + d \Leftrightarrow p = \frac{a-d}{b+c}$.

Le prix d'équilibre est donc $p^* = \frac{a-d}{b+c}$.

• La suite (p_n) est une suite arithmético-géométrique.

Cherchons c tel que $c = \left(1 - \beta \frac{b+c}{b}\right) c + \beta \frac{a-d}{b} \Leftrightarrow c = \frac{a-d}{a+c} = p^*$.

Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$p_n - c = \left(1 - \beta \frac{b+c}{b}\right) p_{n-1} + \beta \frac{a-d}{b} - \left(\left(1 - \beta \frac{b+c}{b}\right) c + \beta \frac{a-d}{b}\right) = \left(1 - \beta \frac{b+c}{b}\right) (p_{n-1} - c),$$

donc la suite $(p_n - c)$ est une suite géométrique de premier terme $p_0 - c$ et de raison $\left(1 - \beta \frac{b+c}{b}\right)$.

Par suite, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $p_n - c = \left(1 - \beta \frac{b+c}{b}\right)^n (p_0 - c)$, et donc

$$p_n = \left(1 - \beta \frac{b+c}{b}\right)^n (p_0 - p^*) + p^*.$$

(d) • Si $p_0 \neq p^*$, il est clair que la suite $(p_n)_n$ converge si et seulement si la suite $\left(\left(1 - \beta \frac{b+c}{b}\right)^n\right)_n$ converge.

Or, cette suite est géométrique de raison $\left(1 - \beta \frac{b+c}{b}\right)$. Elle converge donc si et seulement si $1 - \beta \frac{b+c}{b} \in]-1, 1[$.

Or, comme β, b et c sont strictement positifs, on a toujours $1 - \beta \frac{b+c}{b} < 1$. Enfin, $1 - \beta \frac{b+c}{b} > -1 \Leftrightarrow \beta \frac{b+c}{b} < 2$

$\Leftrightarrow 1 + \frac{c}{b} < \frac{2}{\beta} \Leftrightarrow \frac{c}{b} < \frac{2}{\beta} - 1$. cqfd.

• Dans ce cas, on a $\lim p_n = p^*$.

(e) Si $c < b$, alors on a $\frac{c}{b} < 1$ et, comme $\beta \in]0, 1[$, on a $\frac{2}{\beta} - 1 \geq 1$.

Donc, si $c < b$, on a $\frac{c}{b} < \frac{2}{\beta} - 1$, ce qui assure que (p_n) converge vers p^* .

Partie II. Convexité du profit et prix aléatoire

3. (a) h_p est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ par opérations sur les fonctions usuelles et, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$,

$$h'_p(x) = p - x^2 > 0 \Leftrightarrow x^2 < p \Leftrightarrow x < \sqrt{p} \quad (\text{car } x \geq 0).$$

D'où

x	0	$\sqrt{p}$	$+\infty$
$h'_p(x)$	+	0	-
$h_p(x)$	0	$\frac{2p\sqrt{p}}{3}$	$-\infty$

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} h_p(x) = -\infty$ (par croissances comparées).

$$h_p(x) = 0 \Leftrightarrow x \left(p - \frac{x^2}{3} \right) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = \sqrt{3p} \quad (\text{car } x \geq 0).$$

D'après le tableau de variations de h_p , la valeur maximale de h_p sur $\mathbb{R}_+$ est $\frac{2p\sqrt{p}}{3}$.

- (b) Comme $h_1'(0) = 1$ et $h_1(0) = 0$, on a une demi-tangente en 0 d'équation $y = x$.
Comme $h_1''(x) = -2x \leq 0$, h_1 est concave sur $\mathbb{R}_+$.
On a donc :

4. (a) • Supposons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} F'(x) \neq +\infty$.

Alors, comme F' est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, F' est bornée sur $\mathbb{R}_+$, donc il existe M tel que, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $F'(x) \leq M$.

Par suite, par positivité de l'intégrale, pour tout $x \geq 0$,

$$F(x) - F(0) = \int_0^x F'(t) dt \leq \int_0^x M dt = Mx, \quad \text{et donc} \quad F(x) \leq Mx + F(0).$$

En divisant pour $x > 0$ par $sx^r > 0$, on obtient :

$$\underbrace{\frac{F(x)}{sx^r}}_{\xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1 \text{ (car } F(x) \sim sx^r)} \leq \underbrace{\frac{Mx + F(0)}{sx^r}}_{\sim \frac{M}{sx^{r-1}} \rightarrow 0 \text{ (car } r > 1)},$$

ce qui est donc impossible.

D'où, par l'absurde, on a bien $\lim_{x \rightarrow +\infty} F'(x) = +\infty$.

• F' est strictement croissante (énoncé) et continue (car F est C^2) sur $\mathbb{R}_+$, donc elle réalise une bijection de $\mathbb{R}_+$ sur $[F'(0), \lim_{x \rightarrow +\infty} F'(x)[= \mathbb{R}_+$.

Elle admet donc une bijection réciproque, notée S et $D_S = \mathbb{R}_+$.

- (b) • Π_p est de classe C^2 sur $\mathbb{R}_+$ par opérations sur les fonctions de classe C^2 et, pour tout $x \geq 0$,

$$\Pi_p'(x) = p - F'(x) \quad \text{et} \quad \Pi_p''(x) = -F''(x) < 0.$$

Par suite, Π_p est concave sur $\mathbb{R}_+$.

• De plus, $\Pi_p'(x) > 0 \Leftrightarrow F'(x) < p \Leftrightarrow x > S(p)$ (car S est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+$ comme bijection réciproque d'une fonction décroissante).

On a donc :

x	0	$S(p)$	$+\infty$
$\Pi_p'(x)$	+	0	-
$\Pi_p(x)$	0	$\nearrow$ $\Pi_p(S(p))$ $\searrow$	$-\infty$

Par croissances comparées, on a $\Pi_p(x) = px - \underbrace{F(x)}_{\sim sx^r} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$.

D'après le tableau de variations, Π_p admet donc bien un unique maximum sur $\mathbb{R}_+$, atteint en $S(p)$.

5. (a) D'après la question précédente, on a $M(p) = \Pi_p(S(p)) = pS(p) - F(S(p))$.

- (b) Comme $F''(x) > 0$ sur son ensemble de définition, $S = F'^{-1}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et, pour tout $x \geq 0$,

$$S'(x) = \frac{1}{F''(S(x))}.$$

Par suite, M est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ par opérations sur les fonctions dérivables et, pour tout $x \geq 0$,

$$M'(x) = S(x) + xS'(x) - S'(x)F'(S(x)) = S(x) + xS'(x) - S'(x)x = S(x)$$

car S est la bijection réciproque de F' et donc $F'(S(x)) = x$.

(c) Comme $M' = S$, où S est strictement croissante comme bijection réciproque d'une fonction strictement croissante, M est convexe.

De plus, comme $S(x) > 0$ pour tout $x > 0$, M' est strictement positive sur $\mathbb{R}_+$ sauf éventuellement en 0, donc M est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$.

6. (a) Soit $y \in \mathbb{R}_+$.

L'équation de la tangente à C_M au point d'abscisse y est $z = M'(y)(x - y) + M(y)$.

Or M est convexe sur $\mathbb{R}_+$, donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $M(x) \geq M'(y)(x - y) + M(y)$.

En appliquant l'inégalité précédente en $p^{(i)} \in \mathbb{R}_+$, on obtient alors

$$M(p^{(i)}) \geq M'(y)(p^{(i)} - y) + M(y) \Leftrightarrow M(p^{(i)}) - M(y) \geq M'(y)(p^{(i)} - y).$$

(b) Comme p est une variable finie, $M(p)$ admet une espérance et, d'après le théorème de transfert,

$$\begin{aligned} E(M(p)) &= \sum_{i=1}^k M(p^{(i)})P(p = p^{(i)}) \\ &\geq \sum_{i=1}^k \left(M'(y)(p^{(i)} - y) + M(y) \right) P(p = p^{(i)}) \quad (\text{d'après 6.a}) \\ &\geq M'(y) \underbrace{\sum_{i=1}^k p^{(i)} P(p = p^{(i)})}_{=E(p)} - M'(y)y \underbrace{\sum_{i=1}^k P(p = p^{(i)})}_{=1} + M(y) \underbrace{\sum_{i=1}^k P(p = p^{(i)})}_{=1} \\ &= M'(y)E(p) - yM'(y) + M(y) = M(y) + M'(y)(E(p) - y). \end{aligned}$$

(c) En prenant $y = E(p)$ dans l'inégalité précédente, on obtient

$$E(M(p)) \geq M(E(p)) + M'(E(p))(E(p) - E(p)) = M(E(p)). \quad \text{cqfd.}$$

Quelle conclusion peut-on en tirer ? Est-ce vraiment des maths ???

1. • Comme f est nulle sur $\mathbb{R}_-$, $\int_{-\infty}^0 xf(x)dx = 0$.

L'existence et la valeur de $E(p)$ dépendent donc uniquement de $\int_0^{+\infty} xf(x)dx$.

• En supposant que $\int_0^{+\infty} M(x)f(x)dx$ converge, on a, toujours d'après le théorème de transfert,

$$E(M(p)) = \int_0^{+\infty} M(x)f(x)dx \quad (\text{car } f \text{ est nulle sur } \mathbb{R}_-)$$

En utilisant l'inégalité 6.a avec x à la place de $p^{(i)}$, on obtient, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$,

$$M(x)f(x) \geq M'(y)(x - y)f(x) + M(y)f(x), \quad \text{et donc} \quad xf(x) \leq \frac{1}{M'(y)}M(x)f(x) + \frac{yM'(y) + M(y)}{M'(y)}f(x).$$

Or, $\int_0^{+\infty} \frac{1}{M'(y)}M(x)f(x) + \frac{yM'(y) + M(y)}{M'(y)}f(x)dx = \frac{1}{M'(y)} \int_0^{+\infty} M(x)f(x)dx + \frac{yM'(y) + M(y)}{M'(y)} \int_0^{+\infty} f(x)dx$ converge comme somme d'intégrales convergentes,

donc, d'après le théorème de comparaison des intégrales de fonctions positives, $\int_0^{+\infty} xf(x)dx$ converge aussi (donc p admet une espérance) et

$$E(p) \leq \frac{1}{M'(y)} \int_0^{+\infty} M(x)f(x) + \frac{yM'(y) + M(y)}{M'(y)} \int_0^{+\infty} f(x)dx = \frac{1}{M'(y)}E(M(p)) + \frac{yM'(y) + M(y)}{M'(y)},$$

et, par suite,

$$E(M(p)) \geq M(y) + M'(y)(E(p) - y).$$

Enfin, en prenant $y = E(p)$, on obtient l'inégalité souhaitée.

Partie III. Espérance conditionnelle

1. (a) Si X et Y sont indépendantes, alors pour tout $i \in \llbracket 1, q \rrbracket$, pour tout $j \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $P_{X=x_i}(Y = y_j) = P(Y = y_j)$. Par suite, pour tout $i \in \llbracket 1, q \rrbracket$,

$$\varphi(x_i) = \sum_{j=1}^r y_j P_{X=x_i}(Y = y_j) = \sum_{j=1}^r y_j P(Y = y_j) = E(Y).$$

Or, pour tout $\omega \in \Omega$, il existe i tel que $X(\omega) = x_i$ et, par suite,

$$Z(\omega) = E(Y|X = X(\omega)) = E(Y|X = x_i) = \varphi(x_i) = E(Y),$$

donc Z est la variable constante égale à $E(Y)$, ie $Z = E(Y)$.

- (b) Si $Y = X$, alors pour tout $i \in \llbracket 1, q \rrbracket$, pour tout $j \in \llbracket 1, q \rrbracket$, $P_{X=x_i}(X = x_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Par suite, pour tout $i \in \llbracket 1, q \rrbracket$,

$$\varphi(x_i) = \sum_{j=1}^q x_j P_{X=x_i}(X = x_j) = x_i.$$

Enfin, pour tout $\omega \in \Omega$, si $X(\omega) = x_i$, on aura $Z(\omega) = \varphi(x_i) = x_i$, donc on a $Z = X$.

- (c) Si tous les réels $\varphi(x_1), \varphi(x_2), \dots, \varphi(x_q)$ sont deux à deux distincts, alors

$$\forall i \in \llbracket 1, q \rrbracket, \quad P(E(Y|X) = \varphi(x_i)) = P(X = x_i).$$

- (d) On a $Z = \varphi(X)$ qui admet une espérance car X est finie et, d'après le théorème de transfert,

$$\begin{aligned} E(E(Y|X)) &= E(\varphi(X)) = \sum_{i=1}^q \varphi(x_i) P(X = x_i) \\ &= \sum_{i=1}^q \sum_{j=1}^r y_j P(X = x_i) P_{X=x_i}(Y = y_j) \\ &= \sum_{j=1}^r y_j \sum_{i=1}^q P(X = x_i) P_{X=x_i}(Y = y_j) \\ &= \sum_{j=1}^r y_j P(Y = y_j) \quad (\text{d'après la formule des probabilités totales}) \\ &= E(Y). \end{aligned}$$

- (e) Par linéarité de l'espérance conditionnelle (HP?!), on a :

$$E(\lambda Y + \rho X + \mu | X) = \lambda E(Y|X) + \rho E(X|X) + \mu E(1|X) = \lambda E(Y|X) + \rho X + \mu.$$

Partie IV. Anticipation naïve et anticipation rationnelle

9. (a) • Comme p_n et p_{n-1} suivent la même loi, on a $E(p_n) = E(p_{n-1})$.

De plus, comme $p_n = \theta p_{n-1} + (1 - \theta)p^* + u_n$ et par linéarité de l'espérance, on a :

$$E(p_n) = \theta E(p_{n-1}) + (1 - \theta)p^* + \underbrace{E(u_n)}_{=0}.$$

D'où

$$E(p_n) = \theta E(p_n) + (1 - \theta)p^* + E(u_n) \Leftrightarrow \boxed{E(p_n) = p^*}.$$

- De même, on a $V(p_n) = V(p_{n-1})$ et, comme u_n et p_{n-1} sont indépendantes, on a aussi

$$V(p_n) = V(\theta p_{n-1} + (1 - \theta)p^* + u_n) = \theta^2 V(p_{n-1}) + V(u_n) \Leftrightarrow V(p_n) = \frac{\sigma^2}{1 - \theta^2}.$$

- Par suite, comme toutes les variables p_n suivent la même loi, on a $E(p_0) = p^*$ et $V(p_0) = \frac{\sigma^2}{1 - \theta^2}$.

Comme de plus on a $p_0 = \ell u_0 + m$, on a aussi $E(p_0) = \ell E(u_0) + m = m$ et $V(p_0) = \ell^2 V(u_0) = \ell^2 \sigma^2$, donc, en identifiant, on obtient :

$$\boxed{m = p^* \quad \text{et} \quad \ell = \pm \frac{1}{\sqrt{1 - \theta^2}}, \quad \text{et donc} \quad p_0 = \frac{1}{\sqrt{1 - \theta^2}} u_0 + p^*}.$$

- (b) • Comme p_n et p_{n-1} admettent une variance, $Cov(p_n, p_{n-1})$ existe.

Comme $u_n = p_n - \theta p_{n-1} - (1 - \theta)p^*$, on a

$$V(u_n) = V(p_n) + \theta^2 V(p_{n-1}) - 2\theta Cov(p_n, p_{n-1}), \quad \text{et donc} \quad Cov(p_n, p_{n-1}) = \frac{(1 + \theta^2)V(p_n) - V(u_n)}{2\theta} = \frac{\theta \sigma^2}{1 - \theta^2}.$$

- $\theta = \frac{Cov(p_n, p_{n-1})}{\frac{\sigma^2}{1 - \theta^2}} = \frac{Cov(p_n, p_{n-1})}{\sqrt{V(p_n)V(p_{n-1})}}$, donc θ est le coefficient de corrélation linéaire de (p_n, p_{n-1}) .

10. On a

$$\begin{aligned}
 E(p_n|p_{n-1}) &= E(\theta p_{n-1} + (1-\theta)p^* + u_n|p_{n-1}) \\
 &= \theta p_{n-1} + (1-\theta)p^* + E(u_n|p_{n-1}) \quad (\text{d'après 8.e}) \\
 &= \theta p_{n-1} + (1-\theta)p^* + E(u_n) \quad (\text{d'après 8.a, car } u_n \text{ et } p_{n-1} \text{ sont indépendantes}) \\
 &= \theta p_{n-1} + (1-\theta)p^*.
 \end{aligned}$$

11. (a) On a $E(\hat{p}_n|p_{n-1}) = E(p_{n-1}|p_{n-1}) = p_{n-1}$ (d'après 8.b).

$$\text{On a } E(\hat{p}_n) = E(p_{n-1}) = p^* \text{ et } V(\hat{p}_n) = V(p_{n-1}) = \frac{\sigma^2}{1-\theta^2}.$$

Enfin, on a

$$E(e_n) = E(p_n) - E(\hat{p}_n) = p^* - p^* = 0$$

et

$$V(e_n) = V(p_n) + V(\hat{p}_n) - 2Cov(p_n, \hat{p}_n) = 2\frac{\sigma^2}{1-\theta^2} - 2\frac{\theta\sigma^2}{1-\theta^2} = \frac{2\sigma^2(1-\theta)}{1-\theta^2} = \frac{2\sigma^2}{1+\theta}.$$

(b) Dans ce modèle, on a donc $\hat{p}_n = \theta p_{n-1} + (1-\theta)p^*$. Par suite, on a :

$$E(\hat{p}_n|p_{n-1}) = E(\theta p_{n-1} + (1-\theta)p^*|p_{n-1}) = \theta p_{n-1} + (1-\theta)p^*,$$

$$E(\hat{p}_n) = \theta E(p_{n-1}) + (1-\theta)p^* = p^*,$$

$$V(\hat{p}_n) = \theta^2 V(p_{n-1}) = \frac{\theta^2 \sigma^2}{1-\theta^2},$$

$$E(e_n) = E(p_n) - E(\hat{p}_n) = p^* - p^* = 0$$

$$\text{et } V(e_n) = V(p_n) + V(\hat{p}_n) - 2Cov(p_n, \hat{p}_n)$$

$$= \frac{(1+\theta^2)\sigma^2}{1-\theta^2} - 2\frac{\theta\sigma^2}{1-\theta^2}$$

$$= \frac{(1-2\theta+\theta^2)\sigma^2}{1-\theta^2}$$

$$= \frac{(1-\theta)^2\sigma^2}{1-\theta^2} = \frac{(1-\theta)\sigma^2}{1+\theta}.$$

(c) Les anticipations naïve et rationnelle prennent en moyenne la même valeur que le prix p_n , Mais l'écart au prix pratiqué de l'anticipation rationnelle a un écart-type plus petit, et sera donc en moyenne plus proche du prix pratiqué.

Bref, l'anticipation rationnelle est meilleure.