Correction du DM n° 7

Le 05/02/24

Exercice 1

1. (a) g_0 est C^∞ sur $\mathbb{R}^+$ (comme quotient de deux fonctions C^∞ avec un dénominateur non nul), strictement décroissante sur $[0, +\infty[$ comme inverse d'une fonction strictement croissante et (strictement) positive.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g_0(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{(1+x)^2} = 0.$$

L'équation de la tangente en 0 est $y = g'_0(0)(x - 0) + g_0(0)$.

Or, pour tout $x \geq 0$, $g'_0(x) = -\frac{2}{(1+x)^3}$, donc la tangente en 0 a pour équation $y = -2x + 1$.

Rq : En fait, il s'agit d'une demi-tangente, car g_0 n'est pas définie sur $]-\infty, 0[$.

- (b) Soit $n \geq 1$.

g_n est C^∞ sur $[0, +\infty[$ comme composée, puissance et quotient de fonctions usuelles et

$$\forall x \in [0, +\infty[, \quad g'_n(x) = \frac{n \frac{1}{1+x} (\ln(1+x))^{n-1} (1+x)^2 - 2(1+x)(\ln(1+x))^n}{(1+x)^4}$$

$$\forall x \in [0, +\infty[, \quad g'_n(x) = \frac{\overbrace{(1+x)(\ln(1+x))^{n-1}(n - 2 \ln(1+x))}^{\geq 0}}{\underbrace{(1+x)^4}_{\geq 0}}$$

D'où $g'_n(x) \geq 0 \Leftrightarrow n - 2 \ln(1+x) \geq 0 \Leftrightarrow n \geq 2 \ln(1+x) \Leftrightarrow 1+x \leq e^{n/2} \Leftrightarrow x \leq e^{n/2} - 1$.

Comme $n/2 > 0$, $e^{n/2} > 1$ et donc $e^{n/2} - 1 \in [0, +\infty[$.

On a donc :

x	0	$e^{n/2} - 1$	$+\infty$
$g'_n(x)$	-	0	+
g_n	0	M_n	0

$$M_n = g_n(e^{n/2} - 1)$$

$$g_n(0) = \frac{(\ln(1))^n}{1^2} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g_n(x) \underset{\text{en posant } y=1+x}{=} \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{(\ln y)^n}{y^2} = 0 \text{ par croissances comparées.}$$

- (c) D'après le tableau de variations de g_n , g_n admet un maximum sur $[0, +\infty[$ en $e^{n/2} - 1$ qui vaut :

$$M_n = g_n(e^{n/2} - 1) = \frac{(\ln(e^{n/2}))^n}{(e^{n/2})^2} = \frac{(n/2)^n}{e^n} = \left(\frac{n}{2e}\right)^n.$$

$\ln(M_n) = n \ln\left(\frac{n}{2e}\right)$ tend vers $+\infty$ quand n tend vers $+\infty$ donc :
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} M_n = +\infty$.

(d) Pour tout $n \geq 1$, $\frac{g_n(x)}{1/x^{3/2}} \sim \frac{(\ln(1+x))^n}{x^{1/2}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ (toujours par croissances comparées),
 donc $g_n(x) = o_{x \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{x^{3/2}}\right)$.

2. (a) Soit $A > 0$.

$$\int_0^A g_0(t) dt = \int_0^A \frac{1}{(1+t)^2} dt = \left[-\frac{1}{1+t}\right]_0^A = -\frac{1}{1+A} + 1 \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} 1,$$

donc $I_0 = \int_0^{+\infty} g_0(t) dt$ converge et vaut 1.

(b) Soit $n \geq 1$.

- g_n et $t \mapsto \frac{1}{t^{3/2}}$ sont continues et positives sur $[1, +\infty[$.

- $g_n(t) = o_{t \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{t^{3/2}}\right)$ d'après 1d.

- Or, $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^{3/2}} dt$ converge (Riemann et $3/2 > 1$), donc, d'après le théorème de comparaison des intégrales de fonctions positives, $\int_1^{+\infty} g_n(t) dt$ converge aussi.

- Enfin, comme g_n est continue sur $[0, 1]$, $\int_0^1 g_n(t) dt$ existe.

Par suite, $I_n = \int_0^{+\infty} g_n(t) dt$ converge.

(c) Soit $A > 0$.

Posons $u(t) = (\ln(1+t))^{n+1}$, $u'(t) = \frac{(n+1)}{1+t} (\ln(1+t))^n$, $v'(t) = \frac{1}{(1+t)^2}$, $v(t) = -\frac{1}{1+t}$.

Comme u et v sont de classe C^1 sur $[0, A]$, on peut intégrer par parties et on a :

$$\begin{aligned} \int_0^A g_{n+1}(t) dt &= \left[-\frac{(\ln(1+t))^{n+1}}{1+t}\right]_0^A + \int_0^A \frac{(n+1)}{1+t} (\ln(1+t))^n \frac{1}{1+t} dt \\ &= -\frac{(\ln(1+A))^{n+1}}{1+A} + (n+1) \int_0^A g_n(t) dt. \end{aligned}$$

Or, $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A g_{n+1}(t) dt = I_{n+1}$, $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A g_n(t) dt = I_n$ (car I_n et I_{n+1} convergent)

et $\lim_{A \rightarrow +\infty} -\frac{(\ln(1+A))^{n+1}}{1+A} = 0$ (par croissances comparées),

donc, en passant à la limite dans l'égalité précédente, on obtient bien :

$$I_{n+1} = (n+1)I_n.$$

(d) Montrons par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_n = n!$ (HR_n).

Initialisation : On a $I_0 = 1$ et $0! = 1$, donc on a bien HR_0 .

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$ et supposons HR_n vérifiée.

Alors $I_{n+1} = (n+1)I_n \stackrel{HR_n}{=} (n+1)n! = (n+1)!$

On a bien HR_{n+1} .

Conclusion : D'où, par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_n = n!$.

3. (a) • f_n est positive sur $\mathbb{R}$.

- f_n est continue sur $\mathbb{R}$ sauf éventuellement en 0.

- $\int_0^{+\infty} f_n(t) dt = \frac{1}{n!} \int_0^{+\infty} g_n(t) dt$ converge et vaut $\frac{1}{n!} n! = 1$.

f_n peut donc bien être considérée comme une densité de probabilité.

(b) Soit $n \geq 1$.

- $t \mapsto tf_n(t)$ et $t \mapsto \frac{1}{t}$ sont continues et positives sur $[1, +\infty[$.
- $\frac{1/t}{tf_n(t)} = \frac{n!(1+t)^2}{t^2(\ln(1+t))^n} \sim \frac{n!}{(\ln(1+t))^n} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$, donc $\frac{1}{t} = o_{t \rightarrow +\infty}(tf_n(t))$.
- Or, $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t} dt$ diverge (Riemann de paramètre $1 \leq 1$), donc, d'après le théorème de comparaison des intégrales de fonctions positives, $\int_1^{+\infty} tf_n(t) dt$ diverge aussi.

Donc $\int_0^{+\infty} tf_n(t) dt$ diverge, donc X_n n'admet pas d'espérance.

(c) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout $x < 0$, $F_n(x) = \int_{-\infty}^x f_n(t) dt = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$.

(d) Pour tout $x \geq 0$, $F_0(x) = \int_{-\infty}^x f_0(t) dt = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x \frac{1}{(1+t)^2} dt = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x}$ (cf calculs faits en 2a).

(e) En reprenant les calculs faits en 2c (en remplaçant n par $k-1$ et A par x , on obtient :

$$\begin{aligned} F_k(x) &= \frac{1}{k!} \int_0^x g_k(t) dt = \frac{1}{k!} \left(-\frac{(\ln(1+x))^k}{1+x} + k \int_0^x g_{k-1}(t) dt \right) \\ &= -\frac{1}{k!} \frac{(\ln(1+x))^k}{1+x} + \frac{1}{(k-1)!} \int_0^x g_{k-1}(t) dt = -\frac{1}{k!} \frac{(\ln(1+x))^k}{1+x} + F_{k-1}(x), \end{aligned}$$

et on a donc bien :

$$F_k(x) - F_{k-1}(x) = -\frac{1}{k!} \frac{(\ln(1+x))^k}{1+x}.$$

(f) En sommant l'égalité précédente pour $k = 1..n$, on obtient :

$$\sum_{k=1}^n F_k(x) - F_{k-1}(x) = -\sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \frac{(\ln(1+x))^k}{1+x},$$

et donc, en télescopant à gauche de l'égalité :

$$F_n(x) - F_0(x) = -\sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \frac{(\ln(1+x))^k}{1+x},$$

et donc

$$F_n(x) = F_0(x) - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \frac{(\ln(1+x))^k}{1+x} = 1 - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \frac{(\ln(1+x))^k}{1+x}.$$

(g) • Pour tout $x < 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0$.

• Pour tout $x \geq 0$,

$$\begin{aligned} F_n(x) &= 1 - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \frac{(\ln(1+x))^k}{1+x} = 1 - \frac{1}{1+x} \sum_{k=0}^n \frac{(\ln(1+x))^k}{k!} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{1+x} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\ln(1+x))^k}{k!} \end{aligned}$$

(série exponentielle de paramètre $\ln(1+x)$, donc convergente)

$$\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{1+x} \exp(\ln(1+x)) = 1 - \frac{1+x}{1+x} = 0.$$

(h) Posons $G : x \mapsto \lim_{n \rightarrow +\infty} F_n(x)$.

G est nulle sur $\mathbb{R}$.

G ne varie pas de 0 à 1 en croissant donc G n'est pas une fonction de répartition.

Donc X_n ne converge pas en loi vers une variable X .

4. (a) On a $X_n(\Omega) = \mathbb{R}^+$, donc $(1 + X_n)(\Omega) = [1, +\infty[$, donc $Y_n = \ln(1 + X_n)$ est bien définie et $Y_n(\Omega) = \mathbb{R}^+$.

(b) D'après le théorème de transfert, Y_n admet une espérance

si et seulement si $\int_{X(\Omega)} \ln(1+x) f_n(x) dx$ converge absolument.

Or,

$$\begin{aligned} \int_{X(\Omega)} \ln(1+x) f_n(x) dx &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{n!} \frac{(\ln(1+x))^{n+1}}{(1+x)^2} dx \\ &= \frac{1}{n!} \int_0^{+\infty} g_{n+1}(x) dx \\ &= \frac{1}{n!} I_{n+1} = \frac{(n+1)!}{n!} = n+1 \end{aligned}$$

Par suite, d'après le théorème de transfert, $Y_n = \ln(1 + X_n)$ admet une espérance et

$$\boxed{E(Y_n) = n+1}$$

(c) De même, d'après le théorème de transfert, Y_n^2 admet une espérance si et seulement si $\int_{X(\Omega)} (\ln(1+x))^2 f_n(x) dx$ converge absolument.

Or,

$$\begin{aligned} \int_{X(\Omega)} (\ln(1+x))^2 f_n(x) dx &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{n!} \frac{(\ln(1+x))^{n+2}}{(1+x)^2} dx \\ &= \frac{1}{n!} \int_0^{+\infty} g_{n+2}(x) dx \\ &= \frac{(n+2)!}{n!} = (n+2)(n+1) \end{aligned}$$

Par suite, d'après le théorème de transfert, $Y_n^2 = (\ln(1 + X_n))^2$ admet une espérance et $E(Y_n^2) = (n+2)(n+1)$, donc Y_n admet une variance et, d'après Huygens Koenig,

$$V(Y_n) = E(Y_n^2) - (E(Y_n))^2 = (n+2)(n+1) - (n+1)^2 = n+1$$

$$\boxed{V(Y_n) = n+1}$$

(d) Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$H_n(x) = P(Y_n \leq x) = P(\ln(1 + X_n) \leq x) = P(1 + X_n \leq e^x) = P(X_n \leq e^x - 1) = F_n(e^x - 1).$$

(e) H_n est continue sur $\mathbb{R}$ et de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ sauf éventuellement en un nombre fini de points comme composée de F_n (qui est continue sur $\mathbb{R}$ et de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ sauf éventuellement en un nombre fini de point (fonction de répartition de X_n)) et de $x \mapsto e^x - 1$ (qui est C^1 sur $\mathbb{R}$).

Y_n est donc une variable à densité et une densité de Y_n est

$$h_n : x \mapsto e^x f_n(e^x - 1) = \begin{cases} 0 & \text{si } e^x - 1 < 0 \\ e^x \frac{1}{n!} \frac{(\ln(1 + e^x - 1))^n}{(1 + e^x - 1)^2} & \text{si } e^x - 1 \geq 0 \end{cases} = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{x^n e^{-x}}{n!} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

(f) $h_0 : x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ e^{-x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$ On reconnaît la densité d'une loi $\mathcal{E}(1)$, donc $Y_0 \hookrightarrow \mathcal{E}(1)$.

D'après le théorème de transfert, Y_0 admet un moment d'ordre k (et donc $Y_0^k = (\ln(1 + X_0))^k$) une

espérance) si et seulement si $\int_{X_0(\Omega)} (\ln(1+x))^k f_0(x) dx$ converge absolument.

Or,

$$\begin{aligned} \int_{X_0(\Omega)} (\ln(1+x))^k f_0(x) dx &= \int_0^{+\infty} (\ln(1+x))^k f_0(x) dx \quad (\text{car } X_0(\Omega) = \mathbb{R}^+) \\ &= \int_0^{+\infty} (\ln(1+x))^k \frac{1}{(1+x)^2} dx \quad (\text{définition de } f_0) \\ &= I_k \end{aligned}$$

donc $\int_{X_0(\Omega)} (\ln(1+x))^k f_0(x) dx$ converge absolument et, d'après le théorème de transfert, Y_0^k admet une espérance et $E(Y_0^k) = I_k = k!$. On peut conclure :

Y_0 admet un moment d'ordre k , qui vaut $k!$

Exercice 2

1.a) Cette relation peut aussi s'écrire $\ln(r) = \ln(a) - b \ln(t)$. On a représenté le nuage de points $(\ln(t_i), \ln(r_i))_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ on constate un très bon alignement des points, donc on peut considérer qu'une telle relation est raisonnable.

On peut par ailleurs calculer le coefficient de corrélation linéaire entre les $\ln(t_i)$ et les $\ln(r_i)$. S'il est proche de 1 en valeur absolue, on peut alors valider la relation.

On trouve $-0,9947$ ce qui confirme l'utilisation de ce modèle.

Pour obtenir (a, b) on peut réaliser un ajustement aux moindres carrés du nuage de points $(\ln(t_i), \ln(r_i))$.

b) Notons $r(x)$ le rang de la ville d'effectif x , cette proportion vaut $\frac{r(x)}{n} = \frac{a}{nx^b}$.

2.a) Si $x < x_0$, alors $F(x) = 0$. Si $x \geq x_0$, $F(x) = \int_{x_0}^x \theta \frac{x_0^\theta}{t^{\theta+1}} dt = x_0^\theta \left[-\frac{1}{t^\theta}\right]_{x_0}^x = 1 - \left(\frac{x_0}{x}\right)^\theta$.

b) On a donc que si x est l'effectif d'une ville, $\mathbb{P}([T > x]) = \frac{x_0^\theta}{x^\theta}$. Si l'on rapproche ce résultat du résultat de la question précédente on peut alors considérer que cette probabilité correspond à la valeur trouvée dans cette question soit $\frac{a}{nx^b}$. Ces deux résultats sont donc cohérents en identifiant θ à b et x_0^θ à $\frac{a}{n}$ donc x_0 à $\left(\frac{a}{n}\right)^{\frac{1}{\theta}}$.

c) On s'intéresse à la convergence de $\int_{-\infty}^{+\infty} t f(t) dt$ i.e. de $\int_{x_0}^{+\infty} \theta \frac{x_0^\theta}{t^{\theta+1}} dt$. La fonction $H : t \mapsto \frac{\theta}{-\theta+1} \frac{x_0^\theta}{t^{\theta-1}}$ est une primitive de la fonction dans l'intégrale qui admet une limite finie égale à 0 en $+\infty$. Donc cette intégrale est convergente et vaut $-H(x_0) = \frac{\theta}{\theta-1} x_0$.

3.a) Par définition, $\mathbb{P}_x(T > t) = \frac{\mathbb{P}([T > t] \cap [T > x])}{\mathbb{P}([T > x])} = \frac{1-F(t)}{1-F(x)}$ puisque $t \geq x$. Finalement $\mathbb{P}_x(T > t) = \frac{\left(\frac{x_0}{t}\right)^\theta}{\left(\frac{x_0}{x}\right)^\theta} = \left(\frac{x}{t}\right)^\theta$.

b) D'après la question précédente, $F_x(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq x \\ 1 - \left(\frac{x}{t}\right)^\theta & \text{sinon.} \end{cases}$ On reconnaît la fonction de répartition de

la loi $\text{Par}(\theta, x)$. D'où l'espérance de cette loi existe et vaut $\frac{\theta}{\theta-1} x$. 4.a) En reprenant la méthode utilisée dans le 4.a), on obtient que :

$$G_x(t) = \begin{cases} \frac{F_Y(t) - F_Y(x)}{1 - F_Y(x)} & \text{si } t > x \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On vérifie que G_x est bien la fonction de répartition d'une variable à densité. Elle est de classe C^1 sur $\mathbb{R} \setminus \{x\}$ et

$$G'_x(t) = \begin{cases} \frac{f_Y(t)}{1 - F_Y(x)} & \text{si } t > x \\ 0 & \text{si } t < x \end{cases}$$

d'où une densité...

b) On peut donc en déduire que pour tout $x \geq x_0$, $\int_x^{+\infty} t f_Y(t) dt$ converge et vérifie : $\int_x^{+\infty} t f_Y(t) dt = \delta x (1 - F_Y(x))$. En utilisant une primitive, on voit que la fonction $K : x \mapsto \int_x^{+\infty} t f_Y(t) dt$ est de classe C^1

sur $[x_0, +\infty[$ et vérifie $K'(x) = -xf_Y(x)$. Donc, pour tout $x \geq x_0$, $-xf_Y(x) = \delta(1 - F_Y(x) - xf_Y(x))$ i.e $(\delta - 1)xf_Y(x) = \delta(1 - F_Y(x))$.

c) Sur $[x_0, +\infty[$, $(1 - \delta)xy' - \delta y = 0 \iff y' = \frac{\delta}{(1-\delta)x}y$. Posons $\beta = \frac{\delta}{\delta-1}$. Les solutions sont de la forme $y = \lambda \exp(-\beta(\ln(x))) = \frac{\lambda}{x^\beta}$ avec λ réel.

d) Si l'on pose pour tout $x \geq x_0$, $\varphi(x) = 1 - F_Y(x)$, φ vérifie l'équation différentielle précédente et $\varphi(x_0) = 1$ d'où $\lambda = x_0^\beta$ et pour tout $x \geq x_0$, $F_Y(x) = \left(\frac{x_0}{x}\right)^\beta$. On en conclut que Y suit la loi Par $\left(\frac{\delta}{\delta-1}, x_0\right)$.