

TD 12 – APPLICATION

Exercice 1 – Recherche d’antécédent. *Les deux questions sont indépendantes.*

1. Déterminer l’ensemble des antécédents de 4 puis de -1 par l’application

$$\begin{array}{rccc} f : & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & \frac{3x+4}{x^2+1} \end{array}$$

2. Déterminer l’ensemble des antécédents de $(1, 2)$ par l’application

$$\begin{array}{rccc} g : & \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & (x, y, z) & \longmapsto & (2x+y+z, x+2y-z) \end{array}$$

Exercice 2 – Composition. On considère les deux applications

$$\begin{array}{rccc} f : & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & 3x+1 \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{rccc} g : & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & -2x+6 \end{array}$$

1. Justifier l’existence de $f \circ g$ et $g \circ f$ et donner leur expression.
2. A-t-on $f \circ g = g \circ f$? Justifier la réponse.
3. Tracer les courbes représentatives des fonctions f et g .
4. (*) Déterminer graphiquement les deux ensembles suivants

$$f([-3, 1]) = \{f(x) \mid x \in [-3, 1]\} \quad \text{et} \quad g([-1, 1]) = \{g(x) \mid x \in [-1, 1]\}$$

Exercice 3 – Composition. On considère les deux applications

$$\begin{array}{rccc} f : & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & \ln(1 + e^x) \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{rccc} g : & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & -x \end{array}$$

Justifier que les applications f et g sont bien définies. Démontrer que,

$$f - f \circ g = \text{id}_{\mathbb{R}}$$

Exercice 4 – Image d’une fonction. On considère l’application

$$\begin{array}{rccc} f : & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & \frac{3x+4}{x^2+1} \end{array}$$

Déterminer $\text{Im}(f)$.

Exercice 5 – Image d’une fonction. On considère l’application

$$\begin{array}{rccc} f : & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ & (x, y) & \longmapsto & (x+2y, x+y, x+3y) \end{array}$$

Montrer que l’image de f est donné par

$$\text{Im}(f) = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid 2a - b - c = 0\} = F.$$

Exercice 6 – Injectivité/surjectivité/bijectivité selon les ensembles de départ/d’arrivée. On considère l’application

$$\begin{array}{rccc} h : & E & \longrightarrow & F \\ & x & \longmapsto & x^2 + 1 \end{array}$$

1. Montrer que, lorsque $E = \mathbb{R}$ et $F = \mathbb{R}$, l’application $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est ni injective, ni surjective.
2. Montrer que, lorsque $E = \mathbb{R}_+$ et $F = \mathbb{R}$, l’application $h : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ est injective, mais pas surjective.
3. Montrer que, lorsque $E = \mathbb{R}_+$ et $F = [1, +\infty[$, l’application $h : \mathbb{R}_+ \rightarrow [1, +\infty[$ est une bijection.

Exercice 7 – Injectivité, surjectivité, bijectivité. Étudier l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité de chacun des applications f suivantes :

$$\begin{array}{lll} 1. \ f: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N} & 3. \ f: \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R} & 5. \ f: \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R} \\ n \longmapsto n+2 & x \longmapsto \frac{1}{x} & x \longmapsto \sqrt{x^2+1} \\ 2. \ f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} & 4. \ f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+ & 6. \ f: \mathbb{N} \longrightarrow \{-1, 1\} \\ (x, y) \longmapsto 2x+y & x \longmapsto |x+1| & n \longmapsto (-1)^n \end{array}$$

On pourra représenter les fonctions pour se faire une idée des propriétés à démontrer.

Exercice 8 – Bijectivité avec plusieurs méthodes. Les trois questions sont indépendantes.

- On considère les deux applications suivantes

$$f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \quad \text{et} \quad g: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) \longmapsto (x+2y, -x+3y) \quad (a, b) \longmapsto \left(\frac{3a-2b}{5}, \frac{a+b}{5}\right)$$

Montrer que $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ est une bijection et que g est la réciproque de f . (cf méthode 1 du cours.)

- On considère la fonction

$$f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) \longmapsto (2x-y, x-y)$$

Montrer que la fonction f est bijective et déterminer son application réciproque. (cf méthode 2 du cours.)

- On considère la fonction

$$f: \left]-\frac{1}{2}, +\infty\right[\longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \ln(2x+1) - 1$$

Montrer que la fonction f est bijective et déterminer son application réciproque. (cf la méthode 2 du cours.)

Exercice 9 – On considère les deux applications $f: \llbracket 1, 6 \rrbracket \rightarrow \llbracket 1, 6 \rrbracket$ et $g: \llbracket 1, 6 \rrbracket \rightarrow \llbracket 1, 6 \rrbracket$ définies par leur tableau de valeurs ci-dessous.

x	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	3	4	2	1	6	5

x	1	2	3	4	5	6
$g(x)$	1	2	3	4	6	5

- Déterminer $f \circ g$ et $g \circ f$ (après avoir justifié que ces objets sont bien définis).

- Déterminer les deux ensembles suivants

$$f(\{1, 5\}) = \{f(x) \mid x \in \{1, 5\}\} \quad \text{et} \quad g(\{5, 6\}) = \{g(x) \mid x \in \{5, 6\}\}$$

- Justifier que f est bijective et déterminer f^{-1} .

Exercice 10 – On considère l'application

$$f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) \longmapsto (3x-y, 2y-6x)$$

- Déterminer l'ensemble des antécédents de $(0, 0)$.
- Montrer, par double inclusion, que l'ensemble image de f est $\text{Im}(f) = \{(a, -2a) \mid a \in \mathbb{R}\}$.
- L'application $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ est-elle injective ? surjective ? bijective ?

Exercice 11 – On considère l'application

$$f: \mathbb{R} \setminus \{-1\} \longrightarrow \mathbb{R} \setminus \{-1\} \\ x \longmapsto \frac{1-x}{1+x}$$

- Démontrer que, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, $f(x) \neq -1$.
- Déterminer l'application $f \circ f$.
- En déduire que $f: \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ est une bijection et on précisera sa bijection réciproque.

Exercice 12 – Soient E et F deux ensembles et $f, g: E \rightarrow F$ deux applications telles que $f \circ g \circ f$ est bijective. Montrer que f et g sont bijectives.