



# Chapitre 27 : Applications Linéaires

Soient  $E$  et  $F$  deux ensembles et  $f : E \rightarrow F$  une application.


$f$ est <i>injective</i>	Tout élément de $F$ admet <b>au plus</b> un antécédent.
$f$ n'est pas <i>injective</i>	Il existe un élément de $F$ avec deux (ou plus) antécédents.
$f$ est <i>surjective</i>	Tout élément de $F$ admet <b>au moins</b> un antécédent.
$f$ n'est pas <i>surjective</i>	Il existe un élément de $F$ qui n'admet pas d'antécédent.
$f$ est <i>bijective</i>	Tout élément de $F$ admet <b>un unique</b> antécédent.



Exemple d'une application *injective* et non *surjective*



Exemple d'une application *non injective* et *surjective*



Exemple d'une application *injective* et *surjective*

Dans tout ce chapitre,  $n$  et  $p$  désignent deux entiers naturels non nuls.

## 1 Application linéaire entre espaces vectoriels

### 1.1 La notion de linéarité

**Définition 1.1** Soit  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$  une application. On dit que  $f$  est une **application linéaire** lorsqu'elle préserve les combinaisons linéaires, c'est-à-dire,

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, \quad \forall u, v \in \mathbb{R}^n, \quad f(a \cdot u + b \cdot v) = a \cdot f(u) + b \cdot f(v)$$

On note  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$  l'ensemble des applications linéaires de  $\mathbb{R}^n$  dans  $\mathbb{R}^p$ .

La relation de la Définition 1.1 se généralise à plus de termes. Si  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$  est une application linéaire, alors, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,

$$\forall a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}, \quad \forall u_1, \dots, u_n \in \mathbb{R}^n, \quad f(a_1 u_1 + \dots + a_n u_n) = a_1 f(u_1) + \dots + a_n f(u_n)$$

#### ? Méthode 1 - Savoir manipuler une application linéaire.

**Exemple 1.2** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une application linéaire telle que  $f(1) = 1$ . Déterminer l'expression de  $f$ .

On a,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = f(x \cdot 1) = x \cdot f(1) = x.$$

Donc la fonction  $f$  est nécessairement la fonction identité  $\text{id}_{\mathbb{R}} : x \mapsto x$

! Attention, le raisonnement de l'Exemple précédent est faux si l'application suivante n'est plus linéaire. En effet, les deux fonctions  $x \mapsto |x|$  et  $x \mapsto \ln(x) + 1$  prennent toutes les deux la valeur 1 en 1, mais ce ne sont pas des fonctions identités.

**Exemple 1.3** Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  une application linéaire telle que  $f(1, 0) = 2$  et  $f(0, 1) = 3$ . Déterminer l'expression de  $f$ .

On a, pour tout  $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ ,

$$\begin{aligned} f(x,y) &= f(x \cdot (1,0) + y \cdot (0,1)) \\ &= x \cdot f(1,0) + y \cdot f(0,1) \\ &= x \times 2 + y \times 3 \\ &= 2x + 3y \end{aligned}$$

Finalement, la fonction  $f$  est forcément l'application suivante

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x,y) &\longmapsto 2x + 3y \end{aligned}$$

Ces deux exemples illustrent de manière informelle que la notion de linéarité impose une certaine *rigidité* à l'application. Finalement, en connaissant un nombre restreint de valeurs de la fonction, grâce à la linéarité, on en déduit toutes les autres valeurs. Plus rigoureusement, *une application linéaire est entièrement déterminée par la donnée de l'image d'une base de l'espace de départ.*

**? Méthode 2 - Savoir montrer qu'une application est linéaire.**

Pour montrer qu'une application  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$  est une application linéaire, la rédaction est la suivante :

« Soient  $a$  et  $b$  deux nombres réels et  $u$  et  $v$  deux vecteurs de  $\mathbb{R}^n$ . Montrons que  
 $f(au + bv) = af(u) + bf(v)$ . »

Exemple 1.4 Montrer que l'application  $f$  suivante est linéaire,

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x,y) &\longmapsto (x+y, -x-y) \end{aligned}$$

Soient  $a$  et  $b$  deux nombres réels et  $u = (x,y)$  et  $v = (x',y')$  deux vecteurs de  $\mathbb{R}^2$ . Montrons que  
 $f(au + bv) = af(u) + bf(v)$ .

Dans un premier temps, le vecteur  $au + bv$  est donné par

$$au + bv = a(x,y) + b(x',y') = (ax + bx', ay + by') = (X, Y) \quad (\text{égalité dans } \mathbb{R}^2)$$

Donc l'image du vecteur  $au + bv$  est donné par

$$\begin{aligned} f(au + bv) &= f(X, Y) && (\text{égalité dans } \mathbb{R}^2) \\ &= (X + Y, -X - Y) \\ &= (ax + bx' + ay + by', -(ax + bx') - (ay + by')) \\ &= (ax + bx' + ay + by', -ax - bx' - ay - by') \\ &= a(x+y, -x-y) + b(x'+y', -x'-y') \\ &= af(x,y) + bf(x',y') \\ &= af(u) + bf(v) \end{aligned}$$

Donc l'application  $f$  est bien linéaire.

Exemple 1.5 Montrer que l'application  $f$  suivante est linéaire,

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x,y,z) &\longmapsto (2x - y, x + 3y - z) \end{aligned}$$

Soient  $a$  et  $b$  deux nombres réels et  $u = (x, y, z)$  et  $v = (x', y', z')$  deux vecteurs de  $\mathbb{R}^3$ . Montrons que

$$f(au + bv) = af(u) + bf(v).$$

Dans un premier temps, le vecteur  $au + bv$  est donné par

$$au + bv = a(x, y, z) + b(x', y', z') = (ax + bx', ay + by', az + bz') = (X, Y, Z) \quad (\text{égalité dans } \mathbb{R}^3)$$

Donc l'image du vecteur  $au + bv$  est donné par

$$\begin{aligned} f(au + bv) &= f(X, Y, Z) && (\text{égalité dans } \mathbb{R}^2) \\ &= (2X - Y, X + 3Y - Z) \\ &= (2(ax + bx') - (ay + by'), ax + bx' + 3(ay + by') - (az + bz')) \\ &= (2ax + 2bx' - ay - by', axbx' + 3ay + 3by' - az - bz') \\ &= a(2x - y, x + 3y - z) + b(2x' - y', x' + 3y' - z') \\ &= af(x, y, z) + bf(x', y', z') \\ &= af(u) + bf(v) \end{aligned}$$

Donc l'application  $f$  est bien linéaire.

**? Méthode 3 - Savoir montrer qu'une application n'est pas linéaire.**

Pour montrer que l'application  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$  n'est pas linéaire, il s'agit de trouver deux vecteurs  $u$  et  $v$  de  $\mathbb{R}^n$  tels que

$$f(u + v) \neq f(u) + f(v).$$

Exemple 1.6 Montrer que l'application  $f$  suivante n'est pas linéaire,

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto xy \end{aligned}$$

Prenons  $u = (1, 0)$  et  $v = (0, 1)$  deux vecteurs de  $\mathbb{R}^2$ . Alors,

$$f(u + v) = f(1, 1) = 1 \quad \text{tandis que} \quad f(u) + f(v) = f(1, 0) + f(0, 1) = 0$$

Donc l'application  $f$  n'est pas linéaire.

**Proposition 1.7** Soit  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$  une application linéaire.

$$f(\mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}) = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^p}$$

Exemple 1.8 Montrer que l'application  $f$  suivante n'est pas linéaire,

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto (3x - y, x + 5y + 1) \end{aligned}$$

On peut directement remarquer que

$$f(0, 0) \neq (0, 0)$$

Donc l'application  $f$  n'est pas linéaire.

## 1.2 Opérations sur les applications linéaires

**Proposition 1.9** Toute combinaison linéaire d'applications linéaires est une application linéaire. Autrement dit,

$$\forall \mu, \lambda \in \mathbb{R}, \quad \forall f, g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p) \quad \mu f + \lambda g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$$

On dit que  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$  est un espace vectoriel.

*Démonstration.* Soient  $\mu, \lambda$  dans  $\mathbb{R}$  et  $f, g$  dans  $\mathcal{L}(E, F)$ , c'est-à-dire deux applications linéaires de  $E$  dans  $F$ . Montrons que  $\mu f + \lambda g$  est dans  $\mathcal{L}(E, F)$ , c'est-à-dire montrons que l'application  $h = \mu f + \lambda g$ , qui va de  $E$  dans  $F$ , est linéaire.

Soient  $a$  et  $b$  deux nombres réels et  $u$  et  $v$  deux vecteurs de  $E$ . Montrons que

$$h(au + bv) = ah(u) + bh(v).$$

En utilisant la linéarité de  $f$  et celle de  $g$ , on a

$$\begin{aligned} h(au + bv) &= (\mu f + \lambda g)(au + bv) \\ &= \mu f(au + bv) + \lambda g(au + bv) \\ &= \mu(af(u) + bf(v)) + \lambda(ag(u) + bg(v)) \\ &= a(\mu f(u) + \lambda g(u)) + b(\mu f(v) + \lambda g(v)) \\ &= a(\mu f + \lambda g)(u) + b(\mu f + \lambda g)(v) \\ &= ah(u) + bh(v) \end{aligned}$$

Donc l'application  $h$  est linéaire, c'est-à-dire  $h \in \mathcal{L}(E, F)$ . ■

**Proposition 1.10** Toute composée d'applications linéaires (si elle est bien définie) est une application linéaire. Autrement dit,

$$\forall f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p), \quad \forall g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^m) \quad g \circ f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$$

*Démonstration.* Soient  $f$  dans  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$  et  $g$  dans  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^m)$ . Montrons que  $g \circ f$  est dans  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ , c'est-à-dire montrons que l'application  $g \circ f$ , qui va de  $\mathbb{R}^n$  dans  $\mathbb{R}^m$  est linéaire.

Soient  $a$  et  $b$  deux nombres réels et  $u$  et  $v$  deux vecteurs de  $\mathbb{R}^n$ . Montrons que

$$(g \circ f)(au + bv) = a(g \circ f)(u) + b(g \circ f)(v).$$

En utilisant la linéarité de  $f$  et celle de  $g$ , on a

$$\begin{aligned} (g \circ f)(au + bv) &= g(f(au + bv)) \\ &= g(af(u) + bf(v)) \\ &= ag(f(u)) + bg(f(v)) \\ &= a(g \circ f)(u) + b(g \circ f)(v) \end{aligned}$$

Donc l'application  $g \circ f$  est linéaire, c'est-à-dire  $g \circ f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ . ■

**Définition 1.11** Soient  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$  et  $k \in \mathbb{N}$ . On note  $f^k$  l'application linéaire de  $\mathbb{R}^n$  dans  $\mathbb{R}^n$  définie par

$$f^0 = \text{id}_{\mathbb{R}^n} \quad \text{si } k = 0 \quad \text{et} \quad f^k = f \circ \dots \circ f \quad \text{si } k > 0$$

Exemple 1.12 On considère l'application

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto (2x - y, x + 3y - z, x + y) \end{aligned}$$

Calculer  $f^2$ .

Soit  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ . On a,

$$\begin{aligned} f^2(x, y, z) &= f(f(x, y, z)) \\ &= f(2x - y, x + 3y - z, x + y) \\ &= (2(2x - y) - (x + 3y - z), (2x - y) + 3(x + 3y - z) - (x + y), (2x - y) + (x + 3y - z)) \\ &= (3x - 5y + z, 4x + 7y - 3z, 3x + 2y - z) \end{aligned}$$

## 2 Noyau d'une application linéaire

### 2.1 Définition du noyau d'une application linéaire

**Définition 2.1** Soit  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$ . On appelle **noyau** de l'application  $f$  l'ensemble

$$\text{Ker}(f) = \{u \in \mathbb{R}^n \mid f(u) = 0_{\mathbb{R}^p}\} \subset \mathbb{R}^n$$

Autrement dit, c'est l'ensemble des antécédents de  $0_{\mathbb{R}^p}$  par l'application  $f$ .

?

#### Méthode 4 - Déterminer le noyau d'une application linéaire

Pour déterminer le noyau de l'application linéaire  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ , il s'agit de trouver l'ensemble des antécédents de  $0_{\mathbb{R}^p}$  par  $f$ , c'est-à-dire de résoudre l'équation  $f(u) = 0_{\mathbb{R}^p}$  d'inconnue  $u \in \mathbb{R}^n$ . Une rédaction appropriée peut être

« Soit  $u \in \mathbb{R}^n$ . On a

$$u \in \text{Ker}(f) \iff f(u) = 0_{\mathbb{R}^p} \iff \dots »$$

Exemple 2.2 Déterminer le noyau de l'application  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  définie par

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad f(x, y, z) = (2x - y, x + 3y - z)$$

Soit  $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ . On a

$$\begin{aligned} u \in \text{Ker}(f) &\iff f(u) = 0_{\mathbb{R}^2} \\ &\iff f(x, y, z) = (0, 0) \\ &\iff (2x - y, x + 3y - z) = (0, 0) \\ &\iff \begin{cases} 2x - y &= 0 \\ x + 3y - z &= 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Le système comporte plus d'inconnues (trois) que d'équations (deux). On choisit deux inconnues principales, par exemple  $x$  et  $y$ , que l'on exprime en fonction des deux autres, ici  $z$ , en appliquant

la méthode du **pivot de Gauss**.

$$\begin{aligned}
 u \in \text{Ker}(f) &\Leftrightarrow \begin{cases} x + 3y - z = 0 \\ 2x - y = 0 \end{cases} && L_2 \leftrightarrow L_1 \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x + 3y - z = 0 \\ -7y + 2z = 0 \end{cases} && L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x + 3y - z = 0 \\ y = \frac{2}{7}z \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{7}z \\ y = \frac{2}{7}z \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow u = \begin{pmatrix} \frac{1}{7}z \\ \frac{2}{7}z \\ z \end{pmatrix} \\
 &\Leftrightarrow u = z \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{7} \\ \frac{2}{7} \\ 1 \end{pmatrix} \\
 &\Leftrightarrow u \in \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} \frac{1}{7} \\ \frac{2}{7} \\ 1 \end{pmatrix}\right)
 \end{aligned}$$

Donc

$$\text{Ker}(f) = \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} \frac{1}{7} \\ \frac{2}{7} \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \text{Vect}((1, 2, 7))$$

Vérification : En particulier, le vecteur  $(1, 2, 7)$  est dans le noyau de  $f$  (le vecteur  $(2, 4, 14)$  aussi...). On peut vérifier que

$$f((1, 2, 7)) = (2 \times 1 - 2, 1 + 3 \times 2 - 7) = (0, 0) \quad \text{i.e.} \quad (1, 2, 7) \in \text{Ker}(f) \quad \checkmark$$

Comme illustré sur cet exemple, en dimension finie, la recherche du *noyau* d'une application linéaire peut toujours se ramener à la résolution d'un *système linéaire homogène*.

## 2.2 Lien entre le noyau d'une application linéaire et son injectivité

**Définition 2.3 — Rappel.** Soient  $E$  et  $F$  deux ensembles et  $f : E \rightarrow F$  une application. On dit que l'application  $f : E \rightarrow F$  est **injective** si

$$\forall (x, x') \in E^2, \quad f(x) = f(x') \quad \Rightarrow \quad x = x'$$

Autrement dit, tout élément de l'ensemble d'arrivée admet au plus un antécédent dans  $E$  par  $f$ .

**Proposition 2.4** Soit  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$ . On a

$$\text{L'application } f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p \text{ est injective} \quad \Leftrightarrow \quad \text{Ker}(f) = \{0_{\mathbb{R}^n}\}$$

Autrement dit, l'application  $f$  est injective si et seulement si l'élément  $0_{\mathbb{R}^p}$  admet un unique antécédent par  $f$  donné par  $0_{\mathbb{R}^n}$ .

Attention, cette propriété est fautive lorsque l'application n'est pas linéaire.

- Contre-exemple pour le sens indirect :  $x \mapsto x^2$  ou  $(x, y) \mapsto (x^2, y)$  (ou exemple avec les patates)
- Contre-exemple pour le sens direct :  $x \mapsto x + 1$  ou  $x \mapsto e^x$

### Méthode 5 - Déterminer si une application linéaire est injective

Pour déterminer si une application linéaire est injective,

- Étape 1 : Déterminer le noyau de l'application.
- Étape 2 : Conclure quant à l'injectivité
  - Si le noyau est réduit à l'élément neutre, alors la fonction est injective.
  - Si le noyau n'est pas réduit à l'élément neutre, alors la fonction n'est pas injective.

Exemple 2.5 Déterminer si l'application  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  est injective où  $f$  est définie par

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad f(x, y, z) = (2x - y, x + 3y - z)$$

- **Étape 1 : Déterminer le noyau de l'application.**

On a déjà montré que

$$\text{Ker}(f) = \text{Vect}((1, 2, 7))$$

- **Étape 2 : Conclure quant à l'injectivité**

L'application  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  n'est donc pas injective car son noyau n'est pas réduit à l'élément neutre (c'est-à-dire il y a d'autres éléments dans le noyau que  $(0, 0, 0)$  comme par exemple le vecteur  $(1, 2, 7)$ ).

Exemple 2.6 Déterminer si l'application  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  est injective où  $f$  est définie par

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = (x, 3x, x - y)$$

• **Étape 1 : Déterminer le noyau de l'application.**

On cherche à déterminer l'ensemble des solutions de l'équation  $f(u) = 0_{\mathbb{R}^3}$  d'inconnue  $u \in \mathbb{R}^2$ . Soit  $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ . On a,

$$\begin{aligned} u \in \text{Ker}(f) &\Leftrightarrow f(u) = 0_{\mathbb{R}^3} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x &= 0 \\ 3x &= 0 \\ x - y &= 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x &= 0 \\ y &= 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow u = (0, 0) \end{aligned}$$

Donc

$$\text{Ker}(f) = \{(0, 0)\}$$

• **Étape 2 : Conclure quant à l'injectivité**

L'application  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  est donc injective car son noyau est réduit à l'élément neutre, c'est-à-dire  $\text{Ker}(f) = \{(0, 0)\}$  (c'est-à-dire qu'il n'y a que le vecteur  $(0, 0)$  dans le noyau).

### 3 Image d'une application linéaire

#### 3.1 Définition de l'image d'une application linéaire

**Définition 3.1** Soit  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$ . On appelle **image** de l'application  $f$  l'ensemble

$$\text{Im}(f) = \{f(u) \mid u \in \mathbb{R}^n\} = \{v \in \mathbb{R}^p \mid \exists u \in \mathbb{R}^n, v = f(u)\} \subset \mathbb{R}^p$$

Autrement dit, c'est l'ensemble des valeurs prises par l'application  $f$ .

On appelle **rang** de l'application linéaire  $f$  la dimension de son image, c'est-à-dire

$$\text{rg}(f) = \dim(\text{Im}(f)).$$

**? Méthode 6 - Déterminer l'image d'une application linéaire**

Pour déterminer l'image de l'application linéaire  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ , il s'agit de trouver l'ensemble des vecteurs  $v$  de  $\mathbb{R}^p$  tel que l'équation  $v = f(u)$  d'inconnue  $u \in \mathbb{R}^n$  admette au moins une solution. Une rédaction appropriée peut être

« Soit  $v \in \mathbb{R}^p$ . On a

$$v \in \text{Im}(f) \Leftrightarrow \exists u \in \mathbb{R}^n, f(u) = v \Leftrightarrow \dots »$$

Exemple 3.2 Déterminer l'ensemble image de l'application  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  définie par

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad f(x, y, z) = (x + 2y + z, 3x - 3z, x + y)$$

On cherche à déterminer l'ensemble des vecteurs  $v \in \mathbb{R}^3$  tel que l'équation  $v = f(u)$  admet au moins une solution  $u \in \mathbb{R}^3$ . Soit  $v = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ .

$$\begin{aligned} v \in \text{Im}(f) &\Leftrightarrow \exists u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, f(u) = v \\ &\Leftrightarrow \exists u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \begin{cases} x + 2y + z = a \\ 3x - 3z = b \\ x + y = c \end{cases} \end{aligned}$$

Attention, dans ce système,  $a, b, c$  sont supposés connus et les inconnues sont  $x, y, z$ . On résout ce système grâce au **pivot de Gauss**.

$$\begin{aligned} v \in \text{Im}(f) &\Leftrightarrow \exists u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \begin{cases} x + 2y + z = a \\ -6y - 6z = b - 3a & L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1 \\ -y - z = c - a & L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \exists u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \begin{cases} x + 2y + z = a \\ -6y - 6z = b - 3a \\ 0 = -\frac{1}{2}a - \frac{1}{6}b + c & L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{6}L_2 \end{cases} \end{aligned}$$

- Lorsque  $-\frac{1}{2}a - \frac{1}{6}b + c \neq 0$ , c'est-à-dire lorsque  $3a + b - 6c \neq 0$ , ce système n'admet pas de solution (car incompatibilité sur la troisième ligne). Autrement dit, tous les triplets  $(a, b, c)$  tels que  $3a + b - 6c \neq 0$  ne sont pas dans  $\text{Im}(f)$ .
- Lorsque  $3a + b - 6c = 0$ , on peut continuer la résolution du système.

$$v \in \text{Im}(f) \Leftrightarrow \exists u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \begin{cases} x + 2y + z = a \\ -6y - 6z = b - 3a \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Maintenant le système a plus d'inconnues que d'équations : on choisit deux inconnues principales, par exemple  $x$  et  $y$  que l'on exprime en fonction de l'inconnue restante, ici  $z$ .

$$v \in \text{Im}(f) \Leftrightarrow \exists u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \begin{cases} x = \frac{1}{3}b + z \\ y = \frac{1}{2}a - \frac{1}{6}b + z \end{cases}$$

Ce système admet au moins une solution (il en admet même une infinité). Donc tous les triplets  $(a, b, c)$  tels que  $3a + b - 6c = 0$  sont dans  $\text{Im}(f)$ .

Finalement, on a montré que

$$v \in \text{Im}(f) \Leftrightarrow 3a + b - 6c = 0$$

Et donc,

$$\text{Im}(f) = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid 3a + b - 6c = 0\}.$$

Vérification : Par exemple, d'après nos calculs, le vecteur  $(1, -3, 0) \in \text{Im}(f)$  et un antécédent par  $f$  de ce vecteur est donné par  $(x, y, z) = (-1, 1, 0)$ .

$$f(-1, 1, 0) = (1, -3, 0) \quad \checkmark$$

### 3.2 Déterminer une base de l'image d'une application

**Proposition 3.3** Soit  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$ . Si  $(u_1, \dots, u_n)$  est une base de  $\mathbb{R}^n$  alors  $(f(u_1), \dots, f(u_n))$  est une famille génératrice de  $\text{Im}(f)$ , autrement dit,

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(u_1), \dots, f(u_n))$$

Attention, c'est faux lorsque l'application n'est pas linéaire. Contre-exemple :  $(x, y) \mapsto (x^2, y)$ .

#### ? Méthode 7 - Déterminer une base de l'image d'une application linéaire

Pour déterminer une base l'image de l'application linéaire  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ , on peut

- Choisir une base  $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_n)$  de l'espace de départ par exemple la base canonique de  $\mathbb{R}^n$ .
- Expliciter la famille  $\mathcal{G} = (f(u_1), \dots, f(u_n))$  en calculant les images des vecteurs de la base  $\mathcal{B}$ .
- Extraire une base de la famille  $\mathcal{G}$ .
  - Par construction, la famille  $\mathcal{G}$  est une famille génératrice de  $\text{Im}(f)$ .
  - Soit cette famille est libre et alors c'est une base.
  - Soit cette famille est liée et on "supprime des vecteurs" jusqu'à la rendre libre.

Exemple 3.4 Déterminer une base de l'image de l'application  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$  définie par

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad f(x, y, z) = (x + z, y - x, z + y, x + y + 2z)$$

#### • Étape 1 : Choisir une base de l'espace de départ

Soit  $(e_1, e_2, e_3)$  la base canonique de  $\mathbb{R}^3$ , c'est-à-dire

$$e_1 = (1, 0, 0) \quad e_2 = (0, 1, 0) \quad e_3 = (0, 0, 1)$$

#### • Étape 2 : Construire une famille génératrice de $\text{Im}(f)$

On peut déjà calculer que

$$v_1 = f(e_1) = (1, -1, 0, 1)$$

$$v_2 = f(e_2) = (0, 1, 1, 1)$$

$$v_3 = f(e_3) = (1, 0, 1, 2)$$

Comme  $(e_1, e_2, e_3)$  est une base de  $\mathbb{R}^3$ , par construction, la famille  $(v_1, v_2, v_3)$  est une famille génératrice  $\text{Im}(f)$ .

#### • Étape 3 : Extraire une base de $\text{Im}(f)$

On peut déjà remarquer que

$$v_3 = v_1 + v_2$$

Donc la famille  $(v_1, v_2, v_3)$  n'est pas libre (et donc n'est pas une base de  $\text{Im}(f)$ ). On peut "supprimer" le vecteur  $v_3$  qui est redondant.

Ainsi,

- La famille  $(v_1, v_2)$  reste une famille **génératrice** de  $\text{Im}(f)$  (car la famille  $(v_1, v_2, v_3)$  est une famille génératrice de  $\text{Im}(f)$  et que  $v_3$  est une combinaison linéaire des vecteurs  $v_1$  et  $v_2$ ).
- La famille  $(v_1, v_2)$  est **libre** (car les vecteurs  $v_1$  et  $v_2$  ne sont pas colinéaires, il n'existe pas de réel  $\lambda$  tel que  $v_2 = \lambda v_1$ ).
- Donc la famille  $(v_1, v_2)$  est une **base** de  $\text{Im}(f)$ .

### 3.3 Lien entre l'image d'une application linéaire et sa surjectivité

**Définition 3.5** Soient  $E$  et  $F$  deux ensembles et  $f : E \rightarrow F$  une application. On dit que l'application  $f : E \rightarrow F$  est **surjective** si

$$\forall y \in F, \quad \exists x \in E, \quad y = f(x).$$

Autrement dit, tout élément de l'ensemble d'arrivée admet au moins un antécédent dans  $E$  par  $f$ .

**Proposition 3.6** Soit  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$ . On a

$$\text{L'application } f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p \text{ est surjective} \quad \Leftrightarrow \quad \text{Im}(f) = \mathbb{R}^p$$

Vrai même si l'application n'est pas linéaire (réécriture de la notion de surjectivité).

#### ? Méthode 8 - Déterminer si une application linéaire est surjective

Pour déterminer si une application linéaire est injective,

- Étape 1 : Déterminer l'image de l'application.
- Étape 2 : Conclure quant à la surjectivité
  - Si l'image est tout l'ensemble d'arrivée, alors la fonction est surjective.
  - Si l'image n'est pas tout l'ensemble d'arrivée, alors la fonction n'est pas surjective.

**Exemple 3.7** Déterminer si l'application  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  est surjective où  $f$  est définie par

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad f(x, y, z) = (x + 2y + z, 3x - 3z, x + y)$$

#### • Étape 1 : Déterminer l'image de l'application.

On a déjà montré que

$$\text{Im}(f) = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid 3a + b - 6c = 0\}.$$

#### • Étape 2 : Conclure quant à la surjectivité

L'application  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  n'est donc pas surjective car son image ne vaut pas tout l'ensemble d'arrivée  $\mathbb{R}^3$ , c'est-à-dire  $\text{Im}(f) \neq \mathbb{R}^3$  (par exemple, le vecteur  $(1, 1, 1)$  est dans  $\mathbb{R}^3$  mais pas dans  $\text{Im}(f)$ ).

## 4 Théorème du rang et ses conséquences

### 4.1 Énoncé du théorème du rang

**Proposition 4.1 — Théorème du rang.** Soit  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$  une application linéaire. Alors

$$\dim(\mathbb{R}^n) = \dim(\text{Ker}(f)) + \text{rg}(f)$$

autrement dit,

$$n = \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)).$$

#### ? Méthode 9 - Déterminer le noyau et l'image d'une application linéaire

- Étape 1 : On commence par déterminer soit le noyau soit l'image de l'application linéaire (grâce aux Méthodes 4, 6 et 7) en choisissant celui qui semble le plus simple (ou celui qui est demandé en premier).
- Étape 2 : On utilise le théorème du rang pour déterminer la dimension de l'autre espace.
- Étape 3 : Puis, on détermine le second ensemble en utilisant l'information sur sa dimension.

**Exemple 4.2** On considère l'application linéaire suivante.

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\longmapsto (x + 2y, y - z) \end{aligned}$$

Déterminer l'image puis le noyau de cette application linéaire.

• **Étape 1 : Déterminer l'image de cette application linéaire (Méthode 7)**

- Étape 1.1 : On choisit une application de l'espace de départ  
Soit  $(e_1, e_2, e_3)$  la base canonique de  $\mathbb{R}^3$ , c'est-à-dire

$$u_1 = (1, 0, 0) \quad u_2 = (0, 1, 0) \quad u_3 = (0, 0, 1)$$

- Étape 1.2 : Construire une famille génératrice de  $\text{Im}(f)$   
On peut déjà calculer que

$$\begin{aligned}v_1 &= f(u_1) = (1, 0) \\v_2 &= f(u_2) = (2, 1) \\v_3 &= f(u_3) = (0, -1)\end{aligned}$$

Comme  $(u_1, u_2, u_3)$  est une base de  $\mathbb{R}^3$ , par construction, la famille  $(v_1, v_2, v_3)$  est une famille génératrice de  $\text{Im}(f)$ .

- Étape 1.3 : Extraire une base de  $\text{Im}(f)$   
On peut déjà remarquer que

$$v_2 = 2v_1 - v_3$$

Ainsi,

- \* La famille  $(v_1, v_3)$  reste une famille génératrice de  $\text{Im}(f)$ .
- \* La famille  $(v_1, v_3)$  est libre car les vecteurs  $v_1$  et  $v_3$  ne sont pas colinéaires.
- \* Donc la famille  $(v_1, v_3)$  est une base de  $\text{Im}(f)$ .
- \* Donc  $\text{Im}(f)$  est un sous-espace de  $\mathbb{R}^2$  de dimension 2.

• **Étape 2 : Déterminer la dimension du noyau de cette application linéaire**

D'après le théorème du rang,

$$\dim(\mathbb{R}^3) = \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f))$$

Donc, on obtient que

$$\dim(\text{Ker}(f)) = \dim(\mathbb{R}^3) - \dim(\text{Im}(f)) = 3 - 2 = 1$$

• **Étape 3 : Déterminer le noyau de cette application linéaire**

Comme le noyau est de dimension un, pour en trouver une base, il suffit d'exhiber un vecteur du noyau qui forme une famille libre (qui est donc non nul).

On peut commencer par remarquer que

$$(-2, 1, 1) \in \text{Ker}(f)$$

Donc par stabilité par combinaison linéaire de  $\text{Ker}(f)$ , on a

$$\text{Vect}((-2, 1, 1)) \subset \text{Ker}(f)$$

Or les deux ensembles sont de même dimension car,

- d'après l'Étape 2,  $\text{Ker}(f)$  est de dimension 1
- et  $\text{Vect}((-2, 1, 1))$  est de dimension 1 car
  - \* la famille  $((-2, 1, 1))$  en est une famille génératrice par construction
  - \* et est une famille libre car le vecteur  $(-2, 1, 1)$  est non nul.

Donc,

$$\text{Ker}(f) = \text{Vect}((-2, 1, 1))$$

et la famille

$$((-2, 1, 1))$$

est une base de  $\text{Ker}(f)$ .

Exemple 4.3 On considère l'application linéaire suivante.

$$f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \longmapsto (x + y + z, x - z, 2x - 2z)$$

Déterminer le noyau, le rang puis l'image de cette application linéaire.

• **Étape 1 : Déterminer le noyau de cette application linéaire (Méthode 4)**

On cherche à déterminer l'ensemble des solutions de l'équation  $f(x, y, z) = 0_{\mathbb{R}^3}$  d'inconnue  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ . Soit  $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ .

$$u \in \text{Ker}(f) \iff f(u) = 0_{\mathbb{R}^3}$$

$$\iff \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - z = 0 \\ 2x - 2z = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x + y + z = 0 \\ -y - 2z = 0 & L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ 0 = 0 & L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = z \\ y = -2z \end{cases}$$

$$\iff u = (z, -2z, z)$$

$$\iff u \in \text{Vect}((1, -2, 1))$$

Donc finalement,

$$\text{Ker}(f) = \text{Vect}((1, -2, 1))$$

Vérification : En particulier, le vecteur  $(1, -2, 1)$  est dans le noyau. On peut vérifier que

$$f(1, -2, 1) = (0, 0, 0) \quad \checkmark$$

On obtient donc que  $\text{Ker}(f)$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$  de dimension 1 car

- la famille  $((1, -2, 1))$  est une famille génératrice de  $\text{Ker}(f)$  par construction,
- la famille  $((1, -2, 1))$  est libre car le vecteur  $(1, -2, 1)$  n'est pas le vecteur nul.

• **Étape 2 : Déterminer la dimension de l'image de cette application linéaire**

D'après le théorème du rang,

$$\dim(\mathbb{R}^3) = \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f))$$

Donc, on obtient que

$$\dim(\text{Im}(f)) = \dim(\mathbb{R}^3) - \dim(\text{ker}(f)) = 3 - 1 = 2$$

Donc  $\text{Im}(f)$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$  de dimension 2, ou autrement dit,  $f$  est de rang 2.

• **Étape 3 : Déterminer l'image de cette application linéaire**

Comme l'image est de dimension deux, pour en trouver une base, il suffit d'exhiber deux vecteurs de l'image qui forme une famille libre (donc deux vecteurs colinéaires).

On peut commencer par remarquer que

$$(1, 2, 2) \in \text{Im}(f) \quad \text{car} \quad (1, 1, 2) = f(1, 0, 0)$$

et

$$(1, 0, 0) \in \text{Im}(f) \quad \text{car} \quad (1, 0, 0) = f(0, 1, 0)$$

Donc par stabilité par combinaison linéaire de  $\text{Im}(f)$ , on a

$$\text{Vect}((1, 2, 2), (1, 0, 0)) \subset \text{Im}(f)$$

Or les deux ensembles sont de même dimension car,

- d'après l'Étape 2,  $\text{Im}(f)$  est de dimension 2
- et  $\text{Vect}((1, 2, 2), (1, 0, 0))$  est de dimension 2 car
  - \* la famille  $((1, 2, 2), (1, 0, 0))$  en est une **famille génératrice** par construction
  - \* et est une **famille libre car les vecteurs ne sont pas colinéaires**

Donc,

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}((1, 2, 2), (1, 0, 0))$$

et la famille

$$((1, 2, 2), (1, 0, 0))$$

est une base de  $\text{Im}(f)$ .

#### 4.2 Conséquence pour la bijectivité d'une application linéaire

**Proposition 4.4** Soit  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$  une application linéaire. Si  $n = p$  alors

$$f \text{ injective} \iff f \text{ surjective} \iff f \text{ bijective}$$

Autrement dit, si  $n = p$  alors

$$\text{Ker}(f) = \{0_{\mathbb{R}^n}\} \iff \text{rg}(f) = n \iff f \text{ bijective}$$

Exemple 4.5 On considère l'application linéaire suivante.

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto (x + y + z, x - z, 2x + y + z) \end{aligned}$$

Montrer que cette application linéaire est bijective.

Déterminons le noyau de cette application linéaire (*Méthode 4*) On cherche à déterminer l'ensemble des solutions de l'équation  $f(x, y, z) = 0_{\mathbb{R}^2}$  d'inconnue  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ . Soit  $u = (x, y, z) \in$

$\mathbb{R}^3$ .

$$\begin{aligned} u \in \text{Ker}(f) &\Leftrightarrow f(u) = 0_{\mathbb{R}^3} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - z = 0 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = 0 \\ -y - 2z = 0 & L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ -y - z = 0 & L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = 0 \\ -y - 2z = 0 \\ z = 0 & L_2 \leftarrow L_3 - L_2 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Donc finalement,

$$\text{Ker}(f) = \{(0, 0, 0)\}$$

Vérification : En particulier, le vecteur  $(0, 0, 0)$  est dans le noyau. On peut vérifier que  $f(0, 0, 0) = (0, 0, 0)$  (toujours vrai pour une application linéaire).

On obtient donc que

- $\text{Ker}(f)$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$  de dimension 0
- Donc que l'application  $f$  est injective.
- Et donc que l'application  $f$  est bijective car la dimension de l'espace de départ et d'arrivée est la même.