

Chapitre 2 : Fonctions usuelles

1 La fonction inverse


Définition 1.1 La fonction *inverse* est la fonction suivante :

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^* &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{1}{x} \end{aligned}$$

Proposition 1.2 — Propriétés de la fonction inverse.

- Le domaine de définition de la fonction inverse est $\mathbb{R}^*$.
- La fonction inverse est **impaire** sur $\mathbb{R}^*$.
- La fonction inverse est **strictement décroissante** sur $] -\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$.
- La fonction inverse **n'admet pas de majorant ni pas de minorant** sur $\mathbb{R}^*$.
- La fonction inverse est **dérivable** sur $] -\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$ et sa dérivée est donnée par

$$\text{pour tout } x \in \mathbb{R}^*, \quad f'(x) = -\frac{1}{x^2}$$



2 La fonction racine carrée

Définition 2.1 La fonction *racine carrée* est la fonction suivante :


$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}_+ &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \sqrt{x} \end{aligned}$$

où pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, le réel $y = \sqrt{x}$ est l'unique réel positif tel que $y^2 = x$.

Proposition 2.2 — Propriétés de la fonction racine carrée.

- Le domaine de définition de la fonction racine carrée est $\mathbb{R}_+$.
- La fonction racine carrée est **ni paire, ni impaire** sur $\mathbb{R}_+$.
- La fonction racine carrée est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}_+$.
- La fonction racine carrée **n'admet pas de majorant** sur $\mathbb{R}_+$ mais est minorée par 0 (ou par $-1, \dots$) sur $\mathbb{R}_+$.
- La fonction racine carrée est **dérivable** sur $]0, +\infty[$ et sa dérivée est donnée par

$$\text{pour tout } x \in]0, +\infty[, \quad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$



Proposition 2.3 — Règles de calcul sur les racines carrées. Soient a et b des entiers positifs. On a :

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}, \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \text{ (si } b \neq 0), \quad (\sqrt{a})^2 = a$$

On a aussi,

$$\sqrt{a^2} = |a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{sinon.} \end{cases}$$



On ne dispose pas de règles pour l'addition de deux racines. De manière générale,

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}.$$

Par exemple,

$$\sqrt{1+1} = \sqrt{2} \quad \text{alors que} \quad \sqrt{1} + \sqrt{1} = 1 + 1 = 2.$$

Exercice 2.4 Écrire ces nombres sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers et b le plus petit possible.

a. $\sqrt{1300}$ b. $3\sqrt{2} \times (-4\sqrt{10})$, c. $5\sqrt{3} + 4\sqrt{75} - 3\sqrt{48}$ d. $\frac{\sqrt{480}}{\sqrt{2} \times \sqrt{20}}$



Gestes Invisibles/Automatismes. Pour simplifier une racine carrée, il faut décomposer le nombre sous la racine en produit de nombres et faire apparaître des carrés.

$$\begin{aligned} \text{a. } \sqrt{1300} &= \sqrt{13 \times 10^2} = 10\sqrt{13} \\ \text{b. } 3\sqrt{2} \times (-4\sqrt{10}) &= -12\sqrt{5 \times 2^2} = -24\sqrt{5} \\ \text{c. } 5\sqrt{3} + 4\sqrt{75} - 3\sqrt{48} &= 5\sqrt{3} + 4\sqrt{3 \times 5^2} - 3\sqrt{3 \times 4^2} = 13\sqrt{3} \\ \text{d. } \frac{\sqrt{480}}{\sqrt{2} \times \sqrt{20}} &= \sqrt{\frac{2 \times 6 \times 4 \times 10}{2 \times 2 \times 10}} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

Exercice 2.5 Montrer que $\sqrt{117} + \sqrt{13} = \sqrt{208}$.



Gestes Invisibles/Automatismes. Attention, les racines carrées se comportent mal avec l'addition ! Comme les nombres sont positifs, il est plus équivalent (et plus facile) de montrer l'égalité des carrés des deux nombres. Plus précisément,

$$\sqrt{117} + \sqrt{13} = \sqrt{208} \quad \Leftrightarrow (\sqrt{117} + \sqrt{13})^2 = 208$$

En développant l'identité remarquable, on obtient,

$$\begin{aligned} (\sqrt{117} + \sqrt{13})^2 &= (\sqrt{117})^2 + 2\sqrt{117} \times \sqrt{13} + (\sqrt{13})^2 \\ &= 117 + 2\sqrt{117 \times 13} + 13 \\ &= 130 + 2\sqrt{3^2 \times 13^2} \\ &= 130 + 2 \times 3 \times 13 \\ &= 208 \end{aligned}$$


3 La fonction valeur absolue

3.1 La valeur absolue

Définition 3.1 Soit $x \in \mathbb{R}$. La *valeur absolue* de x , notée $|x|$, est le réel défini par

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

? La valeur absolue de x représente la distance entre 0 et le nombre x sur la droite réelle.



Exemple 3.2 On a

$$|17| = 17, \quad |-3| = 3, \quad \left| -\frac{1}{3} \right| = \frac{1}{3}, \quad |\pi - 3| = \pi - 3, \quad |\sqrt{2} - 2| = 2 - \sqrt{2}$$

Exemple 3.3 Considérons la fonction suivante

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto |3 - 2x| \end{aligned}$$

Donner une expression de f sans utiliser de valeur absolue.

En faisant une disjonction de cas selon le signe de $3 - 2x$, on obtient le raisonnement suivant.

- Lorsque $3 - 2x \geq 0$, c'est-à-dire $x \leq \frac{3}{2}$, on a $f(x) = |3 - 2x| = 3 - 2x$.
- Lorsque $3 - 2x \leq 0$, c'est-à-dire $x \geq \frac{3}{2}$, on a $f(x) = |3 - 2x| = -(3 - 2x) = -3 + 2x$.

Donc, finalement, la fonction f s'écrit

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \begin{cases} 3 - 2x & \text{si } x \leq \frac{3}{2} \\ -3 + 2x & \text{si } x \geq \frac{3}{2} \end{cases} \end{aligned}$$


3.2 La fonction valeur absolue

Définition 3.4 La fonction *valeur absolue* est la fonction suivante :

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto |x| \end{aligned}$$

Proposition 3.5 — Propriétés de la fonction valeur absolue.

- Le domaine de définition de la fonction valeur absolue est $\mathbb{R}$.
- La fonction valeur absolue est **paire** sur $\mathbb{R}$.
- La fonction valeur absolue est **strictement décroissante** sur $] -\infty, 0]$ et **strictement croissante** sur $[0, +\infty[$.
- La fonction valeur absolue **n'admet pas de majorant** sur $\mathbb{R}$ mais est **minorée** par 0 (ou par -1 ou ...) sur $\mathbb{R}$.



3.3 Règles de calcul pour la valeur absolue

Proposition 3.6 — Règles de calcul pour la valeur absolue.

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $|x| \geq 0$.
2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $|-x| = |x|$.
3. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a $|xy| = |x| \times |y|$.
4. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on a $|x^n| = |x|^n$.
5. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R}^*$, on a $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$.



Attention, $|x + y| \neq |x| + |y|$. Par exemple,


$$|-1 + 2| = |1| = 1 \quad \text{alors que} \quad |-1| + |2| = 1 + 2 = 3.$$

Proposition 3.7 — Inégalité triangulaire. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. On a

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$



Ce théorème traduit le fait que la distance la plus courte entre deux points est la ligne droite : le plus efficace pour aller d'un point A à un point B est d'aller tout droit, sans passer par un troisième point C qui ne serait pas sur la ligne droite.



Exemple 3.8 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a

$$\left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \frac{|(-1)^n|}{|n|} = \frac{|-1|^n}{|n|} = \frac{1^n}{n} = \frac{1}{n}.$$

Exemple 3.9 Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\left| (-1)^n + \frac{1}{n} \right| \leq 2.$$



Gestes Invisibles/Automatismes. On doit majorer la valeur absolue d'une somme : on utilise l'inégalité triangulaire.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En utilisant l'inégalité triangulaire, on obtient,

$$\left| (-1)^n + \frac{1}{n} \right| \leq |(-1)^n| + \left| \frac{1}{n} \right|$$

Or, $|(-1)^n| = 1$ et $\left| \frac{1}{n} \right| = \frac{1}{n}$. Donc on obtient,

$$\left| (-1)^n + \frac{1}{n} \right| \leq 1 + \frac{1}{n}$$

Or, $n \geq 1$ donc, par décroissance de la fonction inverse sur $]0, +\infty[$, $\frac{1}{n} \leq 1$. Donc, finalement, on obtient,

$$\left| (-1)^n + \frac{1}{n} \right| \leq 1 + \frac{1}{n} \leq 1 + 1 = 2$$

3.4 Résolution d'équations et inéquations impliquant la valeur absolue

Proposition 3.10 — Équation avec valeur absolue. Soient $x \in \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}_+^*$. On a


$$|x| = a \iff x = a \text{ ou } x = -a.$$

Exemple 3.11 Résoudre l'équation $|3 + x| = 4$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a

$$\begin{aligned} |3 + x| = 4 &\iff 3 + x = 4 \text{ ou } 3 + x = -4 \\ &\iff x = 1 \text{ ou } x = -7 \end{aligned}$$

Cette équation admet exactement deux solutions, données par 1 et -7.




Proposition 3.12 — Inéquation avec valeur absolue. Soient $x \in \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}_+^*$. On a

1. $|x| \leq a \iff -a \leq x \leq a.$
2. $|x| \geq a \iff x \geq a \text{ ou } x \leq -a.$

Les mêmes équivalences sont vraies avec des inégalités strictes à la place des inégalités larges.

? Résoudre l'inéquation $|x| \leq a$ revient à chercher les points dont la distance à zéro est inférieure à a .



Résoudre l'inéquation $|x| \geq a$ revient à chercher les points dont la distance à zéro est supérieure à a .




Exemple 3.13 Résoudre l'inéquation $|2x - 1| \leq 4$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a

$$\begin{aligned} |2x - 1| \leq 4 &\iff -4 \leq 2x - 1 \leq 4 \\ &\iff -3 \leq 2x \leq 5 \\ &\iff -\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{5}{2} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est donné par l'intervalle

$$\left[-\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right]$$




Exemple 3.14 Résoudre l'inéquation $|x - 7| > 2$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a

$$\begin{aligned} |x - 7| > 2 &\iff x - 7 > 2 \text{ ou } x - 7 < -2 \\ &\iff x > 9 \text{ ou } x < 5 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est donné par l'intervalle

$$]-\infty, 5[\cup]9, \infty[$$



4 La fonction partie entière

Définition 4.1 Soit $x \in \mathbb{R}$. Il existe un unique $n \in \mathbb{Z}$ tel que $n \leq x < n + 1$. Cet entier n est appelé la *partie entière* de x et est noté $\lfloor x \rfloor$. Autrement dit, la partie entière de x est le plus grand entier relatif inférieur ou égal à x .

Exemple 4.2 Calculer les parties entières suivantes.

$$\lfloor 2.5 \rfloor = 2, \quad \lfloor -1.3 \rfloor = -2, \quad \lfloor 1 \rfloor = 1, \quad \lfloor \pi \rfloor = 3.$$

Définition 4.3 La fonction *partie entière* est la fonction suivante :


$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \lfloor x \rfloor \end{array}$$

Proposition 4.4 — Propriétés de la fonction partie entière.

- Le domaine de définition de la fonction partie entière est $\mathbb{R}$.
- La fonction partie entière est **ni paire, ni impaire** sur $\mathbb{R}$.
- La fonction partie entière est **croissante** sur $\mathbb{R}$.
- La fonction partie entière **n'admet pas de majorant ni de minorant** sur $\mathbb{R}$.



La fonction partie entière n'est pas strictement croissante sur $\mathbb{R}$ car $2 < 2.5$ mais $\lfloor 2 \rfloor = 2 = \lfloor 2.5 \rfloor$. Elle est constante sur tous les intervalles de la forme $[n, n + 1[$, avec $n \in \mathbb{Z}$. On dit qu'elle est constante par morceaux.



La fonction partie entière est une fonction en escalier, elle est discontinue en tout $n \in \mathbb{Z}$.

Proposition 4.5 Soit $x \in \mathbb{R}$. La partie entière de x vérifie l'inégalité suivante :

$$x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x.$$

Démonstration. Par définition, la partie entière vérifie les deux inégalités suivantes :

$$\lfloor x \rfloor \leq x \quad \text{et} \quad x < \lfloor x \rfloor + 1.$$

On en déduit donc que

$$\lfloor x \rfloor \leq x \quad \text{et} \quad x - 1 < \lfloor x \rfloor,$$

ce qui donne le résultat. ■

5 La fonction logarithme

Définition 5.1 La fonction *logarithme népérien*, notée $\ln$, est l'unique primitive de la fonction inverse sur l'intervalle $]0, +\infty[$ qui s'annule en 1. Autrement dit, pour tout $x \in]0, +\infty[$, on a

$$\ln(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt.$$


Proposition 5.2 — Valeurs particulières.

1. Par définition, on a $\ln(1) = 0$.
2. Il existe un unique réel $e \in]0, +\infty[$ tel que $\ln(e) = 1$. On a $2 < e < 3$ (en fait $e \approx 2.72$). Ce nombre est appelé le nombre d'Euler.

Proposition 5.3 — Propriétés de la fonction logarithme.

- Le domaine de définition du logarithme est $]0, +\infty[$.
- La fonction logarithme est *ni paire, ni impaire* sur $]0, +\infty[$.
- La fonction logarithme est *strictement croissante* sur $]0, +\infty[$.
- La fonction logarithme *n'admet pas de majorant, ni de minorant* sur $]0, +\infty[$.
- La fonction logarithme est *dérivable* sur $]0, +\infty[$ et sa dérivée est donnée par

$$\text{pour tout } x > 0, \quad f'(x) = \frac{1}{x}.$$



Proposition 5.4 — Relation fondamentale. Pour tout $(x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$, on a

$$\ln(x \times y) = \ln(x) + \ln(y).$$

Proposition 5.5 — Propriétés algébriques. Soient $(x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ et $n \in \mathbb{N}$. On a

$$\text{a. } \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$$

$$\text{b. } \ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$$

$$\text{c. } \ln(x^n) = n\ln(x)$$

$$\text{d. } \ln(\sqrt{x}) = \frac{1}{2}\ln(x)$$

Démonstration. Prouvons la première propriété. Soit $x \in]0, +\infty[$. Comme $\frac{1}{x}$ est dans $]0, +\infty[$, $\ln\left(\frac{1}{x}\right)$ est bien défini. De plus, en utilisant la relation de la Proposition 5.4, on a

$$\ln(1) = \ln\left(x \times \frac{1}{x}\right) = \ln(x) + \ln\left(\frac{1}{x}\right).$$

Or $\ln(1) = 0$ donc on obtient

$$\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x).$$

■

Exemple 5.6 Écrire $\ln(12)$ et $\ln\left(\frac{16}{3}\right)$ sous la forme $a\ln(2) + b\ln(3)$ (avec a et b des entiers relatifs).

En décomposant en produits le nombre à l'intérieur du logarithme, on obtient,

$$\ln(12) = \ln(2^2 \times 3) = \ln(2^2) + \ln(3) = 2\ln(2) + \ln(3)$$

$$\ln\left(\frac{16}{3}\right) = \ln(16) - \ln(3) = \ln(2^4) - \ln(3) = 4\ln(2) - \ln(3)$$

Exemple 5.7 Simplifier au maximum le nombre

$$A = \frac{1}{2}\ln(125) - 2\ln(5) + \ln(\sqrt{5})$$

• **Première manière de faire (en «séparant au maximum les logarithmes»).** On a,

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2}\ln(125) - 2\ln(5) + \ln(\sqrt{5}) \\ &= \frac{1}{2}\ln(5^3) - 2\ln(5) + \ln(5^{\frac{1}{2}}) \\ &= \frac{3}{2}\ln(5) - 2\ln(5) + \frac{1}{2}\ln(5) \\ &= 0 \end{aligned}$$

• **Deuxième manière de faire (en «regroupant au maximum les logarithmes»).** On a,

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2}\ln(125) - 2\ln(5) + \ln(\sqrt{5}) \\ &= \ln(\sqrt{125}) - \ln(5^2) + \ln(\sqrt{5}) \\ &= \ln\left(\frac{\sqrt{125} \times \sqrt{5}}{5^2}\right) \\ &= \ln\left(\frac{\sqrt{5^3} \times \sqrt{5}}{5^2}\right) \\ &= \ln\left(\frac{5\sqrt{5} \times \sqrt{5}}{5^2}\right) \\ &= \ln\left(\frac{5 \times 5}{5^2}\right) \\ &= \ln(1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Proposition 5.8 — Logarithme et inégalité. Soit $(x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$. On a

$$\ln(x) = \ln(y) \Leftrightarrow x = y, \quad \ln(x) \leq \ln(y) \Leftrightarrow x \leq y, \quad \ln(x) \geq \ln(y) \Leftrightarrow x \geq y.$$

Exemple 5.9 Résoudre l'équation $\ln(4x - 1) = \ln(2 - x)$ d'inconnue x en précisant au préalable le domaine de validité de cette équation.

- Cette équation est licite si et seulement si

$$4x - 1 > 0 \quad \text{et} \quad 2 - x > 0$$

c'est-à-dire

$$x > \frac{1}{4} \quad \text{et} \quad x < 2$$

Donc, cette équation est valable sur l'intervalle $\left] \frac{1}{4}, 2 \right[$.

- Soit $x \in \left] \frac{1}{4}, 2 \right[$. En raisonnant par équivalence, on obtient,

$$\begin{aligned} \ln(4x - 1) = \ln(2 - x) &\Leftrightarrow 4x - 1 = 2 - x \\ &\Leftrightarrow 5x = 3 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

Finalement, cette équation admet une unique solution donnée par $\frac{3}{5}$.

✚ Vérification.

$$\text{D'une part, } \ln\left(4 \times \frac{3}{5} - 1\right) = \ln\left(\frac{7}{5}\right) \quad \text{et d'autre part, } \ln\left(2 - \frac{3}{5}\right) = \ln\left(\frac{7}{5}\right) \quad \checkmark$$

Exemple 5.10 Résoudre l'inéquation $3^{2n} > 10^8$ d'inconnue $n \in \mathbb{N}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. En raisonnant par équivalence, on obtient,

$$\begin{aligned} 3^{2n} > 10^8 &\Leftrightarrow \ln(3^{2n}) > \ln(10^8) && \text{car la fct log strict. croissante sur }]0, +\infty[\\ &\Leftrightarrow 2n \ln(3) > 8 \ln(10) \\ &\Leftrightarrow n > \frac{8 \ln(10)}{2 \ln 3} && \text{car } \ln(3) > 0 \\ &\Leftrightarrow n > \frac{4 \ln(10)}{\ln 3} \end{aligned}$$

Or,

$$\frac{4 \ln(10)}{\ln 3} \approx 8.38$$

Donc, l'ensemble des solutions de cette inéquation est donnée par,

$$\{9, 10, \dots\} = \{n \in \mathbb{N}, n \geq 9\}$$

6 La fonction exponentielle

Définition 6.1 Pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe un unique t dans $]0, +\infty[$ tel que $\ln(t) = x$, que l'on note $\exp(x)$ ou e^x . On a donc

$$\text{pour tout } x \text{ dans } \mathbb{R}, \quad \ln(\exp(x)) = x.$$

La fonction *exponentielle* est la fonction suivante :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \exp(x) \end{array}$$

Proposition 6.2 Soient $x \in \mathbb{R}$ et $t \in]0, +\infty[$. On a

$$\ln(t) = x \quad \Leftrightarrow \quad t = \exp(x).$$


En particulier,

$$\text{pour tout } t \text{ dans }]0, +\infty[, \quad \exp(\ln(t)) = t.$$

Proposition 6.3 — Propriétés de la fonction exponentielle.

- Le domaine de définition de la fonction exponentielle est $\mathbb{R}$.
- La fonction exponentielle est **ni paire, ni impaire** sur $\mathbb{R}$.
- La fonction exponentielle est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.
- La fonction exponentielle **n'admet pas de majorant** sur $\mathbb{R}$ mais est **minorée par 0** sur $\mathbb{R}$.
- La fonction exponentielle est **dérivable** sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est donnée par,

$$\text{pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = \exp(x)$$



Les courbes représentatives des fonctions exponentielle et logarithme sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$.

Proposition 6.4 — Valeurs particulières.

1. On a $\exp(0) = 1$.
2. On a $\exp(1) = e$ (on rappelle que $e \approx 2.72$ est appelé le nombre d'Euler).

Proposition 6.5 — Relation fondamentale. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$\exp(x + y) = \exp(x) \times \exp(y).$$

Proposition 6.6 — Propriétés algébriques. Soient $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et $n \in \mathbb{N}$. On a

$$\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}, \quad \exp(x - y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}, \quad \exp(nx) = (\exp(x))^n$$

? Ces propriétés algébriques sont les mêmes que pour les puissances, cela justifie la notation $\exp(x) = e^x$:

$$e^x \times e^y = e^{x+y}, \quad (e^x)^n = e^{nx}, \quad \frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}, \quad \frac{1}{e^x} = e^{-x}.$$

Exemple 6.7 Écrire $e^5 e^{-4} e^2$ et $\frac{1}{e^6 e^4}$ sous la forme e^k avec k le plus simple possible.

$$e^5 e^{-4} e^2 = e^{5-4+2} = e^3.$$

$$\frac{1}{e^6 e^4} = e^{-6} e^{-4} = e^{-6-4} = e^{-10}$$

Exemple 6.8 Soit $x \in \mathbb{R}$. Développer l'expression $(4e^x + e^{-x})^2$ et factoriser $e^{9x} + e^{2x}$.

$$(4e^x + e^{-x})^2 = (4e^x)^2 + 2 \times 4e^x e^{-x} + (e^{-x})^2 = 16e^{2x} + 8 + e^{-2x}$$

$$e^{9x} + e^{2x} = e^{7x+2x} + e^{2x} = e^{7x} e^{2x} + e^{2x} = e^{2x} (e^{7x} + 1).$$

Exemple 6.9 On définit la fonction ch par,

$$\text{pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad \text{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

Calculer $\text{ch}(\ln 2)$.

Par définition de la fonction ch , on obtient directement que

$$\text{ch}(\ln(2)) = \frac{e^{\ln 2} + e^{-\ln(2)}}{2} = \frac{2 + e^{\ln(\frac{1}{2})}}{2} = \frac{2 + \frac{1}{2}}{2} = \frac{5}{4}$$

Exemple 6.10 Montrer que,

$$\text{pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad -x + \ln(1 + e^x) = \ln(e^{-x} + 1).$$

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a,

$$\begin{aligned} -x + \ln(1 + e^x) &= \ln(\exp(-x)) + \ln(1 + e^x) \\ &= \ln(e^{-x} \times (1 + e^x)) \\ &= \ln(e^{-x} + e^{-x+x}) \\ &= \ln(e^{-x} + 1) \end{aligned}$$

7 Les fonctions puissances entières

Définition 7.1 Soit n un entier naturel. La fonction *puissance n* est la fonction suivante

$$\begin{aligned}\mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x^n\end{aligned}$$

où, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^n = \underbrace{x \times x \times \cdots \times x}_n$. Par convention, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^0 = 1$.

Exercice 7.2 Calculer les puissances suivantes.

$$2^0 = 1$$

$$5^1 = 5$$

$$(-6)^1 = -6$$

$$2^4 = 16$$

$$(-5)^3 = -125$$

$$(-1)^n = \begin{cases} 1 & \text{si } n \text{ est pair} \\ -1 & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

Proposition 7.3 — Propriétés de la fonction puissance entière, cas pair.



- Le domaine de définition de la fonction puissance est $\mathbb{R}$.
- La fonction puissance est **paire** sur $\mathbb{R}$.
- La fonction puissance est **strictement décroissante** sur $] -\infty, 0]$ et **strictement croissante** sur $[0, +\infty[$.
- La fonction puissance **n'admet pas de majorant** sur $\mathbb{R}$ mais est minorée par 0 sur $\mathbb{R}$.
- La fonction puissance est **dérivable** sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est donnée par

$$\text{pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = nx^{n-1}$$

Proposition 7.4 — Propriétés de la fonction puissance entière, cas impair.

- Le domaine de définition de la fonction puissance est $\mathbb{R}$.
- La fonction puissance est **impaire**.
- La fonction puissance est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.
- La fonction puissance **n'admet pas de majorant, pas de minorant et pas d'extrema**.
- La fonction puissance est **dérivable** sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est donnée par

$$\text{pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = nx^{n-1}$$



Proposition 7.5 — Règles de calcul sur les puissances. Soient a, b des réels non nuls et n, m des entiers.

$$\text{a. } a^n \times a^m = a^{n+m}$$

$$\text{b. } (a^n)^m = a^{n \times m}$$

$$\text{c. } \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$\text{d. } (a \times b)^n = a^n \times b^n$$

$$\text{e. } \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$\text{f. } a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Exercice 7.6 Soient x, y deux nombre réel. Simplifier les expressions suivantes.

$$x^2 \times x^3 = (x \times x) \times (x \times x \times x) = x^{2+3} = x^5$$

$$(x^2)^3 = x^2 \times x^2 \times x^2 = x \times x \times x \times x \times x \times x \times x \times x = x^{2 \times 3} = x^6$$

$$\frac{2^7}{2^5} = \frac{\cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{2} \times 2 \times 2}{\cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{2}} = 2^{7-5} = 2^2 = 4$$

$$(xy^2)^2 = (x \times y^2)^2 = x^2 \times (y^2)^2 = x^2 \times y^{2 \times 2} = x^2 y^4$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{2 \times 2 \times 2}{3 \times 3 \times 3} = \frac{8}{27}$$

Exercice 7.7 Exprimer le nombre suivant sous la forme d'un produit de puissances de 2, de 3 et de 5.

$$A = \frac{5^7 \times 10^{-4} \times 3^9}{10^{-5} \times 3^7 \times 5^{10}}$$

On a,

$$\begin{aligned} A &= \frac{5^7 \times 10^{-4} \times 3^9}{10^{-5} \times 3^7 \times 5^{10}} \\ &= \frac{5^7 \times (2 \times 5)^{-4} \times 3^9}{(2 \times 5)^{-5} \times 3^7 \times 5^{10}} \\ &= 5^{7-4-(-5)+10} \times 2^{-4-(-5)} \times 3^{9-7} \\ &= 5^{-2} \times 2^1 \times 3^2 \end{aligned}$$

Exercice 7.8 Soient x un réel et y un nombre réel non nul. Simplifier l'expression suivante.

$$\left(\frac{2(xy)^2}{y^3}\right)^4 = \left(\frac{2x^2y^2}{y^3}\right)^4 = \left(\frac{2x^2}{y}\right)^4 = \frac{16x^8}{y^4}$$

Exercice 7.9 Soient x et y deux réels non nuls. Écrire sous la forme d'une unique fraction l'expression suivante.

$$\left(\frac{1}{xy}\right)^2 - \frac{3}{yx^4} = \frac{1}{x^2y^2} - \frac{3}{yx^4} = \frac{x^2 - 3y}{x^4y^2}$$

8 Les fonctions puissances réelles

La propriété du logarithme $\ln(x^n) = n \ln(x)$ entraîne, en composant par l'exponentielle, que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$ et tout $n \in \mathbb{Z}$,

$$x^n = \exp(n \ln(x)).$$

Cela nous permet d'étendre la notion de puissance pour des valeurs de n non entières et pour des réels x strictement positifs.

Définition 8.1 Soit a un réel. La fonction *puissance* a est la fonction suivante

$$\begin{array}{ccc}]0, +\infty[& \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x^a = \exp(a \ln(x)) \end{array}$$

Exemple 8.2 Soient $x \in]0, +\infty[$ et $a \in \mathbb{R}$.

$$x^1 = x, \quad x^0 = 1, \quad x^\pi = e^{\pi \ln(x)}, \quad 1^a = 1$$

Proposition 8.3

1. Lorsque a est un entier, la fonction puissance a coïncide avec la fonction puissance définie pour les entiers, c'est-à-dire que, pour tout $x > 0$,

$$x^n = \underbrace{x \times x \times \cdots \times x}_{n \text{ fois}} = e^{n \ln(x)}.$$

2. La fonction puissance $\frac{1}{2}$ coïncide avec la fonction racine carrée, c'est-à-dire que pour tout $x > 0$, on a

$$x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}.$$

3. La fonction puissance -1 coïncide avec la fonction inverse, c'est-à-dire que pour tout $x > 0$, on a

$$x^{-1} = \frac{1}{x}.$$

On retrouve les mêmes propriétés algébriques que pour les puissances entières.

Proposition 8.4 — Règles de calcul sur les puissances. Soient $(x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ et $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On a

$$\begin{array}{lll} 1. x^a \times x^b = x^{a+b} & 2. (x^a)^b = x^{a \times b} & 3. \frac{x^a}{x^b} = x^{a-b} \\ 4. (x \times y)^a = x^a \times y^a & 5. \left(\frac{x}{y}\right)^a = \frac{x^a}{y^a} & 6. x^{-a} = \frac{1}{x^a} \end{array}$$

Les règles de calcul concernant les fonctions exponentielle, logarithme et puissances entières s'étendent aux puissances non entières.

Proposition 8.5

1. Pour tout a réel et $x > 0$, on a $\ln(x^a) = a \ln(x)$.
2. Pour tout a réel et $x \in \mathbb{R}$, on a $(e^x)^a = e^{ax}$.

Exemple 8.6 Calculer les puissances suivantes.

$$2^{\frac{1}{3}} 2^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}} = 2^{\frac{7}{12}}$$

$$(5^{\frac{1}{4}})^4 = 5^{\frac{1}{4} \times 4} = 5^1 = 5$$

$$2^{\frac{1}{4}} 3^{\frac{1}{4}} = (2 \times 3)^{\frac{1}{4}} = 6^{\frac{1}{4}}$$

$$\left(\frac{3}{8}\right)^{\frac{1}{3}} = \frac{3^{\frac{1}{3}}}{8^{\frac{1}{3}}} = \frac{3^{\frac{1}{3}}}{(2^3)^{\frac{1}{3}}} = \frac{3^{\frac{1}{3}}}{2}$$


Cas où $a > 0$

Par exemple, les fonctions $x \mapsto x$, $x \mapsto \sqrt{x}$, $x \mapsto x^2$, $x \mapsto x^{\frac{1}{3}}$, ...

Proposition 8.7 — Propriétés de la fonction puissance, cas $a > 0$.

- Le domaine de définition de la fonction puissance est $]0, +\infty[$.
- La fonction puissance est **ni paire, ni impaire** sur $]0, +\infty[$.
- La fonction puissance est **strictement croissante** sur $]0, +\infty[$.
- La fonction puissance **n'admet pas de majorant** sur $]0, +\infty[$ mais est minorée par 0 sur $]0, +\infty[$.
- La fonction puissance est **dérivable** sur $]0, +\infty[$ et sa dérivée est donnée par

$$\text{pour tout } x > 0, \quad f'(x) = ax^{a-1}$$



Cas où $a < 0$

Par exemple, les fonctions $x \mapsto \frac{1}{x}$, $x \mapsto \frac{1}{x^2}$, $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$, ...

Proposition 8.8 — Propriétés de la fonction puissance, cas $a < 0$.

- Le domaine de définition de la fonction puissance est $]0, +\infty[$.
- La fonction puissance est **ni paire, ni impaire** sur $]0, +\infty[$.
- La fonction puissance est **strictement décroissante** sur $]0, +\infty[$.
- La fonction puissance **n'admet pas de majorant** sur $]0, +\infty[$ mais est minorée par 0 sur $]0, +\infty[$.
- La fonction puissance est **dérivable** sur $]0, +\infty[$ et sa dérivée est donnée par

$$\text{pour tout } x > 0, \quad f'(x) = ax^{a-1}$$

