

CHAPITRE 11 : POLYNÔMES

Hors-série

I. Fonctions polynomiales de $\mathbb{R}[x], \mathbb{R}_n[x]$ **1. Forme générale, coefficients**

Définition 1 (Fonction polynomiale). On appelle polynôme ou fonction polynomiale toute fonction de la forme

$$x \in \mathbb{R} \mapsto \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

où $n \in \mathbb{N}$ et $(a_k)_{0 \leq k \leq n} \in \mathbb{R}^{n+1}$. On note $\mathbb{R}[x]$ l'ensemble des polynômes.

- On suppose $a_n \neq 0$. On appelle n le **degré** du polynôme ($\deg(P)$) et a_n son **coefficent dominant**
- Si tous les coefficients sont nuls, $P = 0$ et on pose $\deg(P) = -\infty$
- On note $\mathbb{R}_n[x]$ l'ensemble des polynômes de degré **inférieur ou égal à n**

Exemples. $\mathbb{R}_0[x]$ est l'ensemble des fonctions constantes, $\mathbb{R}_1[x]$ des fonctions affines, $\mathbb{R}_2[x]$ des polynômes du second degré (ou affines)

Pour tout polynôme $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, $P(0) = \dots, P(1) = \dots$

Remarque. On s'autorisera un abus de notation : confondre P et $P(x)$ c'est-à-dire par exemple dire que x^2 est un polynôme.

Exercice. Déterminer le degré et le coefficient dominant du polynôme $P(x) = (x+1)^n - (x-1)^n$
Écrire d'abord ce polynôme sous la forme donnée par la définition

Propriété 2. Un polynôme est nul si et seulement si tous ses coefficients sont nuls. Deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux.

Démonstration.

Remarque. Ça justifie qu'on parle du degré d'un polynôme : l'écriture du polynôme est unique (il y a donc un unique terme non nul de plus haut degré). C'est aussi le sens de l'expression «on identifie» dans une égalité de polynômes.

2. Opérations

Propriété 3. Pour tous polynômes P, Q et toute constante λ ,

- λP est un polynôme
- $P + Q$ est un polynôme
- PQ est un polynôme

Savoir refaire le produit de deux sommes, regrouper par degré

Exercice. Écrire un programme Python qui prend en argument deux listes `liste_P` qui contient $[a_0, \dots, a_n]$ et `liste_Q` qui contient $[b_0, \dots, b_n]$ et renvoie une liste qui contient les coefficients du polynôme $P + Q$.

♣ Plus difficile : faire de même pour le polynôme PQ .

Propriété 4 (Degré). Soient P, Q des polynômes et $\lambda \neq 0$. Des calculs précédents on déduit :

- $\deg(\lambda P) = \deg(P)$
- $\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$ - égalité si $\deg(P) \neq \deg(Q)$.
En particulier, $\mathbb{R}_n[x]$ est **stable** par somme et par multiplication par un réel.
- $\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q)$

Propriété 5 (Corollaire : intégrité). Pour tous $P, Q \in \mathbb{R}[x]$,

$$PQ = 0 \Leftrightarrow (P = 0) \text{ ou } (Q = 0)$$

Démonstration.

Remarque. C'est faux pour les fonctions en général (exemples).

II. Division euclidienne et factorisation

1. Théorème de division euclidienne

Définition 6 (Divisibilité). Soient $A, B \in \mathbb{R}[x]$. On dit que B **divise** A si :

$$\exists Q \in \mathbb{R}[x], A = BQ$$

Remarque. Si $B \neq 0$, Q est unique : $\forall B, Q, Q' \in \mathbb{R}[x], B \neq 0 \Rightarrow (BQ = BQ' \Leftrightarrow Q = Q')$

Exemple. $A(x) = x^4 - 1$, $B(x) = x^3 + x^2 + x + 1$, cherchons Q

Exercice. On pose $A(x) = x^5 + x^4 + x^3 + 5x^2 + x - 3$ et $B(x) = x^3 + 2x^2 - 1$. Trouver Q tel que $A = BQ$

♡ **Théorème 7** (division euclidienne). Pour tous polynômes $A, B \in \mathbb{R}[x]$ avec $B \neq 0$, il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{R}[x]^2$ tels que :

$$\begin{cases} A = BQ + R \\ \deg(R) < \deg(B) \end{cases}$$

Q et R sont respectivement le **quotient** et le **reste** de la division euclidienne de A par B

Remarque. Analogie avec la division euclidienne des entiers.

Démonstration (De l'unicité). À compléter :

Supposons qu'il existe Q_1, Q_2, R_1, R_2 tels que

Montrons

D'après la propriété 4, $\deg(R_1 - R_2) \leqslant \dots < \dots$

Par hypothèse, $B(Q_1 - Q_2) = R_2 - R_1$ donc $\deg(R_2 - R_1) = \dots$

Si $Q_1 - Q_2 \neq 0$, $\deg(Q_1 - Q_2) \geqslant 0$, ce qui implique $\deg(R_2 - R_1) \geqslant \deg(B)$, ce qui est impossible.

Ainsi, $\boxed{Q_1 = Q_2}$. Dans ce cas, $R_2 - R_1 = B \times 0 = 0$ et donc $\boxed{R_2 = R_1}$

Exemple. Calculons le quotient et le reste de la division euclidienne de $x^4 + 3x^2 - x + 2$ par $x^2 - x + 1$

La méthode (algorithmique) de l'exemple nous convainc que quotient et reste existent en effet, on ne le démontrera pas formellement.

♡ *Exercice.* Effectuer la division euclidienne de $A(x) = x^5 - x^4 + x^3 - 2x + 1$ par $B(x) = x^3 - 2$.

2. Racines

Définition 8. Soit $P \in \mathbb{R}[x]$ et $a \in \mathbb{R}$. On dit que a est une **racine du polynôme** P si $P(a) = 0$

- Cas des polynômes de degré 2.

- Trouver des racines évidentes :

Exemples.

- $P_1(x) = x^7 + 189x^6 - 17x^5 + x^3$
- $P_2(x) = 5x^4 - 4x^3 + 2x^2 - 5x + 2$

Propriété 9. Tout polynôme de degré impair admet au moins une racine réelle (TVI)

♡ **Propriété 10** (Factorisation). Soient $P \in \mathbb{R}[x], a \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} a \text{ est racine de } P &\Leftrightarrow (x - a) \text{ divise } P \\ &\Leftrightarrow \exists Q \in \mathbb{R}[x], P = (x - a)Q \end{aligned}$$

Démonstration.

Propriété 11 (Nombre de racines). Soit P un polynôme et a_1, \dots, a_n racines distinctes de P . Alors, il existe $Q \in \mathbb{R}[x]$ tel que :

$$P = (x - a_1) \dots (x - a_n)Q$$

Démonstration. Par récurrence.

Propriété 12 (Conséquences).

- Si a_1, \dots, a_n racines de P , alors $\deg(P) \geq n$
- Si P est un polynôme de degré n , il admet au plus n racines
- Si P est un polynôme non nul, il admet un nombre fini de racines
- Si P admet une infinité de racines, il est nul
- Des polynômes qui coïncident en une infinité de points sont égaux.

Définition 13 (Multiplicité d'une racine). Soit P un polynôme, $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On dit que a est une **racine de P de multiplicité m** si :

$$(x - a)^m \text{ divise } P \text{ et } (x - a)^{m+1} \text{ ne divise pas } P$$

c'est-à-dire qu'il existe $Q \in \mathbb{R}[x]$ tel que :

$$P = (x - a)^m Q \text{ et } Q(a) \neq 0$$

Propriété 14 (Admise). Soit P un polynôme et a_1, \dots, a_k des racines de multiplicités respectives m_1, \dots, m_k . Alors, il existe $Q \in \mathbb{R}[x]$ tel que

$$P = \left(\prod_{j=1}^k (x - a_j)^{m_j} \right) \times Q$$

Exemple. Soit $P(x) = x^3 - 3x^2 + 4$. Vérifier que 2 est une racine de P et déterminer sa multiplicité.

3. Relations coefficients - racines

♠ Ce paragraphe n'est pas exigible.

Exemple. Soit $P(x) = x^2 + bx + c$ un polynôme unitaire de degré 2 ayant deux racines x_1, x_2 . Alors, $P(x) = (x - x_1)(x - x_2) = x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2$. Par identification, $b = \dots$ et $c = \dots$

Exercice. Trouver deux nombres dont la somme vaut 5 et le produit -14

Exemple. Soit P de degré 3 unitaire de racines $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. Exprimer a_0, a_1, a_2 en fonction des racines.

Exercice. Application. Résoudre le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = -4 \\ x_1x_2x_3 = -4 \end{cases}$$

4. Théorème de factorisation

Définition 15. On dit qu'un polynôme P est **irréductible** si il ne peut pas s'écrire $P = QR$ avec Q, R deux polynômes non constants.

Remarque : c'est l'analogue pour un polynôme des nombres premiers

Théorème 16 (Admis). Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[x]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 dont le discriminant est strictement négatif.

Théorème 17 (Admis). Tout polynôme non constant de $\mathbb{R}[x]$ peut s'écrire comme un produit de polynômes irréductibles, c'est-à-dire formellement :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad P(x) = \lambda \prod_{k=1}^r (x - a_k)^{m_k} \prod_{j=1}^s (x^2 + b_jx + c_j)^{n_j}$$

où λ est le coefficient dominant de P , a_1, \dots, a_r sont les racines distinctes de P de multiplicités respectives m_1, \dots, m_r et $b_1, \dots, b_s, c_1, \dots, c_s$ vérifient pour tout j : $b_j^2 - 4c_j < 0$.

Cette décomposition (avec des polynômes unitaires) est unique.

♠ *Remarque* (Culturel). Le «vrai» résultat, c'est que tout polynôme de $\mathbb{C}[x]$ s'écrit comme un produit de polynômes de $\mathbb{C}[x]$ de degré 1 : \mathbb{C} est le bon univers dans lequel doivent vivre les polynômes à coefficients réels.

♡ *Exercice.* Factoriser les polynômes suivants :

- $P(x) = 2x^4 - 3x^3 + x^2 - x + 1$

- $Q(x) = x^4 + 5x^2 + 6$

On dit que Q est un polynôme bicarré

Factoriser (complètement) **un polynôme** c'est l'écrire comme un produit de polynômes irréductibles.

Dans notre boîte à outils il y a :

- les racines évidentes $(0, -1, 1, -2, 2\dots)$
- la division euclidienne par $(x - a)$ où a est une racine
- le discriminant des polynômes de degré 2
- la méthode pour les polynômes bicarrés

Remarque (Encore une remarque culturelle). Factoriser un polynôme quelconque est aussi difficile que de trouver ses racines, c'est-à-dire, pour des polynômes de grand degré, impossible avec une formule fermée (comme notre fameux « $b^2 - 4ac$ »). On pourra trouver informatiquement des **valeurs approchées** de l'équation $P(x) = 0$.

♣ *Exercice.* On suppose qu'on dispose d'une fonction P implémentée et de deux variables flottantes a, b telles que P admette une unique racine α sur $[a; b]$. Écrire un programme demandant une valeur ε à l'utilisateur et donnant une valeur approchée de α à ε près, par dichotomie.

III. Dérivations successives

1. Définitions

Définition 18. On note P' le polynôme dérivé du polynôme P . Si $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$,

$$P'(x) = \sum_{k=1}^n k a_k x^{k-1} = \sum_{k=0}^{n-1} (k+1) a_{k+1} x^k$$

Si $n \geq 1$, P' est un polynôme de degré $n-1$.

Définition 19. Soit $P \in \mathbb{R}[x]$. On définit par récurrence la j -ème dérivée de P , notée $P^{(j)}$ par :

- $P^{(0)} = P$
- $\forall j \in \mathbb{N}, P^{(j+1)} = (P^{(j)})' = (P')^{(j)}$

Remarque. Si $j > \deg(P)$, $P^{(j)} = 0$

Exercice. Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k x^k$. Montrer par récurrence que pour tout $j \in \mathbb{N}$, $P^{(j)}(x) = \sum_{k=j}^n \frac{k!}{(k-j)!} a_k x^{k-j}$. Que vaut $P^{(j)}(0)$?

2. Formule de Taylor

Exemple. D'après un exercice précédent, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $a_k = \frac{P^{(k)}(0)}{k!}$ et donc : $P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(0)}{k!} x^k$

Propriété 20 (Formule de Taylor pour un polynôme). Soit P un polynôme de degré n et a un réel quelconque. Alors

$$\forall x \in \mathbb{R}, P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

Démonstration. Deux démonstrations : calcul et binôme de Newton ou poser $Q = P(x+a)$


Exercice. Exemple : Écrire $P(x) = x^3 - 2x^2 + 3x + 5$ en fonction de puissances de $(x-2)$.

3. Lien avec la multiplicité


Propriété 21. Soit P un polynôme et a une racine de P de multiplicité m . Alors, m est le plus grand entier tel que a soit racine de $P, P', \dots, P^{(m)}$

Démonstration.

Illustration :



Racine simple.



Racine double.

Exercice. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que le polynôme défini par $P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}x^k$ n'a que des racines simples.

Remarque. Bien sûr, les racines de P' ne sont pas toujours des racines de P (trouver un contre-exemple!).

♠ IV. Décomposition en éléments simples

On n'écrira pas explicitement le théorème de décomposition en éléments simples (vous pouvez chercher en ligne si vous voulez) mais il faut savoir traiter des exemples !

♡ *Exercice* (Rappel des deux méthodes vues jusqu'à présent). On cherche à décomposer la fraction rationnelle :

$$f(x) = \frac{2x^5 + x^3 - 2}{x^3 - x^2 - x + 1}$$

On pose $P(x) = 2x^5 + x^3 - 2$ et $Q(x) = x^3 - x^2 - x + 1$

1. Effectuer la division euclidienne de P par Q pour écrire f sous la forme $R + g$ où R est un polynôme et g une fraction rationnelle dont le degré du dénominateur est plus élevé que le degré du numérateur.
2. Factoriser $Q(x)$
3. On cherche à montrer qu'il existe $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ tels que :

$$\forall x \notin \{-1; 1\}, g(x) = \frac{\lambda_1}{(x-1)^2} + \frac{\lambda_2}{(x-1)} + \frac{\lambda_3}{x+1}$$

Dans la formule horrible précédente, comprendre qui sont les a_k , les m_k et les $\lambda_{k,i}$

- (a) Méthode 1 : en mettant tout au même dénominateur, obtenir $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ par identification des coefficients.
- (b) Méthode 2 : Multiplier l'égalité par $(x-1)^2$ et étudier la limite en 1. Utiliser le résultat obtenu pour déterminer λ_1 , puis λ_2 et λ_3 par des méthodes similaires.

4. Décomposer de la même manière :

$$\frac{x^6 - x^5 + 3x^4 - x + 6}{(x^2 + 1)(x - 2)}$$