

CHAPITRE 23 : DÉRIVÉES D'ORDRE SUPÉRIEUR

I. Rappels : dérivabilité, tangente, développement limité à l'ordre 1

Définition 1. f est dérivable en a de dérivée $f'(a) = \ell$ si :


$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \xrightarrow{x \rightarrow a, x \neq a} \ell$$

Propriété 2. Reformulation :

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell + o(1) = f'(a) + o(1) \quad \text{i.e.} \quad f(x) = f(a) + (x - a)f'(a) + o(x - a)$$

Remarque. La dérivabilité permet donc d'approximer f par sa tangente en a , d'équation $y = f(a) + (x - a)f'(a)$
 On **quantifie** l'écart : $o(x - a)$

Dessin :



Définition 3. On dit que f est de classe \mathcal{C}^1 si f' est continue.

II. Fonctions de classe \mathcal{C}^p et formules de Taylor

1. Fonction p fois dérivable, fonction infiniment dérivable

Définition 4. Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit

- que f est de classe \mathcal{C}^0 si elle est continue
- pour tout $p \in \mathbb{N}$, que f est de classe \mathcal{C}^{p+1} si elle est dérivable et que f' est de classe \mathcal{C}^p . On note $f^{(p+1)}$ la dérivée $(p + 1)$ -ème de f .
- que f est de classe \mathcal{C}^∞ si elle est de classe \mathcal{C}^p pour tout entier $p \in \mathbb{N}$

Exemples. Toutes les fonctions usuelles (polynômes, exp, ln, sin, cos, tan, arctan, $t \mapsto t^\alpha \dots$) sont de classe \mathcal{C}^∞ sur leur domaine de définition. On rappelle que $\sqrt{\cdot}$ ou $|\cdot|$ ne sont pas dérivables en 0, et donc pas de classe \mathcal{C}^1 au voisinage de 0

Exercice. Dérivée p -ième de

- $x \mapsto x^n$
- $x \mapsto \sin(x)$
- $x \mapsto \sqrt{x}$

Propriété 5 (Calcul de dérivée p -ième). Soit $p \in \mathbb{N}^*$.

- Soient $f, g \in \mathcal{C}^p(I)$ et λ, μ des réels. $\lambda f + \mu g$ est alors de classe \mathcal{C}^p , avec

$$(\lambda f + \mu g)^{(p)} = \lambda f^{(p)} + \mu g^{(p)}$$

♡

- Soient $f, g \in \mathcal{C}^p(I)$. Alors fg est de classe \mathcal{C}^p , avec

$$(fg)^{(p)} = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} f^{(k)} g^{(p-k)}$$

Remarque. Cette deuxième propriété, analogue à la formule du binôme de Newton, s'appelle **formule de Leibniz**.

Exemple. $f : x \mapsto (x^3 + 2x - 7)e^x$ est de classe \mathcal{C}^∞ . Calculer toutes ses dérivées en utilisant la formule de Leibniz.

2. Formules de Taylor globales

♡

Théorème 6 (Taylor reste intégral). Soit I un intervalle et $f \in \mathcal{C}^\infty(I)$. Alors : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall a \in I, \forall x \in I,$

$$\begin{aligned} f(x) &= f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n dt \\ &= \left(\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k \right) + \int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n dt \end{aligned}$$

Démonstration.


- L'hypothèse $f \in \mathcal{C}^\infty$ permet de simplifier le théorème, puisque nous appliquerons exclusivement ce théorème à des fonctions infiniment dérivables. f de classe \mathcal{C}^{n+1} suffit à l'ordre n

Remarque.

- f est ainsi approchée par un **polynôme** de degré n au voisinage de a , avec une erreur explicitée sous la forme du **reste intégral**.
- Pour un polynôme, on retrouve la formule de Taylor usuelle, avec $P^{(n+1)}$ nul si P est de degré n .

Exemple.

Approximations successives de la fonction sin au voisinage de 0



♡

Théorème 7 (Inégalité de Taylor-Lagrange). Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(I)$, $n \in \mathbb{N}$ et $M \in \mathbb{R}$ tel que $|f^{(n+1)}| \leq M$. Alors, pour tous $a, x \in I$:

$$\left| f(x) - \left(f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n \right) \right| \leq \frac{M|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

Démonstration.

Exemples.

- Montrer que pour tout $a > 0$, $\left| \cos(a) - 1 + \frac{a^2}{2} \right| \leq \frac{a^3}{6}$ et en déduire un encadrement de $\cos\left(\frac{1}{2}\right)$
- Montrer que pour tout $x > 0$, $\left| \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2} \right| \leq \frac{x^3}{3}$ et en déduire un encadrement de $\ln\left(\frac{3}{2}\right)$

Exemple (Convergence de la série exponentielle). Démonstration d'un résultat admis au chapitre 18 :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$$

Remarque.

- Sur un segment, $f^{(n+1)}$ est toujours bornée. En particulier, sur le segment $[a; x]$ ou $[x; a]$.
- À l'ordre 0, on retrouve

3. Développement limité à l'ordre n

Les deux premières formules de Taylor sont dites **globales**, puisqu'elles sont valables pour n'importe quel x dans l'intervalle I . On étudie maintenant une variante **locale** au voisinage de a .

Définition 8 (Développement limité). Soit f définie sur un intervalle I et $a \in I$, soit $n \in \mathbb{N}$. On dit que f admet un **développement limité d'ordre n en a** si il existe des réels $\lambda_0, \dots, \lambda_n$ tels que :

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} \lambda_0 + \lambda_1(x-a) + \lambda_2(x-a)^2 + \dots + \lambda_n(x-a)^n + o((x-a)^n)$$

ou encore :

$$f(a+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} \lambda_0 + \lambda_1 h + \lambda_2 h^2 + \dots + \lambda_n h^n + o(h^n)$$

Propriété 9 (Unicité). Si f admet un développement limité à l'ordre n en a , alors ce développement limité est **unique**.

Démonstration.

Propriété 10 (Premiers ordres). f admet un DL d'ordre 0 en x_0 si et seulement si elle est continue en x_0 , un DL d'ordre 1 si et seulement si elle est dérivable.

♡

Théorème 11 (Taylor-Young - admis). Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(I)$ et $a \in I$. Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + o((x-a)^n)$$

Savoir écrire en particulier avec $a = 0$

Exemples. Développements limités usuels : $e^x, \sin(x), \cos(x), \frac{1}{1+x}, \ln(1+x), (1+x)^\alpha$ en 0

Propriété 12 (Produit, somme de développements limités). Soient f et g admettant des développements limités : $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} P(x) + o(x^n)$ et $g(x) \underset{x \rightarrow a}{=} Q(x) + o(x^n)$, soient λ, μ des réels.

- $\lambda f(x) + \mu g(x) \underset{x \rightarrow a}{=} \lambda P(x) + \mu Q(x) + o(x^n)$
- fg admet un développement limité à l'ordre n en a (produit tronqué du produit PQ) - *savoir faire sur des exemples*

Exercice.

- Calcul du $DL_3(0)$ de $\frac{\cos x}{\sqrt{1+x}}$
- Calcul du $DL_4(0)$ de $\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}$

4. Allure du graphe de f


- Soit f une fonction paire de classe \mathcal{C}^∞ , alors les termes de son développement limité en 0 sont tous de degré pair.
- Sous les mêmes hypothèses avec f impaire, tous les termes du développement limité en 0 sont de degré impair.

Propriété 13 (Parité).

Démonstration. En exploitant l'unicité du développement limité.

Exemple. Voir les développements de sin et cos.

Illustration :



Propriété 14 (Allure locale, position par rapport à la tangente). Soit p un entier, a un réel et f ayant un développement limité de la forme :


$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + f^{(p)}(a)(x - a)^p + o((x - a)^p)$$

Alors la position de la courbe de f par rapport à sa tangente en a dépend de la parité de p et du signe de $f^{(p)}(a)$.


Exemple. On pose $f : x \mapsto \sqrt{1 + x + x^2}$. Étudier la position relative de \mathcal{C}_f et de sa tangente en 0 au voisinage de 0.

Exercice. Même question pour $g : x \mapsto 2 + \sin(2x)$

Illustration :



Courbe de $x \mapsto \sqrt{1 + x + x^2}$



Courbe de $x \mapsto 2 + \sin(2x)$

Définition 15 (Extremum local). Soit f deux fois définie sur un intervalle I et $x_0 \in I$. On dit que x_0 est

- un **maximum local** si il existe un voisinage $\mathcal{V} \subset I$ de x_0 tel que pour tout $x \in \mathcal{V}$, $f(x) \leq f(x_0)$
- un **minimum local** si il existe un voisinage $\mathcal{V} \subset I$ de x_0 tel que pour tout $x \in \mathcal{V}$, $f(x) \geq f(x_0)$

Propriété 16 (Optimisation). Soit f de classe \mathcal{C}^2 au voisinage d'un réel a . Supposons que $f'(a) = 0$. Alors f admet un développement limité de la forme

$$f(x) = f(a) + f^{(2)}(a) \frac{(x - a)^2}{2} + o((x - a)^2)$$

- Si $f^{(2)}(a) > 0$, alors a est un minimum local
- Si $f^{(2)}(a) < 0$, alors a est un maximum local
- Si $f^{(2)}(a) = 0$, alors on ne peut pas conclure : il faut connaître un terme supplémentaire du développement limité.

III. Autour de la convexité

1. Une première approche de la convexité

Définition 17. Soit I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est

- **convexe** si :


$$\forall (x, y) \in I^2, \forall \lambda \in [0; 1], f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

- **concave** si :

$$\forall (x, y) \in I^2, \forall \lambda \in [0; 1], f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

Remarque. f est concave ssi $-f$ est convexe.

Illustration :



Fonction convexe

Remarque. Interprétation : une fonction **convexe** est une fonction dont le graphe est **au-dessous** de toutes ses cordes

Propriété 18 (Généralisation - admis). Si f est convexe sur I , alors pour tous $x_1, \dots, x_n \in I$ et $t_1, \dots, t_n \geq 0$ vérifiant $t_1 + \dots + t_n = 1$,

$$f\left(\sum_{k=1}^n t_k x_k\right) \leq \sum_{k=1}^n t_k f(x_k)$$

Si f est concave, avec les mêmes notations,


$$f\left(\sum_{k=1}^n t_k x_k\right) \geq \sum_{k=1}^n t_k f(x_k)$$

2. Convexité et dérivée


♡ **Propriété 19** (Admis). Si f est de classe \mathcal{C}^1 sur I , il y a équivalence entre

1. f convexe
2. f' croissante
3. La courbe de f est au-dessus de ses tangentes

Illustration :



Fonction



Fonction

Exemples (La dernière caractérisation : une usine à inégalités).

- 1. $\forall x \geq 0, \ln(1+x) \leq x$
- 2. $\forall x \geq 0, \sin(x) \leq x$
- 3. $\forall x \in [0, \frac{\pi}{2}], \sin(x) \geq \frac{2}{\pi}x$
- 4. $\forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq 1+x$

3. Convexité et dérivée seconde

Définition 20. Si $f \in \mathcal{C}^1(I)$ a une dérivée f' elle-même de classe \mathcal{C}^1 , alors on dit que f est de classe \mathcal{C}^2 .

Exemples. Toutes les fonctions usuelles : polynômes, exp, ln, sin, cos, tan, arctan sur leur domaine de définition

Remarque. Comme pour les fonctions \mathcal{C}^1 , il est possible de construire des fonctions \mathcal{C}^1 mais pas \mathcal{C}^2 , ou deux fois dérivables mais pas \mathcal{C}^2 . Dans le cadre du programme, nous n'étudierons pas de fonctions de ce type.

Propriété 21 (Admis). Soit I un intervalle et $f \in \mathcal{C}^2(I)$.

- 1. f est convexe si et seulement si $f'' \geq 0$
- 2. f est concave si et seulement si $f'' \leq 0$

Exercice. Soit $f:]1; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$. Étudier la convexité de f . En déduire que pour tous $a, b \in]1; +\infty[$,
 $x \mapsto \ln(\ln(x))$

$$\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \sqrt{\ln(a) \cdot \ln(b)}$$


Définition 22 (Point d'inflexion). On dit que x_0 est un **point d'inflexion** de f si f change de convexité en x_0 .

Exemple. Étudier la convexité de $f: x \mapsto e^{-x^2}$ sur \mathbb{R} .

Illustration : un cas typique : la fonction cube

Propriété 23 (Cas des fonctions \mathcal{C}^2). Soit $f \in \mathcal{C}^2(I)$. Il y a équivalence entre

- 1. x_0 est un point d'inflexion de f
- 2. La courbe représentative de f traverse sa tangente en x_0
- 3. f'' s'annule en changeant de signe en x_0



4. Optimisation

Propriété 24. Soit f une fonction dérivable (et donc continue) sur un segment $[a; b]$. D'après le théorème des bornes, f est bornée et atteint ses bornes. Si un extremum est atteint en c appartenant à l'intervalle **ouvert** $]a; b[$, $f'(c) = 0$

Définition 25 (Point critique). On appelle **point critique** de f tout réel c vérifiant $f'(c) = 0$

- Sur un intervalle **fermé** il y a des contre-exemples : prendre la fonction identité sur $[0; 1]$

Remarque. • Réciproquement, f n'atteint pas forcément d'extremum en tout point critique : penser à la fonction cube.

Propriété 26 (Minimum global - admis). Soit f une fonction de classe \mathcal{C}^1 sur I . Si f est convexe et que x_0 est un point critique de f , alors x_0 est un **minimum global**. De même si f est concave, x_0 est un **maximum global**.

Rappel des DL usuels

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + \frac{(-1)^{n+1}x^n}{n} + o(x^n)$$

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots - \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + o(x^n)$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$$

$$\tan(x) = x + o(x)$$