<p>ANNEE SCOLAIRE 2024/2025 Devoir surveillé sur table $n^{\circ}4$</p> <p>Date : 04/04/2025 Heure 13h30 Durée : 4h00</p> <p>Les documents et la calculatrice ne sont pas autorisés.</p>	<p>Lycée Jean-Jacques ROUSSEAU</p>
--	--

Dans les questions faisant intervenir des instructions en langage Python, on prendra soin d'importer les bibliothèques nécessaires lors de leur première utilisation dans chaque exercice.

1 Ecricome 2018 (Extrait)

Un forain peut installer un jeu dans une fête foraine. Le jeu consiste à lancer deux fois une pièce et le joueur gagne :

- rien si il obtient 0 pile,
- perd 10 euros si il obtient 1 pile,
- gagne 20 euros si il obtient 2 piles.

La pièce est truquée avec une probabilité $p = \frac{1}{4}$ d'obtenir pile.

Le forain estime que 200 clients participe à son jeu par jour. Il souhaite être certain, avant de s'installer dans cette fête forain, qu'il gagnera plus de 100 euros par jour avec un risque d'erreur inférieur à 10%.

On note pour tout entier i compris entre 1 et 200, G_i le gain algébrique du i -ème joueur. On note aussi J la variable aléatoire égale au gain du forain sur toute la journée.

1. Pour tout entier $i \in \llbracket 1, 200 \rrbracket$, donner la loi de G_i , et calculer son espérance et sa variance.
2. Exprimer la variable aléatoire J en fonction des variables aléatoires G_i .
Démontrer alors que $\mathbb{E}(J) = 500$ et que $V(J) = 11250$.
3. Justifier que $\mathbb{P}(J \leq 100) \leq \mathbb{P}(|J - 500| \geq 400)$.
4. Rappeler l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, puis montrer que

$$\mathbb{P}(J \leq 100) \leq \frac{9}{128}.$$

5. Compte tenu de ses exigences de rentabilité, le forain peut-il installer son stand ?

Remarque : Il s'agit ici d'une sous partie IV d'un problème, les trois précédentes ont été traitées lors du second concours blancs l'année dernière.

2 Ecricome 2020

Soit a un réel strictement positif.

1. Pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on pose

$$I_n(a) = \int_a^{+\infty} \frac{1}{t^n} dt.$$

Montrer que l'intégrale $I_n(a)$ converge et vaut $\frac{1}{(n-1)a^{n-1}}$.

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall t \in \mathbb{R}, f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < a, \\ \frac{3a^3}{t^4} & \text{si } t \geq a. \end{cases}$$

- (a) Démontrer que f est bien une densité de probabilité. Soit X une variable aléatoire admettant f pour densité.
 - (b) Donner la fonction de répartition de X .
 - (c) Démontrer que X admet une espérance et calculer cette espérance.
 - (d) Démontrer que X admet une variance et que celle-ci vaut $\frac{3a^2}{4}$.
3. Soit U une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur $]0, 1]$. On pose $Y = \frac{a}{U^{\frac{1}{3}}}$.

- (a) Déterminer $Y(\Omega)$.
 - (b) Déterminer la fonction de répartition de Y et vérifier que Y et X suivent la même loi.
 - (c) Écrire une fonction en langage Python nommé `simulX` prenant en argument a, m et n où a est un réel strictement positif et m et n sont deux entiers naturels non nuls et qui renvoie une matrice à m lignes et n colonnes dont chaque coefficient est un réel choisi de façon aléatoire en suivant la loi de X . Ces réels seront choisis de façon indépendante.
On précise que la commande `random((m,n))` de la bibliothèque `numpy.random` renvoie une matrice à m lignes et n colonnes où chaque coefficients de la matrice est une simulation indépendante d'une loi uniforme sur $[0, 1[$.
4. (a) Calculer $\mathbb{P}(X > 2a)$.
- (b) Calculer $\mathbb{P}_{X > 2a}(X > 6a)$.
- (c) On suppose que la fonction Python de la question 3 a été programmée correctement et compilée. Compléter le script ci-dessous afin qu'il renvoie une valeur permettant de vérifier le résultat de la question précédente.

```

a = 10
N = 100000
s1 = 0
s2 = 0
X = simulX(a,1,N)
for k in range(1,N+1) :
    if .....
        s1 = s1 + 1
        if X[0,k]>6*a :
            .....
if s1 > 0 :
    print(.....)
    
```

On cherche dans la suite de l'exercice à estimer le paramètre a .
Soit n un entier naturel non nul, et $X_1, \dots, X_n$ n variables aléatoire indépendantes et suivant toutes la même loi que X .

5. On pose $V_n = \frac{2}{3n} \sum_{k=1}^n X_k$.
- (a) Montrer que V_n est un estimateur sans biais pour le paramètre a .

- (b) Calculer son risque quadratique et vérifier que celui-ci vaut $\frac{a^2}{3n}$.
6. On pose $W_n = \min(X_1, \dots, X_n)$.
- (a) Déterminer la fonction de répartition de W_n et vérifier que W_n est bien une variable aléatoire à densité.
- (b) Montrer que W_n admet pour densité la fonction f_n définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\forall t \in \mathbb{R}, f_n(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < a \\ \frac{3na^{3n}}{t^{3n+1}} & \text{si } t \geq a. \end{cases}$$

- (c) Démontrer que W_n admet une espérance et calculer cette espérance. Déterminer alors l'unique réel λ_n dépendant de n tel que $\lambda_n W_n$ est un estimateur sans biais pour le paramètre a .
- (d) Calculer le risque quadratique de $\lambda_n W_n$ et vérifier que celui-ci vaut $\frac{a^2}{3n(3n-2)}$.
7. (a) Compléter la fonction ci-dessous afin qu'elle réalise m simulations de la variable aléatoire V_n et renvoie les résultats obtenus sous forme d'une matrice ligne à m éléments :

```

.....
def simulV(a,m,n) :
    X = simulX(a,m,n)
    V = np.zeros((1,m))
    for k in .....
        V[0,k] = .....
    return V

```

Pour la suite, on prend $n = 100$ et on suppose que l'on dispose d'une fonction similaire simulW permettant d'obtenir m simulations de la variable aléatoire $\lambda_n W_n$.

- (b) Écrire les lignes de codes permettant ayant permis d'obtenir le graphique suivant :

On justifiera en amont le choix des paramètres ainsi que l'attribution des symboles + et x.

3 EMLyon 2016

Partie I : Étude d'une variable aléatoire

On considère l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie, pour tout t de $\mathbb{R}$, par : $f(t) = \frac{e^{-t}}{(1+e^{-t})^2}$.

1. Vérifier que la fonction f est paire.
2. Montrer que f est une densité d'une variable aléatoire réelle.
Dans toute la suite de l'exercice, on considère une variable aléatoire réelle X à densité, de densité f .
3. Déterminer la fonction de répartition de X .
4. (a) Montrer que l'intégrale $\int_0^{+\infty} tf(t) dt$ converge.
(b) En utilisant l'imparité de la fonction $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, t \mapsto tf(t)$, montrer que X admet une espérance et que l'on a : $\mathbb{E}(X) = 0$.

Partie II : Étude d'une autre variable aléatoire

On considère l'application $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie, pour tout x de $\mathbb{R}$, par : $\varphi(x) = \ln(1 + e^x)$.

5. Montrer que φ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle I à préciser.
6. Exprimer, pour tout y de I , $\varphi^{-1}(y)$.
On définit la variable aléatoire réelle Y définie par : $Y = \varphi(X)$.
7. Justifier $\mathbb{P}(Y \leq 0) = 0$.
8. Déterminer la fonction de répartition de Y .
9. Reconnaître alors la loi de Y et donner, sans calcul, son espérance et sa variance.

Partie III : Étude d'une convergence en loi

On considère une suite de variables aléatoires réelles $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, mutuellement indépendantes, de même densité f , où f a été définie dans la partie I.

On pose, pour tout n de $\mathbb{N}^*$: $T_n = \max(X_1, \dots, X_n)$ et $U_n = T_n - \ln(n)$.

10. (a) Déterminer, pour tout n de $\mathbb{N}^*$, la fonction de répartition de T_n .
(b) En déduire : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, \mathbb{P}(U_n \leq x) = \left(1 + \frac{e^{-x}}{n}\right)^{-n}$.
11. En déduire que la suite de variables aléatoires $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge en loi vers une variable aléatoire réelle à densité dont on précisera la fonction de répartition et une densité.

4 Ecricome 2017

Dans tout l'exercice, on notera $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3 et I la matrice identité d'ordre 3. On considère la matrice A définie par

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \\ -3 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

L'objectif de cet exercice est de déterminer l'ensemble des matrices M de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que $M^2 = A$.

Partie A : Etude de la matrice A

1. Calculer les matrices $(A - I)^2$ et $(A - I)^3$.
2. En déduire l'ensemble des valeurs propres de A ?
3. La matrice A est-elle inversible ? Est-elle diagonalisable ?

Partie B : Recherche d'une solution particulière

On note pour tout $x \in]-1, 1[$, $\varphi(x) = \sqrt{1+x}$.

4. Justifier que la fonction φ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $] -1, 1[$, et déterminer les valeurs $\varphi'(0)$ et $\varphi''(0)$.
5. En utilisant la formule de Taylor-Young pour φ en 0 à l'ordre 2, déterminer un réel α non nul tel que

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x + \alpha x^2 + o_{x \rightarrow 0}(x^2).$$

6. On note $P(x) = 1 + \frac{1}{2}x + \alpha x^2$ la fonction polynômiale de degré 2 ainsi obtenue. Développer $(P(x))^2$.
7. Soit $C = A - I$. En utilisant les résultats de la question 1, vérifier que $(P(C))^2 = A$.
Expliciter alors une matrice M telle que $M^2 = A$.

Partie C : Résolution complète de l'équation

On munit l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ de sa base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice représentative dans la base $\mathcal{B}$ est la matrice A .

Dans cette partie, on pose $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

8. Soient u, v et w les vecteurs définies par
$$\begin{cases} w = (1, 0, 1), \\ v = f(w) - w, \\ u = f(v) - v. \end{cases}$$

- (a) Calculer les vecteurs v et u .
- (b) Démontrer que la famille $\mathcal{B}' = (u, v, w)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
- (c) Déterminer la matrice représentative de f dans la base $\mathcal{B}'$.

(d) En déduire qu'il existe une matrice $P \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ inversible telle que $T = P^{-1}AP$.

9. Soit $N \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

(a) Montrer que si $N^2 = T$, alors $NT = TN$. En déduire alors que N est de la forme

$$N = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

où a, b et c sont trois réels.

(b) Démontrer alors que l'équation matricielle $N^2 = T$ admet exactement deux solutions : N_1 et N_2 .

10. Montrer que l'équation matricielle $M^2 = A$ d'inconnue $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ admet exactement deux solutions que l'on écrira en fonction de P, P^{-1}, N_1 et N_2 .

11. L'ensemble E des matrices M appartenant à $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que $M^2 = A$ est-il un espace vectoriel ?