

TD de mathématiques n°1 : Logique et raisonnement

Pour commencer

Propositions et quantificateurs

Exercice 1 Pour quelle valeurs de la variable $x \in \mathbb{R}_+$ la proposition $\mathcal{P}(x)$: “ $\ln(x) > -1$ ” est-elle vraie?

Exercice 2 *Soyez attentif à ce résultat.* On considère, pour tout $x \in \mathbb{R}$, la proposition $\mathcal{P}(x)$: “ $x = \sqrt{x^2}$ ”.

- (a) Donner une valeur de x pour laquelle la proposition $\mathcal{P}(x)$ est vraie.
- (b) Donner une valeur de x pour laquelle $\mathcal{P}(x)$ est fausse.
- (c) La proposition $\forall x \in \mathbb{R}^*, \mathcal{P}(x)$ est-elle vraie?
- (d) La proposition $\exists x \in \mathbb{R}^*, x = \sqrt{x^2}$ est-elle vraie?

Exercice 3 On considère, pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, la proposition $\mathcal{P}(x)$: “ $x = \frac{1}{x}$ ”.

- (a) Donner une valeur de x pour laquelle la proposition $\mathcal{P}(x)$ est vraie.
- (b) Donner une valeur de x pour laquelle $\mathcal{P}(x)$ est fausse.
- (c) La proposition $\forall x \in \mathbb{R}^*, \mathcal{P}(x)$ est-elle vraie?
- (d) La proposition $\exists x \in \mathbb{R}^*, \mathcal{P}(x)$ est-elle vraie?
- (e) La proposition $\exists! x \in \mathbb{R}^*, \mathcal{P}(x)$ est-elle vraie?

Exercice 4 Vrai ou faux? (Justifier.)

- (a) $\forall a \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, x^2 = a.$
- (b) $\exists a \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x^2 = a.$
- (c) $\forall a \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, x^2 = a^2.$
- (d) $\exists a \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x^2 = a^2.$

Exercice 5 Pour chaque proposition, écrire sa négation puis déterminer sa valeur de vérité.

- (a) \mathcal{P} : “ $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y = 0$ ”
- (b) \mathcal{Q} : “ $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y = 0$ ”
- (c) \mathcal{R} : “ $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x \times y = 0$ ”
- (d) \mathcal{S} : “ $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x \times y = 0$ ”

Exercice 6 Soit $x \in \mathbb{R}$. Compléter les pointillés suivants en utilisant \implies , \impliedby ou \iff (en justifiant) :

- (a) $x \geq 1 \dots\dots x > 0$
- (b) $0 \leq x \leq 1 \dots\dots 0 \leq 1 - x \leq 1$
- (c) $x^2 = 0 \dots\dots x = 0$
- (d) $x^2 > 0 \dots\dots x > 0$
- (e) $x \in [-1, 1] \dots\dots x \in [-2, 2]$
- (f) $x \in [-1, 1] \dots\dots -x \in [-1, 1]$

Exercice 7 Soient $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}_+$ et $d \in \mathbb{R}_+$. Compléter, si possible, les pointillés suivants en utilisant \implies , \impliedby ou \iff (en justifiant) :

- (a) $a = b \dots\dots a^2 = b^2$
- (b) $a \leq b \dots\dots a^2 \leq b^2$
- (c) $c = d \dots\dots c^2 = d^2$
- (d) $c \leq d \dots\dots c^2 \leq d^2$

Exercice 8 Soit $x \in \mathbb{R}$. On considère les propositions $\mathcal{P}(x)$: “ $\forall y > 0, x \leq y$ ” et $\mathcal{Q}(x)$: “ $x \leq 0$ ”.

Montrer que $\mathcal{P}(x) \implies \mathcal{Q}(x)$ (on pourra raisonner aussi bien par contraposée que par l'absurde). Les propositions $\mathcal{P}(x)$ et $\mathcal{Q}(x)$ sont-elles équivalentes?

Méthodes de raisonnement

Exercice 9 Montrer que pour tout entier naturel n , $n^2 - n$ est pair.

Exercice 10 Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que si n^2 est un multiple de 3, alors n est un multiple de 3.

Exercice 11 Soit $n \in \mathbb{N}$ et $m \in \mathbb{N}$. On dit que n et m sont de même parité si : n et m sont pairs, ou bien n et m sont impairs. Montrer que : $n^2 + m^2$ est impair $\implies n$ et m ne sont pas de même parité. Y a-t-il équivalence?

Exercice 12 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose que la proposition \mathcal{P} : " $\exists p \in \mathbb{N}, n = p^2$ " est vraie. Montrer que la proposition \mathcal{Q} : " $\exists q \in \mathbb{N}, 2n = q^2$ " est fausse.

Exercice 13 Montrer que $\frac{\ln(3)}{\ln(2)} \notin \mathbb{Q}$.

Exercice 14 La quantité conjuguée. Démontrer par une chaîne d'équivalence correctement justifiée que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \leq \sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-1}.$$

Exercice 15 Thème très classique : inégalités entre les moyennes harmoniques, géométriques et arithmétiques.

Soient $a \in \mathbb{R}_+^*$ et $b \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer que $\frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$.

Exercice 16 Montrer en raisonnant par équivalence que :

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, \forall c \in \mathbb{R}, \forall d \in \mathbb{R}, (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 \iff ad = bc$$

Exercice 17

(a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $x + \frac{1}{x} \geq 2$.

(b) (+) En déduire que pour tout $a \in \mathbb{R}_+^*$, pour tout $b \in \mathbb{R}_+^*$, pour tout $c \in \mathbb{R}_+^*$, $(a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \geq 9$.

Exercice 18 Résoudre les inéquations suivantes en raisonnant par disjonction de cas :

$$(a) \frac{x-1}{x+1} \geq x \qquad (b) \frac{x-1}{x+1} \geq \frac{x+1}{x-1} \qquad (c) \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 1} > 1$$

Exercice 19 Résoudre les équations et inéquations suivantes en raisonnant si besoin par disjonction de cas.

$$(a) \sqrt{x+5} = x+3 \qquad (c) \sqrt{x^2 - x - 2} = -x$$
$$(b) \sqrt{x^2 - 1} \leq x - 1 \qquad (d) \sqrt{x+1} - \sqrt{x-1} > 1$$

Pour continuer

Propositions et quantificateurs

Exercice 20 Pour quelle valeurs de la variable $x \in \mathbb{R}$ la proposition $\mathcal{P}(x)$: " $x^2 = x$ " est-elle vraie?

Exercice 21 Pour chaque proposition ci-dessous, écrire sa négation puis déterminer si elle est vraie ou fausse.

$$(a) \forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y > 0. \qquad (e) \exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}_+, x = y^2.$$
$$(b) \forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y > 0. \qquad (f) \forall x \in \mathbb{R}, \forall y > x, \exists z \in \mathbb{R}, x < z < y.$$
$$(c) \exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y \leq 0. \qquad (g) \exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y^2 > x.$$
$$(d) \forall x \in \mathbb{R}_+, \exists y \in \mathbb{R}, x = y^2. \qquad (h) \forall n \in \mathbb{N}, \exists x \in \mathbb{R}, n < x < n + 1.$$

Exercice 22 (+) Soit $x \in \mathbb{R}$. On considère les propositions $\mathcal{P}(x)$: " $\forall y > 0, -y \leq x \leq y$ " et $\mathcal{Q}(x)$: " $x = 0$ ". Montrer que $\mathcal{P}(x) \implies \mathcal{Q}(x)$ (on pourra raisonner aussi bien par contraposée que par l'absurde). Les propositions $\mathcal{P}(x)$ et $\mathcal{Q}(x)$ sont-elles équivalentes?

Exercice 23 (+) Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer que : $(\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, x^2 \leq \varepsilon) \implies x = 0$.

Méthodes de raisonnement

Exercice 24 Montrer que pour tout entier naturel n , $n^3 - n$ est multiple de 3.

Exercice 25 Montrer que $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

Exercice 26 Montrer que $\frac{\ln(2)}{\ln(10)} \notin \mathbb{Q}$.

Exercice 27 Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$. Montrer en raisonnant par équivalence que : $\frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$.

Exercice 28 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer en raisonnant par équivalence que : $\sqrt{n-1} + \sqrt{n+1} \leq 2\sqrt{n}$.

Exercice 29 (+) Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $x \notin \mathbb{Q}$. Soient $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ tels que $ad \neq bc$. Montrer que $\frac{ax+b}{cx+d} \notin \mathbb{Q}$.

Exercice 30 (+) Montrer que : $\forall x \in]0, 1[, \exists \alpha \in \mathbb{R}_+^* ,] x - \alpha , x + \alpha [\subset]0, 1[$ (on pourra distinguer des cas).

Exercice 31 Résoudre les inéquations suivantes en raisonnant par disjonction de cas.

(a) $\frac{2x+1}{x-1} > 2$

(b) $\frac{x-3}{3x+1} \leq \frac{x}{x-1}$

(c) $\frac{x^2-x-2}{x^2-1} > 1$

Exercice 32 Résoudre les équations et inéquations suivantes en raisonnant si besoin par disjonction de cas.

(a) $\sqrt{x+2} \geq x$

(d) $\sqrt{2-x} < x$

(b) $\sqrt{x+6} = x$

(e) $\sqrt{x^2-x-2} < -x$

(c) $\sqrt{x^2+1} = 2x+1$

(f) $\sqrt{x} + \sqrt{x+2} = 2$