

# Intégration

## Exercices de révision

### Rappel : tableau des primitives usuelles

**NB : ce tableau sera précisé dans le cours ; ici c'est plus un aide-mémoire.**  
(temporaire, ensuite vous le connaîtrez par cœur...)

Primitives des fonctions élémentaires :

Fonction	Primitive
$x^n \quad (n \in \mathbb{N})$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\frac{1}{x^n} = x^{-n} \quad (n \in \mathbb{N}, n \neq 1)$	$\frac{x^{-n+1}}{-n+1}$
$x^\alpha \quad (\alpha \text{ non entier})$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $
$e^{ax} \quad (a \in \mathbb{R}^*)$	$\frac{1}{a}e^{ax}$

Formes usuelles de fonctions composées :

Fonction	Primitive
$u'(x) \cdot (u(x))^\alpha \quad (\alpha \neq -1)$	$\frac{(u(x))^{\alpha+1}}{\alpha+1}$
$\frac{u'(x)}{u(x)}$	$\ln u(x) $
$u'(x) \cdot e^{u(x)}$	$e^{u(x)}$

# 1 Échauffement

## Techniques de calcul

**Exercice 1.** Calculer par recherche directe de primitive les intégrales suivantes :

$$\int_0^1 (t^3 - 2t^2) dt \quad \int_0^{1/2} e^{-2x} dx \quad \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t+1}} dt \quad \int_0^1 \frac{1}{3u+1} du \quad \int_0^1 x e^{-x^2} dx$$
$$\int_0^1 \frac{t^2}{t^3+1} dt \quad \int_1^2 \frac{3}{x^5} dx \quad \int_0^1 \frac{e^x}{(e^x+1)^4} dx \quad \int_{-1/2}^{1/2} \frac{1}{1-x^2} dx \text{ (voir indication)}$$

*Indication :* On cherchera des réels  $a, b$  tels que, pour tout  $x \notin \{-1, 1\}$ ,  $\frac{1}{1-x^2} = \frac{a}{1-x} + \frac{b}{1+x}$ .

**Exercice 2.** Calculer à l'aide d'une intégration par parties les intégrales suivantes.

$$\int_1^2 \ln(t) dt \quad \int_1^2 t \ln(t) dt \quad \int_0^1 x^2 e^x dx$$

**Exercice 3.** Calculer à l'aide d'un changement de variable les intégrales suivantes.

$$\int_1^2 \frac{x}{\sqrt{2x+1}} dx \text{ (poser } u = 2x+1) \quad \int_1^e \frac{1}{x\sqrt{\ln(x)+1}} dx \text{ (poser } u = \ln(x))$$

## Fonctions dépendant d'intégrales

**Exercice 4.**

Soit  $G$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$G(x) = \int_x^{2x} e^{-t^2} dt$$

1. Montrer que  $G$  est impaire.
2. Déterminer la dérivée de  $G$  ; étudier les variations de  $G$ .
3. Encadrer (simplement !)  $e^{-t^2}$  pour  $t \in [x, 2x]$ . En déduire un encadrement de  $G(x)$ , puis  $\lim_{x \rightarrow +\infty} G(x)$ .

## Suites d'intégrales, majorations, limites

**Exercice 5.** Soit  $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$ .

1. Calculer  $I_0$ .
2. En majorant la fonction intégrée, montrer que  $(I_n)$  converge vers 0.
3. Montrer que  $I_n + I_{n+1} = \frac{1}{n+1}$ .
4. On pose  $u_k = (-1)^k I_k$ . Montrer que  $\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1} = \sum_{k=0}^n (u_k - u_{k+1})$ .
5. Montrer que la série de terme général  $\frac{(-1)^k}{k+1}$  converge, et que sa somme vaut  $\ln(2)$ .

## 2 Pour les enthousiastes

### Techniques de calcul

**Exercice 6.** Calculer par recherche directe de primitive les intégrales suivantes :

$$\int_0^1 \frac{x^2+3x+1}{x+1} dx \quad (\text{voir indication}) \quad \int_0^1 \frac{x+3}{x^2-x-2} dx$$
$$\int_1^2 5^x dx \quad \int_0^5 |x^2-5x+6| dx \quad \int_1^2 (x-1)e^{x^2-2x+1} dx$$

Indication : chercher des réels  $c, d, e$  tels que, pour tout  $x \neq -1$ ,  $\frac{x^2+3x+1}{x+1} = cx + d + \frac{e}{x+1}$ .

**Exercice 7.** Calculer à l'aide d'une intégration par parties les intégrales suivantes.

$$\int_0^1 t^3 e^{-t^2} dt \quad (\text{intégrer } t \mapsto te^{-t^2})$$

**Exercice 8.** Calculer à l'aide d'un changement de variable les intégrales suivantes.

$$\int_1^2 \frac{1}{t+2\sqrt{t}} dt \quad (\text{poser } u = \sqrt{t}) \quad \int_e^{e^2} \frac{1}{u \ln(u)} du \quad (\text{poser } t = \ln(u))$$

**Exercice 9.** Soit  $f(x) = \int_x^{2x} \sqrt{1+t^4} dt$ .

1. Donner l'ensemble de définition de  $f$ , et son signe.
2. Montrer que  $f$  est impaire.
3. Montrer :  $\forall x \geq 0, f(x) \geq x\sqrt{1+x^4}$ . En déduire  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ , puis  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ .
4. Montrer que :  $\forall t \geq 0, t^2 \leq \sqrt{1+t^4} \leq 1+t^2$ .
5. En déduire un encadrement de  $f$  sur  $\mathbb{R}_+$ , puis un équivalent de  $f$  en  $+\infty$ .
6. En remarquant :  $\forall t \geq 0, \sqrt{1+t^4} \geq 1$ , obtenir une minoration de  $f$ . En déduire un équivalent de  $f$  en  $0^+$ .

**Exercice 10.** On note, pour  $n \in \mathbb{N}, I_n = \int_0^1 \frac{(1-x)^n}{n!} e^x dx$ .

1. Montrer que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$ .
2. Montrer, avec une intégration par parties, que  $I_n = \frac{1}{(n+1)!} + I_{n+1}$ .
3. En déduire :  $e = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!}$ .