

# Systèmes différentiels linéaires

## Définitions et théorèmes

### 1 Introduction aux équations différentielles

Les équations différentielles (ED) sont des problèmes issus de l'application des mathématiques à divers champs d'étude, notamment la physique, la biologie ou l'économie. Il s'agit de trouver des fonctions  $f$  qui vérifient une équation reliant les valeurs de  $f$  aux valeurs de ses dérivées successives :  $f', f'', \dots$

On peut imaginer pourquoi de telles contraintes apparaissent :

- le modèle le plus naïf de dynamique des populations est celui où la variation (dérivée) d'une population est donnée par les naissances et décès, qu'on suppose proportionnels à cette population ;
- pour des raisons similaires, les variations du PIB d'un pays peuvent, en première approximation, être supposées proportionnelles à ce PIB ;
- en physique, l'accélération (dérivée seconde de la position) d'un corps céleste est une fonction de la force de gravitation (qui dépend de la position dudit corps céleste relativement à ce qui l'attire) ;
- en biologie, notons  $\ell(t)$  la population de lapins au temps  $t$  et  $r(t)$  la population de renards au temps  $t$  d'un certain écosystème.

Les renards mangeant les lapins, il y aura un terme en  $-\beta \ell(t)r(t)$  dans la variation de la population de lapins ; et un terme en  $\delta \ell(t)r(t)$  dans la variation de la population de renards.

Avec d'autres modélisations « naturelles » on est en fait ramenés à considérer que  $\ell$  et  $r$  vérifient :

$$\begin{cases} \ell'(t) = \alpha \ell(t) - \beta \ell(t)r(t) \\ r'(t) = -\gamma r(t) + \delta \ell(t)r(t) \end{cases}$$

(« modèle proie-prédateur » de Lotka-Volterra).

Ce dernier exemple met en jeu plusieurs fonctions et leurs dérivées : on parle alors de *système différentiel* (SD).

### 2 La notation avec « $y$ »

Une ED (linéaire d'ordre  $n$  par exemple) se présente traditionnellement avec la notation suivante :

$$y^{(n)} + a_1(t)y^{(n-1)} + a_2(t)y^{(n-2)} + \dots + a_n(t)y = b(t)$$

(par exemple  $y'' + 2t y = t^2 + 1$ ).

Cette notation peut paraître abusive mais c'est l'usage. Ici  $y$  représente la fonction inconnue ; et on considère une fonction de la variable  $t$ .

Ainsi, par exemple :

La fonction  $f$  est une solution sur  $\mathbb{R}$  de l'équation différentielle  $y'' + 2t y = t^2 + 1$  ssi :

$$\text{elle est de classe } \mathcal{C}^2 \text{ sur } \mathbb{R}, \text{ et } \forall t \in \mathbb{R}, f''(t) + 2t f(t) = t^2 + 1$$

et de même sur des exemples plus compliqués.

On peut donc retenir qu'il faut « remplacer  $y$  par  $f(t)$  » pour voir si une fonction  $f$  est solution d'une ED / traduire le fait qu'elle l'est.

### 3 Rappels de première année : équations différentielles linéaires

**Théorème 1.** Soit (E) l'équation  $y' + ay = b(t)$  et  $(E_0) : y' + ay = 0$  l'équation homogène associée.

1. Les solutions de  $(E_0)$  sont les fonctions de la forme  $t \mapsto Ke^{-at}$ , où  $K$  est un réel quelconque.
2. Si  $y_0$  est une solution de (E) (appelée dans ce contexte solution particulière) alors les solutions de (E) sont les fonctions de la forme  $y + y_0$ , où  $y$  est solution de  $(E_0)$ .

**Proposition 2** (Quelques pistes de recherche de solution particulière).

Dans le cas d'une équation homogène  $y' + ay = b(t)$  :

- si  $b$  est une constante, on peut rechercher une solution particulière constante ;
- si  $b$  est une fonction polynomiale, on peut rechercher une solution polynomiale de même degré ;
- si  $b(t) = Ke^{\alpha t}$  (avec  $\alpha \neq -a$ ) on peut rechercher une solution sous la forme  $K'e^{\alpha t}$
- si  $b(t) = Ke^{-at}$  on peut rechercher une solution sous la forme  $K'te^{-at}$

**Théorème 3.** Soit (E) l'équation  $y'' + ay' + by = c(t)$  et  $(E_0) : y'' + ay' + by = 0$  l'équation homogène associée ( $(a, b)$  sont ici des constantes réelles et  $c$  une fonction continue).

On appelle équation caractéristique de (E) l'équation  $r^2 + ar + b = 0$  ; on suppose que cette équation admet des solutions réelles.

1. Si l'équation caractéristique admet deux solutions réelles  $r_1$  et  $r_2$ , alors les solutions de  $(E_0)$  sont les fonctions de la forme  $t \mapsto K_1 e^{r_1 t} + K_2 e^{r_2 t}$ , où  $(K_1, K_2)$  sont deux réels quelconques.
2. Si l'équation caractéristique admet une seule solution réelle  $r$ , alors les solutions de  $(E_0)$  sont les fonctions de la forme  $t \mapsto (K_1 t + K_2) e^{r t}$ , où  $(K_1, K_2)$  sont deux réels quelconques.
3. Si  $y_0$  est une solution particulière de (E), alors les solutions de (E) sont les fonctions de la forme  $y + y_0$ , où  $y$  est solution de  $(E_0)$ .

**Proposition 4** (Quelques pistes de recherche de solution particulière).

Dans le cas d'une équation homogène  $y'' + ay' + by = c(t)$  :

- si  $c$  est une constante, on peut rechercher une solution particulière constante ;
- si  $c$  est une fonction polynomiale, on peut rechercher une solution polynomiale de même degré ;
- si  $c(t) = Ke^{\alpha t}$ , où  $\alpha$  n'est pas solution de l'équation caractéristique, on peut rechercher une solution sous la forme  $K'e^{\alpha t}$
- si  $c(t) = Ke^{\alpha t}$ , où  $\alpha$  est **une des deux solutions** de l'équation caractéristique (cas  $\Delta > 0$ ), on peut rechercher une solution sous la forme  $K'te^{\alpha t}$
- si  $c(t) = Ke^{\alpha t}$ , où  $\alpha$  est **l'unique solution** de l'équation caractéristique (cas  $\Delta = 0$ ), on peut rechercher une solution sous la forme  $K't^2 e^{\alpha t}$

## 4 Systèmes différentiels linéaires

**Définition 1.** On appelle système différentiel linéaire à coefficients constants tout système se mettant sous la forme

$$\begin{cases} x'_1 = a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,n}x_n \\ x'_2 = a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \dots + a_{2,n}x_n \\ \dots \\ x'_n = a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \dots + a_{n,n}x_n \end{cases}$$

Ici les  $x_i$  sont les fonctions inconnues, de classe  $\mathcal{C}^1$  sur un intervalle  $I$  ; et les  $a_{i,j}$  sont des réels.

En posant  $X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$  on réécrit ce système sous la forme  $X' = AX$ , où  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  est la matrice de coefficients  $a_{i,j}$ .

**Définition 2.** On appelle **problème de Cauchy** la donnée d'un système différentiel et d'une condition initiale.

Si  $A$  est une matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ,  $t_0$  est un réel, et  $X_0 = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ , on appelle problème de Cauchy la

recherche des  $X$  vérifiant  $\begin{cases} X' = AX \\ X(t_0) = X_0 \end{cases}$ .

Concrètement, les  $x_i$  sont des grandeurs qui évoluent au cours du temps en suivant le système différentiel. Un problème de Cauchy consiste donc, connaissant l'état à un instant donné  $t_0$  et les équations d'évolution, à obtenir l'expression des grandeurs à un temps  $t$  quelconque.

Un théorème puissant confirme ce qu'on souhaiterait : ces informations suffisent à déterminer les grandeurs à tout temps  $t$ . De plus ceci a lieu sans restriction sur le choix de l'état initial, ni sur l'instant auquel cet état est associé.

**Théorème 5** (Théorème de Cauchy).

Quels que soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ,  $t_0 \in \mathbb{R}$  et  $X_0 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ , il existe une unique solution au problème de Cauchy

$$\begin{cases} X' = AX \\ X(t_0) = X_0 \end{cases}, \text{ définie sur } \mathbb{R} \text{ entier.}$$

Au-delà de cette signification empirique, nous verrons des applications de ce théorème.

### 4.1 Résolution d'un système dans le cas A diagonalisable

On détermine le spectre de  $A$  et ses sous-espaces propres : ceci permet la détermination explicite des solutions.

**Théorème 6.** Soit le système différentiel  $X' = AX$ , où  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  est diagonalisable.

Si  $(U_1, \dots, U_n)$  est une base de  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  de vecteurs propres de  $M$ , avec  $U_i$  associé à la valeur propre  $\lambda_i$ , alors

les solutions de ce système sont les fonctions :  $t \mapsto \sum_{i=1}^n K_i e^{\lambda_i t} U_i$ , où  $K_1, \dots, K_n$  sont des réels quelconques.

La connaissance d'une condition initiale  $X(t_0) = X_0$  permet alors de fixer les  $K_i$  (le théorème de Cauchy assure leur existence et unicité).

On dispose d'une autre méthode de résolution, qui consiste à changer de base pour obtenir un système plus simple. Il faut la retenir car elle peut se généraliser au cas où  $A$  n'est pas diagonalisable.

**Théorème 7** (Une autre méthode de résolution). Soit le système différentiel  $X' = AX$ , où  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  est diagonalisable.

Soient  $P$  inversible et  $D$  diagonale de coefficients diagonaux  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  telles que  $A = PDP^{-1}$ , et  $Y = P^{-1}X$ .

Alors  $Y$  est solution de  $Y' = DY$ ; de sorte que

$$Y(t) = \begin{pmatrix} K_1 e^{\lambda_1 t} \\ K_2 e^{\lambda_2 t} \\ \vdots \\ K_n e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}, \text{ où } K_1, \dots, K_n \text{ sont des réels quelconques}$$

On a ensuite  $X(t) = PY(t)$ .

## 4.2 Équivalence équation d'ordre 2 / système d'ordre 1

On peut se demander comment procéder si les équations différentielles font apparaître des dérivées d'ordre supérieur à 1.

On peut en fait toujours se ramener à un système d'ordre 1. Nous présentons ici un cas simple, mais qui peut se généraliser et aboutit au fait que tout système linéaire d'ordre  $n$  est équivalent, *via* un changement de fonction inconnue, à un système linéaire d'ordre 1.

**Théorème 8.** Soit (E) :  $y'' + ay' + by + 0$  et (S) :  $\begin{cases} x' = -ax - by \\ y' = x \end{cases}$ .

$y$  est une solution de (E) ssi  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  est une solution de (S). Autrement dit, les solutions de (E) sont les « secondes composantes » des solutions de (S).

## 5 Aspects qualitatifs

### Définition 3.

On appelle :

- **trajectoire d'un système différentiel**  $X' = AX$  tout ensemble de la forme  $\{X(t) \mid t \in \mathbb{R}\}$  où  $X$  est une solution du système.

Notamment, si  $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ ,  $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$  et une trajectoire est un ensemble de points de plan.

- **point d'équilibre** du système toute solution  $X(t) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$  constante (trajectoires réduites à un point).

- **trajectoire convergente** toute solution  $X : t \mapsto \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$  où :  $\forall i \in [1, n], \lim_{t \rightarrow +\infty} x_i(t) = \ell_i \in \mathbb{R}$ .

### Proposition 9.

- Les points d'équilibre du système  $X' = AX$  sont les vecteurs de  $\text{Ker}(A)$ .
- Corollaire : si  $A$  est inversible, le seul point d'équilibre est  $(0, 0, \dots, 0)$ .
- Si une trajectoire est convergente, sa limite est un point d'équilibre.
- Si toutes les valeurs propres de  $A$  sont négatives ou nulles, toute trajectoire est convergente, et la limite est un point d'équilibre.
- Corollaire des précédentes : si toutes les vap de  $A$  sont strictement négatives, alors toute trajectoire converge vers  $(0, 0, \dots, 0)$ .
- Si  $A$  admet au moins une valeur propre strictement positive, il existe des trajectoires divergentes.