

Devoir maison n°4 À rendre pour le 3/01

Exercice 1

Partie 1

Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x^3 - 3x$$

On note \mathcal{C} la courbe représentative de f .

1. Étudier la parité de f sur \mathbb{R} .
2. Déterminer les variations de f sur $[0, +\infty[$, et calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
3. Montrer que f est convexe sur $[0, +\infty[$ et justifier que le point d'abscisse 0 est un point d'inflexion de la courbe \mathcal{C} .
4. On note \mathcal{T} la tangente à la courbe \mathcal{C} au point d'abscisse 0.
Déterminer une équation de \mathcal{T} et préciser la position relative de \mathcal{C} par rapport à \mathcal{T} .
5. Tracer, sur une même figure, l'allure de la courbe \mathcal{C} (sur \mathbb{R}) et de la droite \mathcal{T} .
6. Soit a un réel.
 - (a) Montrer que, si $|a| < 2$, alors l'équation $x^3 - 3x + a = 0$, d'inconnue x , possède exactement trois solutions réelles.
 - (b) Montrer que, si $|a| > 2$, alors l'équation $x^3 - 3x + a = 0$, d'inconnue x , possède une unique solution réelle.

Partie 2

Pour tout réel a , on considère la matrice :

$$A_a = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

7.
 - (a) Calculer $A_a^3 - 3A_a + aI_3$.
 - (b) Soient λ un réel tel que $\lambda^3 - 3\lambda + a = 0$, et soit $X = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix}$.
Exprimer $A_a X$ en fonction de λ et de X .
 - (c) Dédurre des deux questions précédentes que pour tout réel λ :
$$\lambda \text{ est valeur propre de } A_a \Leftrightarrow \lambda^3 - 3\lambda + a = 0$$
8. **Dans cette question uniquement**, on suppose $a = 2$.
 - (a) Déterminer les valeurs propres et une base de chaque sous-espace propre de A_2 .
 - (b) La matrice A_2 est-elle diagonalisable ?
9. **Dans cette question uniquement**, on suppose $|a| > 2$.
La matrice A_a est-elle diagonalisable ?
Indication: On pourra utiliser le résultat de la question 6.
10. **Dans cette question uniquement**, on suppose $a \in]-2, 2[$.
 - (a) Montrer que A_a est diagonalisable.
Indication: On pourra utiliser le résultat de la question 6.

- (b) On note λ, μ, ν les valeurs propres de A_a . On considère les matrices $D = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \nu \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \lambda & \mu & \nu \\ \lambda^2 & \mu^2 & \nu^2 \end{pmatrix}$.

Justifier que P est inversible.

Exprimer A_a en fonction de D et P .

Partie 3

Pour tout réel a , on considère l'équation différentielle (\mathcal{E}_a) suivante, d'inconnue $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ trois fois dérivable sur \mathbb{R} :

$$(\mathcal{E}_a) : y''' - 3y' + ay = 0$$

11. **Dans cette question uniquement**, on suppose que $a = 0$.

- (a) Soit y une solution de l'équation $(\mathcal{E}_0) : y''' - 3y' = 0$. Déterminer la forme générale de la fonction y' .
- (b) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation (\mathcal{E}_0) .

Dans la suite de l'exercice, pour toute fonction y trois fois dérivable sur \mathbb{R} , on note $Y = \begin{pmatrix} y \\ y' \\ y'' \end{pmatrix}$; on a alors $Y' = \begin{pmatrix} y' \\ y'' \\ y''' \end{pmatrix}$.

12. Montrer que, pour tout réel a , y est solution de l'équation différentielle (\mathcal{E}_a) si et seulement si $Y' = A_a Y$.

13. **Dans cette question uniquement**, on suppose $a \in]-2, 2[$.

- (a) Montrer qu'une fonction $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est solution de l'équation différentielle (\mathcal{E}_a) si et seulement si $Z' = DZ$, où $Z = P^{-1}Y$ et D et P sont définies à la question 10b.
- (b) Montrer que les solutions de l'équation différentielle (\mathcal{E}_a) sont les fonctions y définies par une expression de la forme :

$$\forall x \in \mathbb{R}, y(x) = \alpha_1 e^{\lambda x} + \alpha_2 e^{\mu x} + \alpha_3 e^{\nu x}$$

où $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ sont des réels.

- (c) Vérifier en particulier que les résultats de 11b et 13b sont cohérents.

Exercice 2

Sur le marché des véhicules d'occasion, on observe en général une baisse du prix de revente (ou décote) d'un véhicule lorsque le nombre de kilomètres parcourus augmente. Une bonne estimation de cette baisse de prix permet au vendeur de fixer avec précision le prix de revente d'un véhicule.

Les trois parties de cet exercice sont indépendantes.

Partie 1

Étude d'une base de données.

On dispose d'une base de données comportant deux tables `vehicule` et `annonce` décrites ci-dessous.

- La table `vehicule` recense des informations sur les modèles de véhicules en vente sur le marché. Elle est composée des attributs suivants :
 - `id_vehicule` (de type `INTEGER`) : un code permettant d'identifier de façon unique chaque référence de véhicule (marque et modèle).
 - `marque` (de type `TEXT`) : le nom du constructeur du véhicule.
 - `modele` (de type `TEXT`) : le modèle du véhicule, un constructeur proposant en général plusieurs modèles de véhicules à la vente.
 - `prix_neuf` (de type `INTEGER`) : prix de vente du véhicule neuf.
- La table `annonce` regroupe des informations sur un grand nombre d'annonces de véhicules d'occasion. Chaque enregistrement correspond à une annonce et possède les attributs suivants.
 - `id_annonce` (de type `INTEGER`) : un code permettant d'identifier chaque annonce de façon unique.
 - `id_vehicule` (de type `INTEGER`) : l'identifiant du modèle de véhicule vendu, qui correspond à l'identifiant utilisé dans la table `vehicules`.

- `annee` (de type `INTEGER`) : année de première mise en circulation du véhicule.
 - `km` (de type `INTEGER`) : nombre de kilomètres parcourus par le véhicule au moment de la revente.
 - `prix_occasion` (de type `INTEGER`) : prix de vente du véhicule d'occasion.
1. En justifiant brièvement, identifier une clef primaire dans chacune des tables `vehicule` et `annonce`, ainsi qu'une clef étrangère dans la table `annonce`.
 2. Écrire une requête SQL permettant d'extraire les noms de tous les modèles de véhicules mis en vente par le constructeur `Dubreuil Motors`.
 3. Expliquer le fonctionnement de la requête SQL suivante et préciser l'effet éventuel de cette requête sur chacune des tables `vehicule` et `annonce`.

```

1 UPDATE annonce
2 SET prix_occasion = prix_neuf
3 FROM vehicule
4 WHERE vehicule.id_vehicule = annonce.id_vehicule
5 AND vehicule.prix_neuf < annonce.prix_occasion

```

4. À l'aide d'une jointure, écrire une requête SQL permettant d'obtenir, sur une même table, la liste de toutes les annonces de la table `annonce` avec les attributs suivants :
 - l'identifiant de l'annonce `id_annonce`.
 - le kilométrage `km`,
 - le prix de vente du véhicule neuf `prix_neuf`,
 - le prix de l'annonce d'occasion `prix_occasion`.

Partie 2

Étude de la décote.

Soit $n \geq 1$ un entier. On suppose dans cette partie qu'on dispose des informations suivantes concernant n annonces de véhicules d'occasion.


Ces informations sont stockées sous forme de tableaux Numpy à une dimension et à n éléments :

- Le tableau Numpy nommé `km` contient, pour chaque annonce, le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule vendu depuis sa mise en circulation.
- Le tableau Numpy nommé `rapport` contient, pour chaque annonce, le quotient du prix de revente d'occasion du véhicule par son prix de vente neuf.

Ainsi, les éléments du tableau `rapport` sont des flottants compris entre 0 et 1.

Les données contenues dans ces variables sont classés dans le même ordre. Ainsi, pour tout indice i entre 0 et $n-1$, `km[i]` et `rapport[i]` correspondent respectivement au kilométrage et au rapport de prix occasion/neuf d'une même annonce.

5. Écrire une suite d'instructions Python permettant d'afficher le rapport de prix occasion/neuf du véhicule ayant le plus grand kilométrage parmi toutes les annonces (ou de l'un de ces véhicules si plusieurs annonces possèdent un kilométrage maximal).
6. Écrire une suite d'instructions Python permettant de représenter graphiquement, sous forme de nuage de points, les points du plan de coordonnées $(km[i], rapport[i])$, où i décrit l'ensemble des indices de 0 à $n-1$.
7. Les instructions données à la question précédente permettent d'obtenir la figure représentée ci-dessous. Une approximation par régression linéaire vous semble-t-elle pertinente pour modéliser l'évolution du prix des véhicules d'occasion (rapporté au prix neuf) en fonction de leur kilométrage ?



8. On calcule le coefficient de corrélation linéaire rho de la série statistique double (km, rapport). Parmi les quantités suivantes, en justifiant votre réponse, indiquer la valeur obtenue.

- (a) rho=0.113,
- (b) rho=-0.406,
- (c) rho=-0.985,
- (d) rho=0.917.

Partie 3

Un modèle de décroissance exponentielle.

Soit $n \geq 1$ un entier. Dans cette partie, on étudie deux variables statistiques quantitatives x et r . On souhaite expliquer la dépendance de r par rapport à x à l'aide d'une relation exponentielle de la forme :

$$r = ae^{-cx} \quad (*)$$

où a et c sont des réels que l'on cherche à déterminer, avec $a > 0$. On dispose pour cela de deux séries statistiques (x_1, x_2, \dots, x_n) et (r_1, r_2, \dots, r_n) représentant des mesures des variables x et r respectivement.

9. On pose $y = \ln r$.

Montrer que les variables x et r vérifient la relation (*) si et seulement si x et y vérifient une relation de la forme :

$$y = \alpha x + \beta$$

où α et β sont des paramètres réels que l'on exprimera en fonction de a et c .

On rappelle que la droite de régression linéaire de $y = (y_1, \dots, y_n)$ par rapport à $x = (x_1, \dots, x_n)$ a pour équation :

$$y = \frac{s_{x,y}}{s_x^2}(x - \bar{x}) + \bar{y}$$

où :

- $s_{x,y}$ désigne la covariance empirique de la série statistique double (x, y) ;
- \bar{x} et \bar{y} désignent les moyennes des séries statistiques x et y respectivement ;
- s_x^2 désigne la variance de la série statistique x .

10. Rappeler les formules mathématiques définissant \bar{x} , s_x^2 et $s_{x,y}$ en fonction de n , x_1, \dots, x_n et y_1, \dots, y_n . Rappeler les formules de Koenig et de Koenig-Huygens permettant de reformuler s_x^2 et $s_{x,y}$.

11. Exprimer a et c en fonction de \bar{x} , \bar{y} , s_x^2 et $s_{x,y}$.

12. Recopier et compléter la fonction suivante pour qu'elle renvoie la covariance empirique des séries statistiques x et y fournies en argument d'entrée sous forme de tableaux Numpy à une dimension.

```
import numpy as np
def covariance(x,y):
    prod = x*y
    return .....
```

13. Recopier et compléter la fonction suivante, prenant en arguments d'entrée les séries statistiques (x_1, x_2, \dots, x_n) et (r_1, r_2, \dots, r_n) (sous forme de tableaux Numpy à une dimension x et r respectivement), pour qu'elle renvoie des valeurs approchées des paramètres a et c qui interviennent dans la relation (*).

```
import numpy as np
def ajustement_exp(x,r):
    y = np.log(r)
    moy_x = np.mean(x)
    moy_y = np.mean(y)
    cov_xy = covariance(x,y)
    var_x = ..... # variance de x
    c = .....
    a = .....
    return a,c
```

Annexe - Fonctions Python utiles

La bibliothèque `numpy`.

- Exemple d'importation : `import numpy as np`.
- Les opérations `+`, `-`, `*`, `/`, `**`, lorsqu'elles sont possibles, peuvent être réalisées entre deux tableaux Numpy de dimensions compatibles et agissent alors **coefficient par coefficient**.
- Les fonctions `np.log` (logarithme népérien) et `np.exp` (fonction exponentielle) s'appliquent à une quantité numérique ou à un tableau Numpy de nombres. Dans ce dernier cas, les fonctions sont appliquées à chaque élément du tableau donné en argument d'entrée.
- La fonction `np.mean`, prend en argument d'entrée un tableau Numpy de nombres, et renvoie la moyenne des éléments du tableau.

La bibliothèque `matplotlib.pyplot`.

- Exemple d'importation : `import matplotlib.pyplot as plt`.
- La fonction `plt.plot` prend en arguments d'entrée deux tableaux Numpy `x` et `y` à une ligne et de même longueur, et renvoie une figure constituée de la ligne brisée joignant les points du plan de coordonnées (x_i, y_i) , où x_i et y_i sont respectivement les coefficients des tableaux `x` et `y`.
- La fonction `plt.scatter` prend en arguments d'entrée deux tableaux Numpy `x` et `y` à une dimension et de même longueur, et produit un nuage de points composé de tous les points du plan de coordonnées (x_i, y_i) , où x_i et y_i sont respectivement les coefficients des tableaux `x` et `y`.
- La fonction `plt.show`, employée sans argument d'entrée, permet l'affichage d'une figure préalablement tracée, par exemple avec les fonctions `plt.plot` ou `plt.scatter`.

Le module `numpy.random`.

- Exemple d'importation : `import numpy.random as rd`.
- La fonction `rd.random`, appelée sans argument d'entrée, renvoie une réalisation aléatoire de la loi uniforme sur l'intervalle $[0, 1[$. Il est également possible de spécifier les dimensions d'un tableau Numpy en argument d'entrée pour obtenir un tableau dont les coefficients sont des réalisations indépendantes de la loi uniforme sur $[0, 1[$.
- La fonction `rd.randint` prend deux entiers n et p (avec $p > n$) en arguments d'entrée et renvoie une réalisation aléatoire de la loi uniforme discrète sur $\llbracket n, p - 1 \rrbracket$.