

CHAPITRE 3

Valeurs propres et vecteurs propres

*Une idée qui ne peut servir qu'une seule fois est une astuce.
Sinon, elle devient une méthode.*

GEORGE PÓLYA

Mathématicien américain d'origine hongroise
et suisse (1887-1985).

Ce chapitre est un préliminaire à la réduction des matrices et endomorphismes d'espaces vectoriels de dimension finie qui est l'un des objectifs du programme de deuxième année. Il sera complété par le chapitre « diagonalisation ». Le chapitre commence par des rappels de première année sur des polynômes d'endomorphismes et de matrices pour ensuite définir la notion de valeur propre et de vecteur propre.

1

Rappels : polynômes d'endomorphismes et de matrices

Rappelons que, pour un endomorphisme φ de E , les applications $\varphi^2 = \varphi \circ \varphi$, $\varphi^3 = \varphi \circ \varphi \circ \varphi \dots$ sont parfaitement définies et linéaires. Les **puissances** de φ sont les applications :

$$\varphi^0 = \text{id}_E \quad \text{et} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}^*, \quad \varphi^n = \underbrace{\varphi \circ \dots \circ \varphi}_{n \text{ compositions}}.$$

Remarque. Comme pour les matrices, il existe une version de la formule du binôme de Newton dans le cas des endomorphismes. Soient $\varphi, \psi \in \mathcal{L}(E)$ qui *commutent* ($\varphi \circ \psi = \psi \circ \varphi$). Alors pour tout entier naturel p ,

$$(\varphi + \psi)^p = (\varphi + \psi) \circ (\varphi + \psi) \circ \dots \circ (\varphi + \psi) = \sum_{i=0}^p \binom{p}{i} \varphi^i \circ \psi^{p-i}.$$

Exemple. Calculons les puissances de l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$:

$$\varphi : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) & \mapsto (2x + y, 2y). \end{cases}$$

Remarquons que $\varphi = 2\text{id}_{\mathbb{R}^2} + \psi$, où ψ est l'endomorphisme défini par $\psi(x, y) = (y, 0)$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Or, ψ^2 est l'application nulle. En effet, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\psi^2((x, y)) = \psi(\psi(x, y)) = \psi((y, 0)) = (0, 0).$$

Puis, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 2$,

$$\psi^k = \psi^2 \circ \psi^{k-2} = 0_{\mathcal{L}(E)}.$$

Comme les endomorphismes $2\text{id}_{\mathbb{R}^2}$ et ψ commutent, la formule du binôme de Newton permet d'écrire :

$$\begin{aligned} \varphi^n &= (2\text{id}_{\mathbb{R}^2} + \psi)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (2\text{id}_{\mathbb{R}^2})^{n-k} \circ \psi^k = \sum_{k=0}^2 \binom{n}{k} (2\text{id}_{\mathbb{R}^2})^{n-k} \circ \psi^k \\ &= \binom{n}{0} 2^n \text{id}_{\mathbb{R}^2} \circ \psi^0 + \binom{n}{1} 2^{n-1} \text{id}_{\mathbb{R}^2} \circ \psi^1 = 2^n \text{id}_{\mathbb{R}^2} + n 2^{n-1} \psi. \end{aligned}$$

Autrement dit, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\varphi^n((x, y)) = 2^{n-1}(2x + ny, 2y).$$

DÉFINITIONS

polynôme de matrice, d'endomorphisme

Soient $P(x) = \sum_{i=0}^p a_i x^i \in \mathbb{R}[x]$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\varphi \in \mathcal{L}(E)$.

- Le **polynôme de matrice** $P(A)$ est défini par $P(A) = \sum_{i=0}^p a_i A^i \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Un polynôme P est **annulateur** de A si $P(A) = 0_n$.

- Le **polynôme d'endomorphisme** $P(\varphi)$ est défini par $P(\varphi) = \sum_{i=0}^p a_i \varphi^i \in \mathcal{L}(E)$.

Un polynôme P est **annulateur** de φ si $P(\varphi) = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

Règles de calcul

On démontre que pour tous $\lambda \in \mathbb{R}$, $P, Q \in \mathbb{R}[x]$,

$$(\lambda P)(A) = \lambda P(A) \quad \text{et} \quad (P + Q)(A) = P(A) + Q(A).$$

Retenons également la propriété de commutativité :

$$(PQ)(A) = P(A)Q(A) = Q(A)P(A) = (QP)(A).$$

On a de même avec des endomorphismes

$$(\lambda P)(\varphi) = \lambda P(\varphi), \quad (P + Q)(\varphi) = P(\varphi) + Q(\varphi) \quad \text{et} \quad (PQ)(\varphi) = P(\varphi) \circ Q(\varphi) = Q(\varphi) \circ P(\varphi) = (QP)(\varphi).$$

Exemple. Reprenons l'exemple de $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ défini par $\varphi((x, y)) = (2x + y, x)$.

Vérifions que le polynôme P défini par $P(t) = t^2 - 2t - 1$ est annulateur de φ . Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned} \varphi^2((x, y)) &= \varphi(\varphi((x, y))) = \varphi((2x + y, x)) \\ &= (2(2x + y) + x, 2x + y) = (5x + 2y, 2x + y); \\ -2\varphi((x, y)) &= (-4x - 2y, -2x); \\ -\text{id}_E(x, y) &= (-x, -y). \end{aligned}$$

$$\varphi^2((x, y)) - 2\varphi((x, y)) - \text{id}_{\mathbb{R}^2}(x, y) = (0, 0).$$

Comme cela est valable pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on écrit simplement $\varphi^2 - 2\varphi - \text{id}_E = 0_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^2)}$.

Exercice 1



♣ ♪ ♫ Existence d'un polynôme annulateur

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. En étudiant la famille $(I_n, A, \dots, A^p)$ pour un entier p bien choisi, montrer que A admet un polynôme annulateur. p. 24

VP1

Exercice 2



♦♦ Exemples

Les questions sont indépendantes.

1. Donner un polynôme annulateur à l'endomorphisme $\varphi : P \in \mathbb{R}_n[x] \mapsto P' \in \mathbb{R}_n[x]$.

p. 24

2. Même question avec $\psi : P \in \mathbb{R}_n[x] \mapsto P(x+7) \in \mathbb{R}_n[x]$.

On pourra remarquer que $\psi(P) - P \in \mathbb{R}_{n-1}[x]$.

VP2

Exemples. Polynômes d'une matrice diagonale, triangulaire.

Posons :

$$D = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & d_n \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad T = \begin{bmatrix} t_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & * \\ 0 & \cdots & 0 & t_n \end{bmatrix}.$$

Alors

$$P(D) = \begin{bmatrix} P(d_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & P(d_n) \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad P(T) = \begin{bmatrix} P(t_1) & * & \cdots & * \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & * \\ 0 & \cdots & 0 & P(t_n) \end{bmatrix}.$$

Remarque. Notez que si tous les coefficients diagonaux d_i sont racines du polynôme P , alors P est un polynôme annulateur de D .

Exercice 3



Les questions sont indépendantes.

1. Soient A, B deux matrices carrées semblables. Montrer que tout polynôme annulateur de A est annulateur de B .
2. Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $P \in \mathbb{R}[x]$ annulateur de A . Montrer que si $P(0) \neq 0$ alors A est inversible.

p. 24

#VP3

PROPOSITION

polynôme d'endomorphisme, de matrice

Soient E un espace vectoriel de dimension finie dont $\mathcal{B}$ est une base et φ un endomorphisme de E .
Pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi)^k = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi^k).$$

Plus généralement, pour tout $P \in \mathbb{R}[x]$,

$$P(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi)) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(P(\varphi)).$$

Preuve. • Le premier point s'obtient par un raisonnement par récurrence sur k à partir de la formule

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi^{k+1}) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi^k \circ \varphi) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi^k) \cdot \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi).$$

- Le second point découle du premier et de la linéarité de l'application $\varphi \mapsto \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi)$.

2

Valeurs propres, vecteurs propres, cas matriciel

2.1

Premières définitions

DÉFINITIONS

valeurs propre, vecteur propre

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\lambda \in \mathbb{R}$ et $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

On dit que λ est une **valeur propre** de A et que X est un **vecteur propre** pour A associé à la valeur propre λ si

$$AX = \lambda X \quad \text{et} \quad X \neq 0_{n,1}.$$

Exemple. Posons

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad X = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad Z = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

de sorte que

$$AX = 0 \cdot X, \quad AY = Y \quad \text{et} \quad AZ = -2Z.$$

Comme X , Y et Z sont des matrices-colonnes non nulles, 0, 1 et -2 sont des valeurs propres de A .

 **Attention.** Un vecteur propre est toujours non nul.

DÉFINITION

spectre

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
Le **spectre** de A , noté $\text{Sp}(A)$, est l'ensemble des valeurs propres de A .

Exemple. En reprenant l'exemple précédent, $\{0; 1; -2\} \subset \text{Sp}(A)$.

Python. Voici le code pour obtenir une approximation des valeurs propres.

Editeur

```
import numpy as np
import numpy.linalg as al
# On importe la sous-bibliothèque
    linalg
A=np.array([[1,3,0],[0,-2,0],[-1,-2,0]])
# On définit la matrice A
print(al.eigvals(A))
```

Console

```
>>> # script executed
[ 0.  1. -2.]
```

Selon ce calcul, -2 , 0 et 1 sont toutes les valeurs propres de la matrice A . On conjecture donc que $\text{Sp}(A) = \{-2; 0; 1\}$.

2.2 Caractérisations des valeurs propres

THÉORÈME

caractérisation avec l'inversibilité

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Les énoncés suivants sont équivalents.

- i) Le réel λ est une valeur propre de A .
- ii) La matrice $A - \lambda I_n$ n'est pas inversible.

Autrement dit, $\text{Sp}(A)$ est l'ensemble des réels λ pour lesquels la matrice $A - \lambda I_n$ n'est pas inversible.

Preuve. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \lambda \in \text{Sp}(A) &\iff \exists X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0_{n,1}\}, \quad AX = \lambda X \\ &\iff \exists X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0_{n,1}\}, \quad (A - \lambda I_n)X = 0_{n,1} \\ &\iff \text{Ker}(A - \lambda I_n) \neq \{0_{n,1}\} \\ &\iff A - \lambda I_n \text{ n'est pas inversible.} \end{aligned}$$

La dernière équivalence est une conséquence de la formule du rang. ■

Remarque. En particulier, 0 est valeur propre si et seulement si la matrice A n'est pas inversible.

COROLLAIRE

matrices triangulaires

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Si A est une matrice triangulaire,
alors les valeurs propres de A sont les coefficients diagonaux de A .

Preuve. Notons $A = (a_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2}$. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. La matrice $A - \lambda I_n$ est triangulaire et ses coefficients diagonaux sont les réels $a_{ii} - \lambda$ où $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$.
Il suffit ensuite de rappeler qu'une matrice triangulaire n'est pas inversible si et seulement si au moins l'un de ses coefficients diagonaux est nul.



Attention. C'est grossièrement faux si la matrice n'est pas triangulaire.

On pourra par exemple vérifier que $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ n'admet aucune valeur propre réelle.

2.3 Les sous-espaces propres $E_\lambda(A)$

DÉFINITION

$E_\lambda(A)$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Pour tout réel λ , on pose

$$E_\lambda(A) = \{X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \mid AX = \lambda X\}.$$

En remarquant que $E_\lambda(A) = \text{Ker}(A - \lambda I_n)$, on en déduit que :

PROPOSITION

structure de $E_\lambda(A)$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

- $E_\lambda(A)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.
- $E_\lambda(A) \neq \{0_{n,1}\}$ si et seulement si λ est une valeur propre de A .

Remarque. La formule du rang donne alors $\dim(E_\lambda(A)) + \text{rg}(A - \lambda I_n) = n$.

Vocabulaire. Si $E_\lambda(A) \neq \{0_{n,1}\}$ alors on parle de **l'espace propre associé à la valeur propre λ** . Dans ce cas,

$$1 \leq \dim(E_\lambda(A)) \leq n.$$

Exercice 4



◆ Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\alpha \in \mathbb{R}^*$, $\beta \in \mathbb{R}$.

Les questions sont indépendantes.

1. Montrer que si A et B sont semblables alors $\text{Sp}(A) = \text{Sp}(B)$ et les sous-espaces propres de A et B associés à la même valeur propre ont même dimension.

p. 24

2. 🎵 **Transformation affine du spectre**

Donner le lien entre le spectre de A et celui de $\alpha A + \beta I_n$?

VP4

Exemple. Le cas diagonal.

Si A est une matrice diagonale, alors les valeurs propres de A sont exactement les coefficients diagonaux de A et pour $\lambda \in \text{Sp}(A)$, la dimension de $E_\lambda(A)$ est égale au nombre de fois où λ apparaît sur la diagonale de A .

Exercice 5



◆🎵 **Vrai ou Faux?** Pour tous $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$,

1. Si $\lambda \in \text{Sp}(A)$ alors $\lambda^2 \in \text{Sp}(A^2)$.

✓ ×

2. Si $\lambda^2 \in \text{Sp}(A^2)$ alors $\lambda \in \text{Sp}(A)$.

✓ ×

3. $\text{Sp}(A) = \text{Sp}({}^t A)$.

✓ ×

p. 25

4. $E_\lambda(A) = E_\lambda({}^t A)$.

✓ ×

5. $\dim(E_\lambda(A)) = \dim(E_\lambda({}^t A))$.

✓ ×

6. Si A est inversible, $\lambda \in \text{Sp}(A)$ ssi $\lambda^{-1} \in \text{Sp}(A^{-1})$.

✓ ×

VP5

Exercice 6



◆🎵 Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Montrer que si la somme des coefficients de A sur chaque ligne vaut 1 alors $1 \in \text{Sp}(A)$.

p. ??

2. Est-ce encore vrai si la somme des coefficients de A sur chaque colonne vaut 1?

VP6

3

Valeurs propres, vecteurs propres, cas des endomorphismes

3.1 Définitions et exemples

Reprenons et adaptons les définitions au cas des endomorphismes d'un espace vectoriel E .

DÉFINITIONS

valeur propre, vecteur propre, spectre

Soit $\varphi \in \mathcal{L}(E)$.

- Soient $\lambda \in \mathbb{R}$ et $u \in E$. On dit que λ est une **valeur propre** de φ et que u est un **vecteur propre** pour φ associé à la valeur propre λ si

$$\varphi(u) = \lambda u \quad \text{et} \quad u \neq 0_E.$$

- L'ensemble des valeurs propres de φ est le **spectre** de φ , il est noté $\text{Sp}(\varphi)$.

Exemple. Posons $u = (1, 0, -2)$, $v = (0, 0, 1)$, $w = (1, 1, -2)$ et

$$\varphi : \begin{cases} \mathbb{R}^3 & \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \mapsto (x + 2y, 3y, 2x - 4y + 2z) \end{cases}$$

On a $\varphi(u) = u$, $\varphi(v) = 2v$ et $\varphi(w) = 3w$. Comme u , v et w sont non nuls, 1, 2 et 3 sont trois valeurs propres de φ . C'est-à-dire, $\{1; 2; 3\} \subset \text{Sp}(\varphi)$.

Remarque. Le vecteur u (non nul) est un vecteur propre de φ si et seulement si la droite vectorielle $\text{Vect}(u)$ est stable par φ .

Preuve. Raisonnons par double implication.

$\Rightarrow$ Si u est vecteur propre de φ alors pour tout $v = \mu u \in \text{Vect}(u)$,

$$\varphi(v) = \varphi(\mu u) = \mu \varphi(u) = \mu \lambda u \in \text{Vect}(u).$$

Le sous-espace $\text{Vect}(u)$ est stable par φ .

$\Leftarrow$ Réciproquement, si $\text{Vect}(u)$ est stable par φ alors $\varphi(u) \in \text{Vect}(u)$. Autrement dit, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\varphi(u) = \lambda u$. C'est-à-dire que u (non nul) est vecteur propre de φ .

Exercice 7



◆ Exemples

Les questions sont indépendantes.

On pose $\varphi : \begin{cases} \mathbb{R}_n[x] & \rightarrow \mathbb{R}_n[x] \\ P & \mapsto P' + 2P \end{cases}$ et $\psi : \begin{cases} \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) & \rightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ f & \mapsto f' \end{cases}$

p. ??

1. Étudier les valeurs propres de l'endomorphisme φ .
2. Montrer que tout réel est valeur propre de ψ .

Remarque. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Considérons l'endomorphisme

$$\varphi_A : \begin{cases} \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) & \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \\ X & \mapsto AX. \end{cases}$$

Les valeurs propres (et vecteurs propres) de φ_A correspondent exactement aux valeurs propres (et vecteurs propres) de la matrice A .

DÉFINITION - PROPOSITION

 $E_\lambda(\varphi)$

Soient $\varphi \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On définit le sous-espace vectoriel $E_\lambda(\varphi)$ de E par

$$E_\lambda(\varphi) = \{u \in E \mid \varphi(u) = \lambda u\} = \text{Ker}(\varphi - \lambda \text{id}_E).$$

Remarques.

- Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $E_\lambda(\varphi)$ est un espace stable par φ .
- $E_\lambda(\varphi)$ est bien un s.e.v de E puisque c'est le noyau d'une application linéaire.
- Si λ est une valeur propre, on dit que $E_\lambda(\varphi)$ est l'**espace propre associé à la valeur propre λ** .

3.2 Précision en dimension finie

THÉORÈME

lien matrice et endomorphisme

Soient E un espace vectoriel de dimension finie, $\varphi \in \mathcal{L}(E)$, $u \in E$, $\lambda \in \mathbb{R}$ et $\mathcal{B}$, une base de E .

- Si on note**
- U la matrice colonne des coordonnées de u dans la base $\mathcal{B}$.
 - $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi)$, la matrice de l'endomorphisme φ dans la base $\mathcal{B}$.

Alors, u est vecteur propre de l'endomorphisme φ pour la valeur propre λ si et seulement si U est vecteur propre de la matrice A pour la valeur propre λ .

Preuve. Nous avons vu au chapitre précédent que AU est la matrice colonne des coordonnées de $\varphi(u)$ dans la base $\mathcal{B}$. Ainsi

$$AU = \lambda U \iff \varphi(u) = \lambda u.$$

Application. Soient A et B deux matrices semblables. Elles représentent le même endomorphisme φ dans des bases différentes. On retrouve alors

$$\text{Sp}(A) = \text{Sp}(\varphi) = \text{Sp}(B) \quad (\text{voir exercice 4}).$$

PROPOSITION

caractérisations en dimension finie

Soient $\varphi \in \mathcal{L}(E)$ avec E de dimension finie et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a l'équivalence entre les énoncés suivants.

- i) Le réel λ est valeur propre de φ .
- ii) L'endomorphisme $\varphi - \lambda \text{id}_E$ n'est pas injectif.
- iii) L'endomorphisme $\varphi - \lambda \text{id}_E$ n'est pas bijectif.
- iv) $\text{rg}(\varphi - \lambda \text{id}_E) < \dim E$.

Preuve. Raisonnons par équivalences. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

$\lambda \in \text{Sp}(\varphi)$	$\iff$	$\exists u \in E \setminus \{0_E\}, \quad \varphi(u) = \lambda u$	
	$\iff$	$\exists u \in E \setminus \{0_E\}, \quad (\varphi - \lambda \text{id}_E)(u) = 0_E$	
	$\iff$	$\text{Ker}(\varphi - \lambda \text{id}_E) \neq \{0_E\}$	
	$\iff$	$\varphi - \lambda \text{id}_E$ n'est pas injective	
	$\iff$	$\varphi - \lambda \text{id}_E$ n'est pas bijective	car $\varphi - \lambda \text{id}_E$ est un endomorphisme de dimension finie
	$\iff$	$\varphi - \lambda \text{id}_E$ n'est pas surjective	
	$\iff$	$\text{Im}(\varphi - \lambda \text{id}_E) \neq E$	
	$\iff$	$\text{rg}(\varphi - \lambda \text{id}_E) < \dim(E)$	car $\text{Im}(\varphi - \lambda \text{id}_E) \subset E$ avec égalité si et seulement s'il y a égalité des dimensions.

3.3 Précisions pour des endomorphismes remarquables

Les homothéties

Pour rappel, une homothétie de E de rapport $\lambda \in \mathbb{R}^*$ est l'application

$$\lambda \text{ id}_E : \begin{cases} E & \rightarrow E \\ u & \mapsto \lambda \cdot u. \end{cases}$$

- Le polynôme P d'expression $P(x) = x - \lambda$ est un polynôme annulateur de l'homothétie de rapport λ .
- Tout vecteur non nul de E est vecteur propre pour la valeur propre λ .

Exercice 8



♦♦♦ 🎵 🔑 La réciproque

Soit $\varphi \in \mathcal{L}(E)$ non nul tel que tout vecteur non nul est vecteur propre de φ .
Montrer que φ est une homothétie.

p. 25


VP8

Les projecteurs

DÉFINITION (RAPPEL)

projecteur

Soient E un espace vectoriel et F, G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires.



Ainsi pour tout $u \in E$, il existe une unique décomposition
 $u = u_F + u_G$ où $(u_F, u_G) \in F \times G$. On pose

$$p : \begin{cases} E & \rightarrow E \\ u & \mapsto u_F. \end{cases}$$

Cette application est linéaire, elle est appelée le **projecteur** sur F parallèlement à G .

Remarque. On montre que p est un projecteur sur $F = \text{Im}(p)$ parallèlement à $G = \text{Ker}(p)$. En particulier, le noyau et l'image d'un projecteur sont supplémentaires dans E .

$$\text{Im}(p) \oplus \text{Ker}(p) = E.$$

Exercice 9



1. Savez-vous prouver cette remarque?
2. Vérifier que $\text{id}_E - p$ est un projecteur. Préciser ses éléments caractéristiques.

p. ??

VP9

THÉORÈME

caractérisation d'un projecteur

Soit $p : E \rightarrow E$ une application. Les énoncés suivants sont équivalents.

- i) p est un projecteur.
- ii) p est linéaire et $p \circ p = p$.

Résultat admis.

Spectre d'un projecteur.

Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ un projecteur. Soient F, G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E de sorte que p soit le projecteur sur F parallèlement à G . Afin que F ou G ne soient pas réduits à $\{0_E\}$, on suppose dans la suite que $p \neq 0_{\mathcal{L}(E)}$ et $p \neq \text{id}_E$.

- Pour tout $u \in F$ non nul, $p(u) = u$. Le vecteur u est donc vecteur propre pour la valeur propre 1.
Pour tout $u \in G$ non nul, $p(u) = 0_E$. Le vecteur u est donc vecteur propre pour la valeur propre 0. On a donc

$$\{0; 1\} \subset \text{Sp}(p).$$

Réciproquement, supposons que p admet une valeur propre λ associée à un vecteur propre u

$$p(u) = \lambda u \quad \text{puis} \quad p(p(u)) = \lambda^2 u.$$

Or on a aussi $p(p(u)) = p \circ p(u) = p(u) = \lambda u$. Comme u est non nul, $\lambda^2 = \lambda$ et $\lambda = 0$ ou $\lambda = 1$. On a donc

$$\text{Sp}(p) \subset \{0; 1\}.$$

En résumé, par double-inclusion

$$\text{Sp}(p) = \{0; 1\}.$$

- Le polynôme d'expression $x^2 - x = x(x - 1)$ est un polynôme annulateur de p . Notons que les valeurs propres de p sont des racines du polynôme.
- D'après les résultats précédents sur les projecteurs,

$$F = \text{Im}(p) = E_1(p) \quad \text{et} \quad G = \text{Ker}(p) = E_0(p).$$

D'où

$$E = F \oplus G = E_1(p) \oplus E_0(p).$$

Autrement dit, E se décompose suivant les espaces propres de p .

Exercice 10



✧ Soit $a \in \mathbb{R}^+$. On définit les applications :

$$p_a : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto \frac{1}{1+a^2} (x + ay, ax + a^2 y) \in \mathbb{R}^2 \quad \text{et} \quad q : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto \frac{1}{2} (x + y, x + y) \in \mathbb{R}^2.$$

1. Justifier que les applications p_a et q sont des projecteurs.
2. Vérifier que $(1, a)$ est vecteur propre de $p_a \circ q$.
3. En déduire l'unique valeur a pour laquelle $p_a \circ q$ est un projecteur.

p. 26

#VP10

Les symétries

Reprenons E , un espace vectoriel et F, G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E .

Pour tout $u \in E$, il existe un unique couple $(u_F, u_G) \in F \times G$ tel que $u = u_F + u_G$. On définit alors la symétrie par rapport à F parallèlement à G comme l'application :

$$s : u \in E \mapsto u_F - u_G \in E.$$

On montre que s est une application linéaire.

Exercice 11



✧ **Les symétries**

1. Faire un dessin similaire au cas des projecteurs pour illustrer la situation.
2. Préciser $s \circ s$. En déduire un polynôme annulateur.
3. On suppose que $s \neq \pm \text{id}_E$.
Étudier les valeurs propres de s et préciser les espaces propres à l'aide de F et G .
4. Soit p le projecteur sur F parallèlement à G .
Vérifier que $s = 2p - \text{id}_E$. Retrouver les résultats de la question 3.

p. 26

#VP11

THÉORÈME

polynômes et valeurs propres

Soient $Q \in \mathbb{R}[x]$ et $\varphi \in \mathcal{L}(E)$.

Si u est un vecteur propre de φ associé à la valeur propre λ ,
alors $Q(\varphi)(u) = Q(\lambda) \cdot u$.

Preuve. Par récurrence, on traite le cas des monômes $Q(x) = x^k$. Puis, par linéarité, on étend la relation à tous les polynômes. ■

Exercice 12



♦ Rédiger cette preuve précisément.

p. 26

VP12

COROLLAIRE

valeurs propres et racines

Soient $\varphi \in \mathcal{L}(E)$, $P \in \mathbb{R}[x]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Si $\begin{cases} \rightarrow \lambda \text{ est valeur propre de } \varphi. \\ \rightarrow P \text{ est un polynôme annulateur de } \varphi. \end{cases}$

Alors λ est une racine du polynôme P .

Preuve. Soit u un vecteur propre associé à la valeur propre λ . D'après l'énoncé précédent

$$P(\varphi)(u) = P(\lambda)u.$$

Or, P est un polynôme annulateur de φ ,

$$P(\varphi)(u) = 0_{\mathcal{L}(E)}(u) = 0_E.$$

Ainsi $P(\lambda)u = 0_E$, puis $P(\lambda) = 0$ car u est non nul (c'est un vecteur propre). En conclusion, λ est une racine de P . ■

Exemple. Soient E un espace vectoriel non réduit à $\{0\}$ et $\varphi \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent, c'est-à-dire qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $\varphi^p = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

Le polynôme d'expression x^p est annulateur de φ . Il ne peut avoir d'autre valeur propre que 0. De plus, φ ne peut être injectif, 0 est bien une valeur propre de φ . Finalement

$$\text{Sp}(\varphi) = \{0\}.$$

Remarques.

• On a des énoncés équivalents avec les matrices.

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $Q \in \mathbb{R}[x]$ et X est un vecteur propre de A associé à la valeur propre λ , alors

$$Q(A)X = Q(\lambda)X.$$

De plus, si Q est annulateur de A , λ est une racine de Q .

• La réciproque du corollaire est fausse. Une racine d'un polynôme annulateur n'est pas nécessairement une valeur propre. En effet, si P est annulateur de φ et $\alpha \notin \text{Sp}(\varphi)$, le polynôme d'expression $(x - \alpha)P(x)$ est encore un polynôme annulateur. Pour en savoir plus, on pourra consulter l'exercice 35, p. 19.

• Notons que le nombre de valeurs propres d'un endomorphisme de dimension finie est fini. En effet, nous avons vu en exercice qu'il existe toujours un polynôme annulateur P non nul de l'endomorphisme, il y a alors au plus $\deg(P)$ racines, au plus $\deg(P)$ valeurs propres.

Exercice 13



❖ Soient $n \in \mathbb{N} \setminus \{0; 1\}$ et $\varphi : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto {}^t M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Donner un polynôme annulateur de φ de degré 2.
2. En déduire les valeurs propres de φ .

p. 27

VP13

5

Somme directe de sous-espaces propres

THÉORÈME

somme directe des espaces propres

Soit φ un endomorphisme d'un espace vectoriel E .

Si $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ désignent p valeurs propres deux à deux distinctes de φ ,

alors la somme $\sum_{i=1}^p E_{\lambda_i}(\varphi)$ est directe.

Preuve par récurrence

Preuve. Justifions par récurrence que la propriété

$$\mathcal{P}(k) : \left\{ \begin{array}{l} \text{pour tout } (u_1, u_2, \dots, u_k) \in E_{\lambda_1}(\varphi) \times E_{\lambda_2}(\varphi) \times \dots \times E_{\lambda_k}(\varphi) \\ \sum_{j=1}^k u_j = 0_E \Rightarrow u_1 = \dots = u_k = 0_E. \end{array} \right.$$

→ **Initialisation.** La propriété $\mathcal{P}(1)$ est directement vraie.

→ **Hérédité.** Soit $k \in \llbracket 1; p-1 \rrbracket$ et supposons $\mathcal{P}(k)$. Soit $(u_1, u_2, \dots, u_{k+1}) \in E_{\lambda_1}(\varphi) \times E_{\lambda_2}(\varphi) \times \dots \times E_{\lambda_{k+1}}(\varphi)$ tels que

$$\sum_{j=1}^{k+1} u_j = 0_E \quad (L_1).$$

Par linéarité de φ , on obtient

$$0_E = \varphi(0_E) = \varphi\left(\sum_{j=1}^{k+1} u_j\right) = \sum_{j=1}^{k+1} \varphi(u_j) = \sum_{j=1}^{k+1} \lambda_j u_j = \sum_{j=1}^k \lambda_j u_j + \lambda_{k+1} u_{k+1} \quad (L_2)$$

On effectue ensuite $\lambda_{k+1} L_1 - L_2$ pour éliminer le terme en u_{k+1} et obtenir

$$\sum_{j=1}^k \underbrace{(\lambda_{k+1} - \lambda_j)}_{\in E_{\lambda_j}(\varphi)} u_j = 0_E.$$

D'après $\mathcal{P}(k)$, on a

$$\forall j \in \llbracket 1; k \rrbracket, \quad (\lambda_{k+1} - \lambda_j) u_j = 0_E.$$

Par construction $\lambda_{k+1} \neq \lambda_j$, donc $u_j = 0_E$ pour tout $j \in \llbracket 1; k \rrbracket$. Puis en reprenant L_1 , $u_{k+1} = 0_E$. Dès lors, $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie si $\mathcal{P}(k)$ l'est.

→ **Conclusion.** Pour tout $k \in \llbracket 1; p \rrbracket$, $\mathcal{P}(k)$ est vraie. En particulier, on obtient l'énoncé avec $\mathcal{P}(p)$. ■

Preuve les polynômes de Lagrange

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Soient $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ des réels deux à deux distincts, il existe p polynômes, notés L_i , appartenant à $\mathbb{R}_{p-1}[x]$ tels que

$$\forall i, j \in \llbracket 1, p \rrbracket, \quad L_i(\lambda_j) = \delta_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j, \\ 1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exercice 14



♦♦ ♪ Existence des polynômes de Lagrange

1. Prouver cet énoncé avec l'application linéaire

$$\varphi: \begin{cases} \mathbb{R}_{p-1}[x] & \rightarrow \mathbb{R}^p \\ P & \mapsto (P(\lambda_1), P(\lambda_2), \dots, P(\lambda_p)). \end{cases}$$

2. a) *Exemples*

p. 27

On suppose dans cette question uniquement que $p = 3$ et $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 0$ et $\lambda_3 = 1$.
Préciser les trois polynômes de Lagrange.

- b) Donner l'expression de L_i dans le cas général.

3. Justifier que pour tout $P \in \mathbb{R}_{p-1}[x]$, $P(x) = \sum_{i=1}^p P(\lambda_i) L_i$.

VP14

Preuve. Soit $(u_1, u_2, \dots, u_p) \in E_{\lambda_1}(\varphi) \times E_{\lambda_2}(\varphi) \times \dots \times E_{\lambda_p}(\varphi)$ tel que

$$\sum_{j=1}^p u_j = 0_E \quad (*)$$

Montrons que chaque u_j vaut 0_E pour justifier que la somme est directe.

Par définition des espaces propres, pour tout $i \in \llbracket 1; p \rrbracket$, $\varphi(u_i) = \lambda_i u_i$.

Soient $L_1, L_2, \dots, L_p$, les polynômes de Lagrange associés à $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ (distincts deux à deux). Soit $i \in \llbracket 1; p \rrbracket$. Pour tout $j \in \llbracket 1; p \rrbracket$, d'après le théorème précédent

$$L_i(\varphi)(u_j) = L_i(\lambda_j) u_j = \delta_{i,j} \cdot u_j.$$

Puis par linéarité de l'application $L_i(\varphi)$,

$$L_i(\varphi) \left(\sum_{j=1}^p u_j \right) = \sum_{j=1}^p L_i(\varphi)(u_j) = \sum_{j=1}^p \delta_{i,j} \cdot u_j = u_i.$$

Or, par application de l'endomorphisme $L_i(\varphi)$ aux deux membres de l'égalité (*), on a aussi

$$L_i(\varphi) \left(\sum_{j=1}^p u_j \right) = L_i(\varphi)(0_E) = 0_E.$$

Il vient $u_i = 0_E$. Finalement, pour tout $i \in \llbracket 1; p \rrbracket$, $u_i = 0_E$. La somme $\sum_{i=1}^p E_{\lambda_i}(\varphi)$ est directe. ■

COROLLAIRE

en dimension finie

Si on suppose de plus que E est de dimension finie, alors

$$\sum_{i=1}^p \dim(E_{\lambda_i}(\varphi)) \leq \dim(E).$$

Preuve. On sait que

$$\sum_{i=1}^p E_{\lambda_i}(\varphi) \subset E \quad \text{puis} \quad \dim \left(\sum_{i=1}^p E_{\lambda_i}(\varphi) \right) \leq \dim E.$$

Or la somme des sous-espaces propres est directe,

$$\sum_{i=1}^p \dim(E_{\lambda_i}(\varphi)) = \dim \left(\sum_{i=1}^p E_{\lambda_i}(\varphi) \right).$$

Le résultat s'en déduit. ■

COROLLAIRE

famille libre de vecteurs propres

Soit φ un endomorphisme de E .

Si les vecteurs $u_1, u_2, \dots, u_p$ sont des vecteurs propres de φ associés à des valeurs propres distinctes,
alors la famille $(u_1, \dots, u_p)$ est une famille libre de E .

Preuve. Soient $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_p \in \mathbb{R}$ tels que

$$\mu_1 u_1 + \mu_2 u_2 + \dots + \mu_p u_p = 0_E.$$

Pour tout $i \in \llbracket 1; p \rrbracket$, $\mu_i u_i \in E_{\lambda_i}(\varphi)$. Comme la somme $\sum_{i=1}^p E_{\lambda_i}(\varphi)$ est directe, par définition,

$$\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \quad \mu_i u_i = 0_E.$$

Or, pour tout $i \in \llbracket 1; p \rrbracket$, u_i est un vecteur propre. Il est donc non nul et $\mu_i = 0$. Finalement, la famille $(u_1, u_2, \dots, u_p)$ est libre. ■

COROLLAIRE

majoration du nombre de valeurs propres

Soit φ un endomorphisme de E de dimension finie. Alors le nombre de valeurs propres de φ est inférieur ou égal à la dimension de l'espace :

$$\text{Card}(\text{Sp}(\varphi)) \leq \dim(E).$$

Preuve. Si λ est valeur propre de φ , $\dim(E_{\lambda}(\varphi)) \geq 1$. On a donc la minoration

$$\sum_{\lambda \in \text{Sp}(\varphi)} \dim(E_{\lambda}(\varphi)) \geq \sum_{\lambda \in \text{Sp}(\varphi)} 1 = \text{Card}(\text{Sp}(\varphi)).$$

D'où le résultat d'après le corollaire précédent en dimension finie. ■

Remarque. Matriciellement, si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$,

$$\text{Card}(\text{Sp}(A)) \leq n.$$

On a vu, au début du cours, que 0, 1 et -2 sont trois valeurs propres de la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$$

On peut donc en déduire qu'il n'y a pas d'autres valeurs propres. D'où l'égalité $\text{Sp}(A) = \{-2; 0; 1\}$.

6**Recherche de valeurs propres et vecteurs propres**

Cette section détaille les différentes méthodes pour calculer les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice. Elles sont essentiellement basées sur la méthode du pivot de Gauss.

6.1 Recherche des valeurs propres

Rappelons que :

- Le réel λ est valeur propre de A si et seulement si $\text{rg}(A - \lambda I_n) < n$.
- Le rang est invariant par transposition et opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes.

Exemple. On pose $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$.

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Procédons par opérations élémentaires pour se ramener à un système triangulaire.

$$\begin{aligned}
 \text{rg}(A - \lambda I_3) &= \text{rg} \begin{bmatrix} -\lambda & 2 & -1 \\ 3 & -2-\lambda & 0 \\ -2 & 2 & 1-\lambda \end{bmatrix} && L_3 \leftrightarrow L_1 \\
 &= \text{rg} \begin{bmatrix} -2 & 2 & 1-\lambda \\ 3 & -2-\lambda & 0 \\ -\lambda & 2 & -1 \end{bmatrix} && \begin{aligned} L_3 &\leftarrow 2L_3 - \lambda L_1 \\ L_2 &\leftarrow 2L_2 + 3L_1 \end{aligned} \\
 &= \text{rg} \begin{bmatrix} -2 & 2 & 1-\lambda \\ 0 & 2-2\lambda & 3-3\lambda \\ 0 & 4-2\lambda & \lambda^2 - \lambda - 2 \end{bmatrix} && \begin{aligned} C_2 &\leftarrow C_2/2 \\ &(\text{et factorisation}) \end{aligned} \\
 &= \text{rg} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1-\lambda \\ 0 & 1-\lambda & 3-3\lambda \\ 0 & 2-\lambda & (\lambda+1)(\lambda-2) \end{bmatrix} && L_2 \leftrightarrow L_3 \\
 &= \text{rg} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1-\lambda \\ 0 & 2-\lambda & (\lambda+1)(\lambda-2) \\ 0 & 1-\lambda & 3(1-\lambda) \end{bmatrix} && C_2 \leftarrow 3C_2 - C_3 \\
 \text{rg}(A - \lambda I_3) &= \text{rg} \begin{bmatrix} -2 & * & * \\ 0 & (2-\lambda)(\lambda+4) & * \\ 0 & 0 & 3(1-\lambda) \end{bmatrix} && \begin{aligned} &\text{Il est inutile de calculer} \\ &\text{les coefficients } *. \end{aligned}
 \end{aligned}$$

Ainsi λ est valeur propre si et seulement si $\text{rg}(A - \lambda I_3) < 3$. C'est équivalent à

$$(2 - \lambda)(\lambda + 4) = 0 \quad \text{ou} \quad 3(1 - \lambda) = 0.$$

Finalement

$$\text{Sp}(A) = \{-4; 1; 2\}.$$

Remarques.

- Notez bien l'échange $L_3 \leftrightarrow L_1$ au début du pivot de Gauss. C'est particulièrement utile pour avoir un pivot qui ne dépend pas de λ .
- Si on dispose d'un polynôme annulateur de petit degré, on peut se limiter à regarder le rang sur les quelques racines du polynôme pour déterminer les valeurs propres.

6.2 Recherche des vecteurs propres

Expliquons maintenant comment calculer les vecteurs propres de la matrice A connaissant les valeurs propres.

- Soit $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$. Raisonnons par équivalences.

$$\begin{aligned}
 X \in E_1(A) &\iff \\
 AX = X &\iff \begin{cases} 2y - z = x \\ 3x - 2y = y \\ -2x + 2y + z = z \end{cases} \iff \begin{cases} -x + 2y - z = 0 \\ 3x - 3y = 0 \\ -2x + 2y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = x \\ z = x \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} -x + 2y - z = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = x \\ z = x \end{cases} \\
 &\iff X = \begin{bmatrix} x \\ x \\ x \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \iff X \in \text{Vect} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right).
 \end{aligned}$$

Finalement

$$E_1(A) = \text{Vect} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right).$$

Déterminons les autres sous-espaces propres.

- Soit $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$.

$$AX = 2X \iff \begin{cases} -2x + 2y - z = 0 \\ 3x - 4y = 0 \\ -2x + 2y - z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 3x = 4y \\ z = 2(y - x) \end{cases} \iff X = \begin{bmatrix} x \\ 3x/4 \\ -x/2 \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 3/4 \\ -1/2 \end{bmatrix}.$$

Donc

$$E_2(A) = \text{Vect} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 3/4 \\ -1/2 \end{bmatrix} \right) = \text{Vect} \left(\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} \right).$$

- Soit $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$.

$$AX = -4X \iff \begin{cases} 4x + 2y - z = 0 \\ 3x + 2y = 0 \\ -2x + 2y + 5z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 3x + 2y = 0 \\ x = z. \end{cases}$$

On trouve

$$E_{-4}(A) = \text{Vect} \left(\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix} \right).$$

Exercice 15



- ♦ Soient $A = \begin{bmatrix} 7 & 3 & -9 \\ -2 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & -4 \end{bmatrix}$ et $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$. On admet que $P(A) = 0_3$.

p. 27

1. Donner les racines de P . Que peut-on en déduire sur les valeurs propres de A ?
2. Déterminer les valeurs propres de A et, pour chaque valeur propre, déterminer une base du sous-espace propre associé.

#VP15

» Pour un autre exemple de calcul, voir exercice 30, p. 18.

6.3 Cas particulier de la dimension 2

PROPOSITION

lien avec le déterminant

Soient $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a :

$$\lambda \in \text{Sp}(A) \iff \det(A - \lambda I_2) = 0.$$

Preuve. Raisonnons par équivalence

$$\begin{aligned} \lambda \in \text{Sp}(A) &\iff A - \lambda I_2 \text{ n'est pas inversible} \\ &\iff \det(A - \lambda I_2) = 0. \end{aligned}$$

Exercice 16



- ♦ Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, on pose $R_\alpha = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{bmatrix}$.

1. Donner, en fonction de $\alpha \in \mathbb{R}$, le nombre de valeurs propres réelles de R_α .
2. Retrouver le résultat précédent sachant que r_α , l'endomorphisme canoniquement associé à R_α , est une rotation de centre l'origine et d'angle α .

p. 28

#VP16



Exercices



Exercice 17. ♦♦ ♪ Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $d_1, \dots, d_n$, des réels deux à deux distincts. Posons $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$. Montrer que la famille $(D^k)_{k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket}$ est une base de l'espace vectoriel $\mathcal{D}_n$ des matrices diagonales. #VP17

>> Solution p. 28

Exercice 18. ♦♦ Soit $\varphi \in \mathcal{L}(E)$ dont un polynôme annulateur a pour expression $P(x) = x^2 + x - 2$. #VP18

- Justifier que φ est un isomorphisme et exprimer φ^{-1} en fonction de φ et id_E .
- ♣ Démontrer l'existence de deux suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad \varphi^n = a_n \varphi + b_n \text{id}_E$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. Énoncer la division euclidienne du polynôme x^n par $x^2 + x - 2$. Retrouver le résultat de la question précédente.

>> Solution p. 28

Exercice 19. ♦ Posons $\varphi : (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mapsto (y + z, x + z, x + y) \in \mathbb{R}^3$. #VP19

- Écrire la matrice B de φ dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
- Montrer que le polynôme défini par $P(x) = x^2 - x - 2$ annule B .
 - En déduire que la matrice B est inversible et calculer B^{-1} .
- Justifier la bijectivité de φ et expliciter l'application φ^{-1} à l'aide de B .

>> Solution p. 29

Exercice 20. ♦♦♦ Vecteur cyclique et polynôme annulateur #VP20

Soient E un espace vectoriel de dimension finie n et φ un endomorphisme de E .

On dit qu'un vecteur $u \in E$ est cyclique pour φ s'il existe $\ell \in \mathbb{N}^*$ tel que la famille $\mathcal{B}_{u,\ell} = (u, \varphi(u), \dots, \varphi^{\ell-1}(u))$ soit génératrice de E .

- ♣ Soit u , un vecteur cyclique pour φ . Montrer que $\mathcal{B}_{u,n}$ est une base de E .
- Justifier qu'il existe n réels notés $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ tels que $\varphi^n(u) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \varphi^i(u)$.
- Justifier que le polynôme d'expression $P(x) = x^n - \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i$ est annulateur de φ .

>> Solution p. 29

Exercice 21. ♦ ♣ Soient φ, ψ deux endomorphismes nilpotents de E . #VP21

Montrer que si φ, ψ commutent, alors la somme $\varphi + \psi$ est nilpotente.

Un endomorphisme φ est dit nilpotent s'il existe un entier p tel que $\varphi^p = 0_{\mathcal{L}(E)}$ (composée p -ième).

>> Solution p. 30

Exercice 22. ♦♦ Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel E , admettant un polynôme annulateur de degré m . On note #VP22

$$G = \text{Vect}((f^i)_{i \in \llbracket 0, m-1 \rrbracket}).$$

- Vérifier que pour tout entier $k \geq m$, $f^k \in G$.
- Soient $(g, h) \in G^2$. Montrer que $g \circ h \in G$. En déduire, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $g^k \in G$.
- Montrer que g admet un polynôme annulateur de degré inférieur ou égal à m .

>> Solution p. 30

Exercice 23. ♦♦

d'après EDHEC 2016 #VP23

- Dans cette question, f est un endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ qui vérifie $f \circ (f - \text{id})^2 = 0$, où id est l'endomorphisme identité de $\mathbb{R}^n$.
 - Déterminer $(f - \text{id})^2 + f \circ (2\text{id} - f)$.
 - En déduire que : $\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad x = (f - \text{id})^2(x) + (f \circ (2\text{id} - f))(x)$.
 - Utiliser ce dernier résultat pour établir que $\mathbb{R}^n = \text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(f)$.
- Dans cette question, f est un endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ et P est un polynôme annulateur de f , dont le degré est égal à p (avec $p \geq 2$), et tel que $P(0) = 0$ et $P'(0) \neq 0$.
 - Montrer qu'il existe p réels $a_1, \dots, a_p$ avec $a_1 \neq 0$, tels que $P(x) = a_1 x + \dots + a_p x^p$.
 - En déduire que $\text{Ker}(f) \cap \text{Im}(f) = \{0\}$, puis établir que $\mathbb{R}^n = \text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(f)$.

c) En quoi cette question est-elle une généralisation de la première question?

>> Solution p. 31

Exercice 24. ♦♦♦ Commutant d'un endomorphisme cyclique, matrice compagnon

VP24

Soit φ un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension n . On note $\mathcal{C}(\varphi)$ l'ensemble des endomorphismes de E qui commutent avec φ et $\mathbb{R}(\varphi)$ l'ensemble des polynômes en φ . Dit autrement

$$\mathcal{C}(\varphi) = \{\psi \in \mathcal{L}(E) \mid \psi \circ \varphi = \varphi \circ \psi\} \quad \text{et} \quad \mathbb{R}(\varphi) = \{P(\varphi) \mid P \in \mathbb{R}[x]\}.$$

Enfin, on dit qu'un endomorphisme h de E est cyclique s'il existe un vecteur $u_0 \in E$ tel que la famille $(u_0, h(u_0), \dots, h^{n-1}(u_0))$ soit une base de E .

1. Montrer que $\mathcal{C}(\varphi)$ et $\mathbb{R}(\varphi)$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{L}(E)$, puis que $\mathbb{R}(\varphi) \subset \mathcal{C}(\varphi)$.
2. Montrer que φ est cyclique si et seulement si il existe une base $\mathcal{B}$ de E et des réels $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}$ tels que :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & \cdots & \alpha_0 \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & \alpha_1 \\ 0 & 1 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 1 & \alpha_{n-1} \end{bmatrix}.$$

Pour les questions suivantes, on suppose que l'endomorphisme φ est cyclique, et on fixe un vecteur $u_0 \in E$ tel que la famille $\mathcal{B} = (u_0, \varphi(u_0), \dots, \varphi^{n-1}(u_0))$ soit une base de E .

3. Soit $P(\varphi) = \varphi^n - \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k \varphi^k$. Montrer que $P(\varphi) = 0$.

Indication : remarquer que $P(\varphi)(u_0) = 0$, puis montrer que $P(\varphi)(\varphi^\ell(u_0)) = 0$ pour tout $\ell \in \mathbb{N}$.

4. a) Montrer que la famille $(\text{id}_E, \varphi, \dots, \varphi^{n-1})$ est une base de $\mathbb{R}(\varphi)$.

Indication : utiliser la division euclidienne.

- b) En déduire que $\mathcal{C}(\varphi) = \mathbb{R}(\varphi)$, puis la dimension du commutant $\mathcal{C}(\varphi)$.

Indication : si $f \in \mathcal{C}(\varphi)$, exprimer $f(u_0)$ dans la base $\mathcal{B}$, puis calculer $f(\varphi^i(u_0))$ pour $i \in \mathbb{N}$.

>> Solution p. 31

Exercice 25. Expliquez l'intérêt de la fonction Python suivante.

VP25

>> Solution p. 33

Editeur

```
import numpy as np

def bidule(A,x) : # A est une matrice carrée et x, un réel
    [n,p]=np.shape(A)
    if n!=p :
        print('Non, la matrice n est pas carrée ...')
    elif np.linalg.matrix_rank(A-x*np.eye(n))<n :
        print('Oui !!')
    else :
        print('Non !!')
```

Exercice 26. ♦ Vrai ou faux?

VP26

1. S'il existe une matrice carrée J telle que $A = J^2$ alors $\text{Sp}(A) \subset \mathbb{R}^+$.
2. Soit $\lambda \in \mathbb{R}^+$. Si $\lambda \in \text{Sp}(A^2)$ alors $\sqrt{\lambda} \in \text{Sp}(A)$ ou $-\sqrt{\lambda} \in \text{Sp}(A)$.

✓ ×
✓ ×

>> Solution p. 33

Exercice 27. ♦ Un exemple détaillé : la matrice Attila

VP27

Soient $n \in \mathbb{N} \setminus \{0; 1\}$. Notons $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice dont tous les coefficients valent 1 et $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ la matrice colonne dont tous les coefficients sont égaux à 1.

1. a) Préciser le rang de J . En déduire que 0 est valeur propre dont on précisera la dimension de l'espace propre associé. Préciser une base $\mathcal{C}$ de l'espace propre associé à la valeur propre 0.
b) Calculer JX . Que peut-on en déduire?
2. En déduire que J ne possède que deux valeurs propres.

3. Montrer que J est semblable à une matrice diagonale dont on précisera les coefficients diagonaux.
4. Conclure en donnant tous les polynômes annulateurs de J .

>> Solution p. 33

Exercice 28. ♦ Transformation affine et spectre

VP28

Soient $n \in \mathbb{N} \setminus \{0; 1\}$, $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice dont tous les coefficients valent 1. Pour tous $a, b \in \mathbb{Z}$, on pose

$$M(a, b) = \begin{bmatrix} a & b & \cdots & \cdots & b \\ b & a & \ddots & \cdots & b \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a & b \\ b & b & \cdots & b & a \end{bmatrix}.$$

1. Exprimer $M(a, b)$ à l'aide de I_n et J . En déduire le lien entre le spectre de J et celui de $M(a, b)$.
2. On a vu à l'exercice CA68 qu'il y a exactement 105 matrices non inversibles lorsque $a, b \in [-50; 50]$ et $n = 25$. Retrouver ce résultat sachant que J admet deux valeurs propres 0 et n (voir exercice précédent).

>> Solution p. 34

Exercice 29. ♦ Soit φ l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini dans la base canonique (e_1, e_2, e_3) par

VP29

$$\begin{cases} \varphi(e_1) = 6e_1 - 4e_2 + 4e_3 \\ \varphi(e_2) = e_1 + 2e_2 + 2e_3 \\ \varphi(e_3) = -e_1 + 2e_2 + 2e_3. \end{cases}$$

Déterminer le sous-espace propre de φ associé à la valeur propre 4.

>> Solution p. 34

Exercice 30. ♦

D'après EDHEC 2019 # VP30

On note id l'endomorphisme identité de $\mathbb{R}^3$ et on considère l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

>> Solution p. 34

1. a) Déterminer un polynôme annulateur de A qui soit de degré 2.
b) En déduire les deux valeurs propres possibles λ_1 et λ_2 de A (avec $\lambda_1 < \lambda_2$).
c) En Python, la commande `linalg.matrix_rank(M)` de la bibliothèque `numpy` renvoie le rang de la matrice M . On a saisi

Python a répondu

Editeur

```
import numpy as np
A = np.array([[1, 0, 0], [-2, 3, -2], [-1, 1, 0]])
r1=np.linalg.matrix_rank(A-np.eye(3))
r2=np.linalg.matrix_rank(A-2*np.eye(3))
print('r1=',r1,'r2=',r2)
```

Console

```
>>> # script executed
r1= 1 r2= 2
```

Que peut-on conjecturer quant aux valeurs propres de f et à la dimension des sous-espaces propres associés?

- d) Donner une base de chacun des noyaux $\text{Ker}(f - \lambda_1 \text{id})$ et $\text{Ker}(f - \lambda_2 \text{id})$. En déduire qu'il existe une base $\mathcal{B}$ dans laquelle la matrice de f est diagonale.
2. a) Justifier qu'il existe une base (u_1, v_1, v_2) de $\mathbb{R}^3$, où (u_1, v_1) est une base de $\text{Ker}(f - \lambda_1 \text{id})$ et (v_2) une base de $\text{Ker}(f - \lambda_2 \text{id})$. On choisira ces vecteurs de façon que leurs composantes soient des entiers naturels les plus petites possibles, la dernière composante de u_1 et la première de v_1 étant nulles.
b) On note $x = (a, b, c)$ un vecteur quelconque de $\mathbb{R}^3$. Déterminer, en fonction de a, b et c les coordonnées de x dans la base (u_1, v_1, v_2) .

Exercice 31. ♦ Matrices stochastiques

VP31

Une matrice carrée $P = (p_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ est dite stochastique si elle vérifie les deux conditions :

- i) Pour tout $i \in [1, n]$, $\sum_{j=1}^n p_{ij} = 1$.
- ii) Tous les coefficients de la matrice P sont positifs ou nuls.

1. Traduire la condition i) en termes de vecteur propre.
On pourra poser $X = {}^t(1, \dots, 1)$.
2. Montrer que l'ensemble $\mathcal{E}$ des matrices stochastiques est une partie convexe stable par produit.
Une partie A est convexe si pour tous $a, b \in A$, tout $\lambda \in [0, 1]$, $\lambda a + (1 - \lambda) b \in A$.
Une partie A est stable par produit si pour tous $a, b \in A$, $ab \in A$.
3. Démontrer que les valeurs propres réelles d'une matrice stochastique sont comprises entre -1 et 1 .

>> Pour aller plus loin, on pourra consulter le sujet EM Lyon 2010 ECS, problème I.

>> Solution p. 35

Exercice 32. ♦ Projecteurs et vecteurs propres

D'après Ecricome 2018 #VP32

Soit $a \in \mathbb{R}$. On suppose dans cette partie uniquement que $n = 2$ et que les matrices de u et v dans la base canonique sont respectivement :

$$A = \frac{1}{1+a^2} \begin{bmatrix} 1 & a \\ a & a^2 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad B = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. Vérifier que u et v sont des projecteurs.
2. a) Vérifier que les endomorphismes u, v et $u \circ v$ sont tous de rang inférieur ou égal à 1.
b) Vérifier que le vecteur $x_0 = (1, a)$ est un vecteur propre de $u \circ v$.
c) Déterminer le spectre de $u \circ v$.
3. a) Montrer que les valeurs propres de $u \circ v$ appartiennent à l'intervalle $[0, 1]$.
b) Pour quelle(s) valeur(s) de a , $u \circ v$ est-il un projecteur?

>> Solution p. 36

Exercice 33. ♦ Crochet de Lie et nilpotence

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB - BA = A$.

1. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a $A^k B - BA^k = kA^k$.
2. On considère

$$\varphi_B : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ M & \mapsto MB - BM. \end{cases}$$

Vérifier que φ_B est un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

3. Traduire la question 1 en terme de vecteur propre et valeur propre.
4. En déduire l'existence d'un entier k non nul tel que $A^k = 0_n$.

>> Solution p. 36

Exercice 34. ♦♦ Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note φ l'application définie sur $\mathbb{R}_n[x]$ par $\varphi(P) = (x-1)P'(x)$.

1. Montrer que φ est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[x]$. Préciser sa matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}_n[x]$.
2. En déduire le spectre de φ .
3. Soit P un vecteur propre de φ associé à une valeur propre λ non nulle.
a) Justifier que 1 est une racine de P .
b) En étudiant la multiplicité de 1 en tant que racine de P , exprimer P en fonction de λ .
4. Conclure en donnant tous les espaces propres de φ .

>> Solution p. 37

Exercice 35. ♦♦ Polynôme annulateur minimal

Questions sans préparation HEC 2015 #VP35

Soient E un espace vectoriel réel de dimension finie et f un endomorphisme de E .

1. Établir l'existence d'un polynôme P non nul tel que $P(f) = 0_{\mathcal{L}(E)}$.
2. Soit Q un polynôme tel que $Q(f) = 0_{\mathcal{L}(E)}$ et de degré minimal parmi les polynômes non nuls annulateurs de f .
Montrer que toute racine de Q est valeur propre de f .

>> Solution p. 37

Exercice 36. ♦♦ Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Montrer que λ est valeur propre de AB si et seulement si λ est valeur propre de BA .

>> Solution p. 37

Exercice 37. ♦♦ Soient E un espace vectoriel et φ, ψ deux endomorphismes de E .

1. Montrer que

$$\text{Sp}(\varphi \circ \psi) \cup \{0\} = \text{Sp}(\psi \circ \varphi) \cup \{0\}.$$

#VP37

2. Vérifier que si E est de dimension finie, on a directement l'égalité

$$\text{Sp}(\varphi \circ \psi) = \text{Sp}(\psi \circ \varphi).$$

3. En considérant $\varphi : P \in \mathbb{R}[x] \mapsto P' \in \mathbb{R}[x]$ et $\psi : P \in \mathbb{R}[x] \mapsto \int_0^x P(t) dt$, tester si l'égalité précédente est encore vérifiée en dimension infinie.

>> Solution p. 38

Exercice 38. ♦♦ Exemple d'une matrice de rang 2

d'après ESCP 2001 #VP38

Soient n un entier naturel tel que $n \geq 3$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 1 & \vdots & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

et φ l'endomorphisme associé à A dans la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

- Déterminer une base du noyau de φ et une base de l'image de φ .
- En déduire les valeurs propres et les sous-espaces propres de A .

>> Solution p. 38

Exercice 39. ♦♦♦ Matrice à diagonale dominante, localisation des valeurs propres réelles

#VP39

Une matrice carrée $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ est dite à diagonale dominante si pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$|a_{i,i}| > |a_{i,1}| + \cdots + |a_{i,i-1}| + |a_{i,i+1}| + \cdots + |a_{i,n}|.$$

- Montrer qu'une matrice à diagonale dominante est inversible.

Indication. On pourra s'intéresser au noyau de la matrice.

- Soit $B = (b_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que : $\text{Sp}(B) \subset \bigcup_{i=1}^n [b_{ii} - r_i, b_{ii} + r_i]$ où $r_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |b_{i,j}|$.

- Exemple d'une matrice tridiagonale

Soient $n \in \mathbb{N} \setminus \{0; 1\}$ et A la matrice :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & 1 & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Montrer que si λ est une valeur propre réelle de A , alors il existe $\theta \in [0, \pi]$ tel que $\lambda = 2 \cos(\theta)$.

>> Solution p. 38

Exercice 40. ♦♦♦

D'après les oraux HEC 2018 #VP40

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\varphi_A : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto AM$.

- Démontrer que A et φ_A ont le même spectre.
- Justifier que pour toute valeur propre λ commune, $\dim E_\lambda(\varphi_A) = n \dim E_\lambda(A)$.

>> Solution p. 39

Exercice 41. ♦♦♦ On considère les deux matrices

Question sans préparation, HEC 2018 #VP41

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

- Comparer leurs spectres, leurs traces, leurs rangs, ainsi que les dimensions de leurs sous-espaces propres.
- 🐞 Sont-elles semblables?

Exercice 42. ♦♦ Exemple dans un espace fonctionnel

D'après EMLyon 2014 ECS #VP42

On note E l'espace vectoriel des applications continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, E_1 le sous-espace vectoriel des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$. On note, pour tout élément f de E , $T(f)$ l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie, pour tout $x \in \mathbb{R}$, par

$$T(f)(x) = \frac{1}{2} \int_{x-1}^{x+1} f(t) dt.$$

1. Établir que, pour tout élément f de E , $T(f)$ appartient à E_1 et que, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$(T(f))'(x) = \frac{1}{2}(f(x+1) - f(x-1)).$$

On note $T : E \rightarrow E$ l'application qui, à f , associe $T(f)$.

2. Montrer que T est un endomorphisme de E . Est-il surjectif?
3. Soit $s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $s(t) = \sin(\pi t)$. Calculer $T(s)$. Est-ce que T est injectif?
4. Soit $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, définie par

$$\varphi(t) = \begin{cases} \frac{e^t - e^{-t}}{2t} & \text{si } t \neq 0 \\ 1 & \text{si } t = 0. \end{cases}$$

Pour tout $a \in \mathbb{R}$, on pose de plus $f_a : x \in \mathbb{R} \mapsto e^{ax} \in \mathbb{R}$. Vérifier que pour tout $a \in \mathbb{R}$, $T(f_a) = \varphi(a)f_a$.

5. Justifier que $[1; +\infty[\subset \text{Sp}(T)$. A-t-on égalité?

» Solution p. 40

Exercice 43. ♦♦ Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ est

#VP44

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. Montrer que $f - \text{id}_{\mathbb{R}^3}$ est un projecteur.
2. Quelles sont les valeurs propres de f ?
3. Combien existe-t-il de droites vectorielles de $\mathbb{R}^3$ stables par f ?
4. Combien existe-t-il de plans vectoriels de $\mathbb{R}^3$ stables par f ?

» Solution p. 40

Exercice 44. ♦♦ On considère l'application φ définie sur $\mathbb{R}_n[x]$ par

#VP59

$$\varphi : P \mapsto \varphi(P) \quad \text{avec} \quad \varphi(P)(x) = \int_0^1 tP(x-t) dt.$$

1. Vérifier que φ est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[x]$.
2. Montrer que si $\varphi(P) = \lambda P$ où $\lambda \in \mathbb{R}$ alors $\varphi(P') = \lambda P'$.
3. En déduire les valeurs propres et les sous-espaces propres de φ .

» Solution p. ??

Exercice 45. ♦♦ Matrice Compagnon

#VP60

Soit n un entier supérieur ou égal à 2. On désigne par I_n la matrice unité de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On note id l'application identité de $\mathbb{R}^n$ et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. On considère un n -uplet $(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$ de $\mathbb{R}^n$ et le polynôme :

$$P(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0.$$

La matrice compagnon C du polynôme P de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est définie par

$$C = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & & \vdots & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix}.$$

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé à la matrice C .

1. **a)** Exprimer, pour tout $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, $f(e_i)$ en fonction de e_{i+1} .
b) En déduire : $\forall j \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, $f^j(e_1) = e_{j+1}$ et $f^n(e_1) = -(a_0 e_1 + a_1 e_2 + \dots + a_{n-1} e_n)$.
2. Soit g l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ défini par $g = f^n + a_{n-1}f^{n-1} + \dots + a_1 f + a_0 \text{id}$.
a) Vérifier : $g(e_1) = (0, \dots, 0)$.
b) Montrer que : $\forall i \in \mathbb{N}$, $g \circ f^i = f^i \circ g$.
c) En déduire : $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $g(e_i) = (0, \dots, 0)$.
d) Montrer que le polynôme P est annulateur de l'endomorphisme f . Que dire des valeurs propres de C ?
e) Déterminer une matrice $A \in \mathcal{M}_5(\mathbb{R})$ telle que $A^5 = A^3 + 2A^2 + I_5$.

>> Solution p. ??

Exercice 46. ♦♦ Exemple en dimension infinie

VP61

On note E l'espace vectoriel réel des applications de classe $\mathcal{C}^\infty$ définies sur $]0, +\infty[$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$. On définit l'application φ de E dans E par :

$$\varphi(f) = g \quad \text{où} \quad \forall x \in]0, +\infty[, \quad g(x) = x f'(x).$$

1. Vérifier que φ est un endomorphisme de E .
2. Est-il injectif? Préciser le noyau de φ . Est-il surjectif?
3. Déterminer le spectre de φ .

On pourra étudier $h : x \mapsto x^{-\lambda} f(x)$ où f est une fonction propre associée à la valeur propre λ .

>> Solution p. ??



Indications et solutions



Indication de l'exercice 1

p. 2

1. Que dire de la liberté de la famille si $p > \dim \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$?

Indication de l'exercice 3

p. 3

1. Si $A = Q^{-1}BQ$, montrer que pour $P \in \mathbb{R}[x]$, $P(A) = Q^{-1}P(B)Q$.
 2. Écrire $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$. Isoler I_n dans $P(A) = 0_n$ pour trouver $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $AB = BA = I_n$.

Indication de l'exercice 4

p. 5

Si $A = P^{-1}BP$ alors montrer que $X \in E_\lambda(A)$ si et seulement si $PX \in E_\lambda(B)$.

Indication de l'exercice 5

p. 5

1. Vrai, 2. Faux, 3. Vrai, 4. Faux, 5. Vrai.

Indication de l'exercice 6

p. 5

1. Calculer AX où $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ est la matrice constituée de 1.
 2. Pensez à la transposée.

Indication de l'exercice 7

p. 6

1. Montrer que 2 est la seule valeur propre de φ .
 2. Calculer $\psi(f_\lambda)$ où $f_\lambda : x \in \mathbb{R} \mapsto e^{\lambda x}$.

Indication de l'exercice 8

p. 8

Détaillons les différentes étapes.

- a. Si $u \neq 0_E$, il existe un unique scalaire λ_u tel que $\varphi(u) = \lambda_u u$. Que dire si $u = 0_E$?
 b. Soit (u, v) une famille libre de vecteurs de E . Montrer que $\lambda_u = \lambda_v$ en considérant $u + v$.
 c. Conclure que φ est une homothétie.

Indication de l'exercice 14

p. 12

1. L'application φ est un isomorphisme. Pour le prouver, commencer par montrer que $\text{Ker } \varphi = \{0\}$.

Indication de l'exercice 15

p. 15

1. Vérifier que 1 est une racine évidente. Factoriser ensuite par $(x - 1)$.

Indication de l'exercice 17

p. 16

Soient $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{n-1} \in \mathbb{R}$ tels que

$$\sum_{i=0}^{n-1} \lambda_i D^i = 0_n.$$

Que dire de $P \in \mathbb{R}_{n-1}[x]$ défini par $P(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k x^k$?

Indication de l'exercice 18

p. 16

2. Procéder par récurrence avec les suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} a_0 = 0 \\ b_0 = 1 \end{cases}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} a_{n+1} = b_n - a_n \\ b_{n+1} = 2a_n. \end{cases}$$

Indication de l'exercice 20

p. 16

Prouver par récurrence que la propriété

$$\mathcal{P}(k) : \mathcal{B}_{u,k} \text{ est libre}$$

est vraie pour tout $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$.

Indication de l'exercice 21

p. 16

Justifier qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que

$$\varphi^n = 0_{\mathcal{L}(E)} \quad \text{et} \quad \psi^n = 0_{\mathcal{L}(E)}.$$

Calculer ensuite $(\varphi + \psi)^{2n}$.

Indication de l'exercice 28

p. 18

1. Exprimer $M(a, b)$ avec a, b, J et I_n . En déduire que

$$\lambda \in \text{Sp}(J) \iff b\lambda + (a - b) \in \text{Sp}(M(a, b)).$$

Indication de l'exercice 31

p. 18

1. Calculer PX .

Indication de l'exercice 33

p. 19

1. Procéder par récurrence sur la propriété

$$\mathcal{P}(k) : A^k B - B A^k = k A^{k-1} B.$$

4. En dimension finie, tout endomorphisme a un nombre fini de valeurs propres.

Indication de l'exercice 34

p. 19

2. La matrice de φ dans la base canonique est triangulaire. Le spectre se lit sur la diagonale.

3.a) Évaluer en 1 la relation $\varphi(P) = \lambda P$.

3.b) Chercher P sous la forme $P(x) = (x - 1)^m Q(x)$.

Indication de l'exercice 35

p. 19

1. Étudier la liberté de la famille $(\text{id}_E, \varphi, \dots, \varphi^p)$ pour un entier p bien choisi.