

FEUILLE D'EXERCICES N°16:
SUITES USUELLES



RESUME DES EPISODES PRECEDENTS

- ① Rappeler les formules de calculs des puissances (avec des a et des e) et des racines carrées, des logarithmique népérien
- ② Rappeler la résolution de $x^2 = a$ suivant les valeurs de a
- ③ Axes ou tableaux de signes des polynômes de degrés 1 et 2, de $\ln(x)$ et e^x
- ④ Rappeler la définition de la parité et ses conséquences graphiques
- ⑤ Rappeler le formulaire des dérivées et l'équation de la tangente
- ⑥ Rappeler comment on étudie la convexité.
- ⑦ Rappeler le théorème de la bijection
- ⑧ Comment étudier le sens de variation d'une suite

Exercice 1 :

- 1- (u_n) est une suite arithmétique de raison 5, telle que $u_{11} = -10$. Calculer u_{12} puis u_{10}
- 2- (u_n) est une suite arithmétique telle que $u_9 = 5$ et $u_{10} = 18$. Quelle est sa raison ?
- 3- (u_n) est une suite arithmétique de raison 7 et de terme initial $u_0 = -4$. Calculer u_4 puis u_{19}

Exercice 2 :

- 1- On considère la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie pour tout entier naturel n par $u_n = 3n$
 - a) Calculer u_0, u_1, u_2
 - b) Écrire un script `Python` qui demande la valeur de n et qui renvoie la valeur de u_n .
 - c) Démontrer que $(u_n)_{n \geq 0}$ est une suite arithmétique dont on précisera le premier terme et la raison.
 - d) Exprimer u_n en fonction de n
 - e) Déterminer la limite de (u_n)
 - f) Étudier les variations de (u_n)
- 2- On considère la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ définie pour tout entier naturel n par $u_n = \frac{n}{2}$
 - a) Calculer u_1, u_2, u_3
 - b) Écrire un script `Python` qui demande la valeur de n et qui renvoie la valeur de u_n .
 - c) Démontrer que $(u_n)_{n \geq 1}$ est une suite arithmétique dont on précisera le premier terme et la raison.
 - d) Exprimer u_n en fonction de n et déterminer la limite de (u_n)
 - e) Étudier les variations de (u_n)
 - f) Calculer $S = \sum_{k=1}^5 u_k$ puis $T_n = \sum_{k=0}^n u_k$ puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n$
 - g) Écrire un script `Python` qui demande la valeur de n et qui renvoie la valeur de T_n

- 3- On considère la suite $(u_n)_{n \geq 2}$ définie pour tout entier naturel n par $u_n = 2n + 5$
- Démontrer que $(u_n)_{n \geq 2}$ est une suite arithmétique dont on précisera le premier terme et la raison.
 - Écrire un script Python qui demande la valeur de n et qui renvoie la valeur de u_n .
 - Exprimer u_n en fonction de n . La suite (u_n) est-elle convergente?
 - Étudier les variations de (u_n)
 - Calculer $S_n = \sum_{k=2}^n u_k$ puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$
 - Écrire un script Python qui demande la valeur de n et qui renvoie la valeur de S_n
- 4- Soit (u_n) est la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $r = 2$
- Exprimer u_n en fonction de n
 - Écrire un script Python qui demande la valeur de n et qui renvoie la valeur de u_n .
 - Calculer $u_0 + u_1 + \dots + u_{10}$
 - Calculer $u_2 + u_1 + \dots + u_n$
 - Calculer $S_n = \sum_{k=5}^n u_k$ puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$
 - Écrire un script Python qui demande la valeur de n et qui renvoie la valeur de S_n

Exercice 3 :

- (v_n) est une suite géométrique de raison 5, telle que $v_8 = 10$. Calculer v_9 et v_7
- (v_n) est une suite géométrique telle que $v_{10} = 3$ et $v_{11} = 12$. Quelle est sa raison ?
- (v_n) est une suite géométrique de raison 2 et de terme initiale $v_1 = 0,05$. Calculer v_5 et v_{17}

Exercice 4 :

- On considère la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie pour tout entier naturel n par $u_n = 3 \times 2^n$
 - Calculer u_0, u_1, u_2
 - Écrire un script Python qui demande la valeur de n et qui renvoie la valeur de u_n
 - Démontrer que $(u_n)_{n \geq 0}$ est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison.
 - Exprimer u_n en fonction de n et déterminer la limite de (u_n)
 - Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n \geq 10^9$
- On considère la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ définie pour tout entier naturel n par $u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$
 - Calculer u_1, u_2, u_3
 - Écrire un script Python qui demande la valeur de n et qui renvoie la valeur de u_n
 - Démontrer que $(u_n)_{n \geq 1}$ est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison.
 - Exprimer u_n en fonction de n et déterminer la limite de (u_n)
 - Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n \leq \frac{1}{1024}$
 - Calculer $S = \sum_{k=1}^5 u_k$ puis $T_n = \sum_{k=0}^n u_k$ puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n$

g) Écrire un script Python qui demande la valeur de n et qui renvoie la valeur de T_n

3- On considère la suite $(u_n)_{n \geq 2}$ définie pour tout entier naturel n par $u_n = 5 \times (-1)^n$

- Démontrer que $(u_n)_{n \geq 2}$ est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison.
- Exprimer u_n en fonction de n
- La suite $(u_n)_{n \geq 2}$ est-elle convergente ?
- Calculer $S_n = \sum_{k=2}^n u_k$ puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$
- Écrire un script Python qui demande la valeur de n et qui renvoie la valeur de S_n

4- Soit (u_n) est la suite géométrique de premier terme $u_0 = -3$ et de raison $q = 2$.

- Exprimer u_n en fonction de n et déterminer la limite de (u_n)
- Écrire un script Python qui demande la valeur de n et qui renvoie la valeur de u_n
- Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n \leq -10^{-5}$
- Calculer $u_0 + u_1 + \dots + u_{10}$
- Calculer $S_n = u_1 + \dots + u_n$ puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

Exercice 5 :

Dans chaque cas, déterminer si la suite (u_n) dont on donne le terme général est arithmétique, géométrique ou ni l'une ni l'autre.

- $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2n$
- $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n$
- $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = n^2$
- $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 3n - 7$
- $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{1}{n}$
- $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{2}{3^n}$
- $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n + 1$

Exercice 6 :

Calculer les sommes suivantes

$$A = \sum_{k=1}^n 1$$

$$B = \sum_{k=1}^n n$$

$$C = \sum_{k=1}^n k$$

$$D = \sum_{k=1}^n (2k - 1)$$

$$E = \sum_{k=2}^{n+1} 7^k$$

$$F = \sum_{k=0}^n 2^{3-k}$$

Exercice 7 :

Soit (u_n) la suite définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 3u_n + 2 \end{cases}$$

- 1- Calculer les 4 premiers termes de la suite
- 2- Écrire un script Python qui demande la valeur de n et qui renvoie la valeur de u_n

Soit (v_n) la suite définie par : pour tout entier n , $v_n = u_n + 1$.

- 3- Écrire un script Python qui demande la valeur de n et qui renvoie la valeur de v_n
- 4- Démontrer que (v_n) est une suite géométrique
- 5- Exprimer v_n puis u_n en fonction de n
- 6- Déterminer la limite de (v_n) et de (u_n)

Exercice 8 :

Soit la suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par son premier terme $u_0 = 2$ et la relation de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, 3u_{n+1} = 2u_n + 1$$

- 1- Écrire un script Python qui demande la valeur de n et qui renvoie la valeur de u_n
- 2- On définit la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par : $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_n - 1$

Montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

- 3- Exprimer v_n puis u_n en fonction de n
- 4- La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est-elle convergente ?
- 5- Soit $S_n = \sum_{k=0}^n v_k$ et $S'_n = \sum_{k=0}^n u_k$. Déterminer S_n et S'_n
- 6- Écrire un programme Python qui demande n à l'utilisateur et qui affiche S et S' de 2 manières

Exercice 9 :

Considérons la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + \frac{1}{3}n + 1$

On désigne par (v_n) la suite définie par $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_n - n$.

- 1- Écrire un script Python qui demande la valeur de n et qui renvoie la valeur de u_n
- 2- Démontrer que la suite (v_n) est une suite géométrique convergente.
- 3- Déterminer le plus petit entier n tel que $v_n \leq 10^{-5}$
- 4- Étudier le sens de variation de (v_n)
- 5- En déduire le terme général de (u_n)
- 6- Écrire un programme Python qui demande n à l'utilisateur et qui affiche $S = \sum_{k=0}^n u_k$

Exercice 10 :

Dans chacun des cas donner la nature de la suite puis exprimer u_n en fonction de n

1-
$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = -2u_n + 3 \end{cases}$$

3-
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, 2u_n = 3u_{n-1} + 1 \end{cases}$$

2-
$$\begin{cases} u_1 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n - 1 \end{cases}$$