

Réduction des matrices carrées

Exercice 1 On considère les matrices A , B , C et D définies ainsi :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} ; \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 6 & 3 & -2 \end{pmatrix} ; \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} ; \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

- Déterminer l'inversibilité éventuelle de chacune de ces matrices.
On pourra utiliser le déterminant
- Déterminer les valeurs propres réelles de chacune de ces matrices.
- Pour chaque valeur propre réelle λ de chacune de ces matrices, déterminer l'espace propre E_λ associé.

Exercice 2 Déterminer les valeurs propres de la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$ et expliciter les sous-espaces propres associés.

Exercice 3 On rappelle que la matrice Attila d'ordre $n \in \mathbb{N}^*$ est la matrice $H_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont des uns. Retrouver la relation liant H_n^k avec H_n (pour $k \in \mathbb{N}^*$) et en déduire les valeurs propres de H_n . Quel est le rang de H_n ?

Exercice 4 (*D'après EML 2014 voie E*)

Soit $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} ; (a; b; c) \in \mathbb{R}^3 \right\}$.

- Démontrer que F est un sous-espace vectoriel de E et en donner une base.
- On note $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et on définit f sur F par $f(N) = TNT$. Justifier que f est un automorphisme de F .
- La famille $\mathcal{B} = (E_{1 \ 1} ; E_{1 \ 2} ; E_{2 \ 1} ; E_{2 \ 2})$ désigne la base canonique de E .
Démontrer que la sous-famille $\mathcal{A} = (E_{1 \ 1} ; E_{1 \ 2} ; E_{2 \ 2})$ est une base de F .
- Déterminer $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}(f)$, la matrice de f relativement à la base $\mathcal{A}$.
- Etablir que, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, l'ensemble $S_\lambda = \{M \in F ; f(M) = \lambda M\}$ est un sous-espace vectoriel de F .
- Déterminer les $\lambda \in \mathbb{R}$ pour lesquels S_λ est de dimension non nulle. Que reconnait-on ?

Exercice 5 Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Déterminer le polynôme caractéristique de A et en déduire A^{-1} .

Exercice 6 Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. Trouver les valeurs propres de A et déterminer les espaces propres correspondants.

Exercice 7 Dans le cas général d'une matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, expliciter le polynôme caractéristique $P_A(X)$.

Exercice 8 On donne la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 2 & 5 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer les valeurs propres de A .
2. Pour chacun des espaces propres, construire une base. On mentionnera la dimension de chaque espace propre.
3. Vérifier que ces espaces sont en somme directe (*i.e.* d'intersection deux à deux réduites à $\{0_{\mathbb{R}^3}\}$).

Exercice 9 On donne les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} ; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} ; \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Indiquer pour chacune si elle est, ou non, diagonalisable.

Exercice 10 (*D'après concours ENS-D2 Paris-Saclay 2016*)

On considère les applications u et v définies par :

$$\begin{aligned} u : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (z_1; z_2; z_3) &\mapsto (2z_1 - z_3; 3z_1 + z_2 + 2z_3) \end{aligned} ; \quad \begin{aligned} v : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (z_1; z_2) &\mapsto (z_1 + z_2; -z_2; 2z_1 - z_2) \end{aligned}$$

1. Vérifier que u est une application linéaire et en donner la matrice H relativement aux bases canoniques.
2. Donner, de même, la matrice K de v relativement aux bases canoniques.
3. Déterminer le noyau de u . L'application u est-elle injective ? Procéder de même avec v .
4. Déterminer l'image de u . L'application u est-elle surjective ? Procéder de même avec v .
5. Calculer le produit HK et établir que $(HK)^2 = \lambda I_2$ où l'on déterminera le réel λ .
6. Démontrer sans calcul que HK est inversible. Quelles en sont les valeurs propres ?
7. Déterminer $(u \circ v)^2$

Exercice D Etudier la diagonalisabilité éventuelle des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} ; \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 6 & 3 & -2 \end{pmatrix} ; \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} ; \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

On pourra reprendre l'étude menée dans l'exercice 1

Exercice Δ Pour chaque matrice diagonalisable de l'exercice D, procéder à la diagonalisation de façon effective (les matrices de passages sont attendues).

En déduire l'expression des puissances n èmes de chaque matrice diagonalisable.

Exercice 11 On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & -4 & 3 \\ 3 & -6 & 5 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer le polynôme caractéristique de A .
2. Démontrer qu'il existe un polynôme annulateur de A de degré 2.
3. Justifier qu'il existe deux suites de réels $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad A^n = a_n A + b_n I_3$$

4. La matrice A est-elle diagonalisable ?

Exercice 12 une Suite Récurrente Linéaire

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, dite récurrente linéaire (d'ordre 3), par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 ; u_1 = -1 ; u_2 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N} \ u_{n+3} = 4u_{n+2} - 5u_{n+1} + 2u_n \end{cases}$$

On posera $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \\ u_{n+2} \end{pmatrix}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

1. Décrire $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ vérifiant, pour tout $n \in \mathbb{N} : X_{n+1} = AX_n$
2. En déduire, par récurrence, que $X_n = A^n X_0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Démontrer que A n'est pas diagonalisable.
4. Décrire une base de chaque espace propre associé à A .

On pourra vérifier que $V = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre de A .

5. Déterminer une matrice P inversible vérifiant $A = PTP^{-1}$ où $T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et expliciter la matrice inverse P^{-1}
6. Exprimer u_n en fonction de $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 13 Suites récurrentes linéaires d'ordre 2

On définit une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, dite récurrente linéaire d'ordre, par :

$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} ; u_1 \in \mathbb{R} \\ \forall n \in \mathbb{N} \ u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n \end{cases}$$

où a et b sont deux réels vérifiant $a^2 + 4b > 0$

On posera $X_n = \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

1. Décrire $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ vérifiant, pour tout $n \in \mathbb{N} : X_{n+1} = AX_n$
2. En déduire, par récurrence, que $X_n = A^n X_0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Démontrer que A est diagonalisable.
4. En déduire qu'il existe une matrice inversible P telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N} \ A^n = PD^nP^{-1}$$

où D est une matrice diagonale à expliciter.

5. Applications :

- (a) Décrire explicitement u_n en fonction de $n \in \mathbb{N}$ lorsque la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie $u_0 = u_1 = 1$ et la relation $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$
- (b) La suite de Fibonacci est définie par $F_0 = F_1 = 1$ et $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ pour $n \in \mathbb{N}$. Déterminer le terme général F_n en fonction de $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 14 Soit A une matrice et Q un polynôme annulateur de A . Démontrer que, si $\lambda \in Sp(A)$ alors λ est racine de Q .

Exercice 15 Soit u un endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ (avec $n \in \mathbb{N}^*$). On suppose que $P(X) = 1 - X^3$ et $Q(X) = X^2 - 2X + 1$ sont des polynômes annulateurs de u .

Déterminer $Sp(u)$ et en déduire l'endomorphisme u .

Exercice 16 On se donne $x \in \mathbb{R}^*$, $n \in \mathbb{N}^*$ et on note H_x la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont des x .
Démontrer que H_x est diagonalisable.

Exercice 17 On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Démontrer que l'on a :

$$\{0_{\mathbb{R}^4}\} \subset \ker(A) \subset \ker(A^2) \subset \ker(A^3) = \mathbb{R}^4$$

On donnera, en particulier, les dimensions de chaque espace de cette chaîne d'inclusions.

2. Démontrer que $\ker(A^2)$ admet pour supplémentaire dans $\mathbb{R}^4$ une droite vectorielle.

On notera w un vecteur directeur de cette droite dans la suite.

3. Etablir la liberté de la famille $(w ; Aw ; A^2w)$ dans $\mathbb{R}^4$.

4. Justifier que $Aw \in \ker(A^2)$ et que $\ker(A^2) = \ker(A) \oplus \text{vect}(Aw)$

5. Montrer que $A^2w \in \ker(A)$ et déterminer v tel que $\ker(A) = \text{vect}(A^2w) \oplus \text{vect}(v)$

6. En déduire que $\mathcal{B} = (w ; Aw ; A^2w ; v)$ est une base de $\mathbb{R}^4$.

7. On note P la matrice de passage de la base canonique à la base $\mathcal{B}$. Déterminer $P^{-1}AP$

Exercice 18 • $\Theta^{\mathbb{C}\#}$ Diagonaliser chacune des matrices suivantes, après avoir justifié de la diagonalisabilité :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} ; \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} ; \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} ;$$

Exercice 19 On se donne l'application u définie par :

$$u : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_2[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}[X] \\ P & \longmapsto & (2X+1)P - (X^2-1)P' \end{array}$$

Démontrer que u est un endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$ puis déterminer si u est diagonalisable. Si tel est le cas, diagonaliser u .

Exercice 20 • $\Theta^{\mathbb{C}\#}$ Démontrer que, si $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ diagonalisable alors pour tout polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ on a $P(f)$ endomorphisme diagonalisable.

Exercice 21 • $\Theta^{\mathbb{C}\#}$ **Diagonalisabilité des projecteurs en dimension finie**

Soit p un projecteur de $E = \mathbb{R}^n$. On rappelle que $p^2 = p \circ p = p$.

1. Etablir que $\text{id}_E - p$ est aussi un projecteur de E .
2. Justifier que $\ker(p) \oplus \text{Im}(p) = E$
3. Soit q un autre projecteur de E tel que $p + q$ soit encore un projecteur de E .
 - (a) Montrer que $pq = qp = 0_E$
 - (b) Etablir que $\text{Im}(p + q) = \text{Im}(p) + \text{Im}(q)$
 - (c) Démontrer que $\ker(p + q) = \ker(p) \cap \ker(q)$
4. Conclure enfin que tout projecteur p de $\mathbb{R}^n$ est diagonalisable.