Définition d'un complexe

Un complexe est un édifice polyatomique constitué d'un atome ou d'un cation central auquel sont liés des molécules ou des ions appelés ligands. Le complexe ML_n est un donneur de ligands L alors que le métal ou l'ion métallique M en est un accepteur.

Équilibres de complexation

- Le ligand, le cation métallique et le complexe sont en équilibre selon l'équation :

de constante d'équilibre en solution aqueuse diluée, telle que à l'équilibre :

$$\beta_n = \frac{[ML_n]}{[M] \cdot [L]^n}$$

β_n est appelée constante globale de formation ou constante de stabilité du complexe.

- Pour la formation du complexe ML_i par la réaction d'équation :

on définit la constante de formation successive K_{fi} et la constante de dissociation successive K_{di} :

$$K_{fi} = \frac{1}{K_{di}} = \frac{[ML_i]}{[ML_{i-1}] \cdot [L]}$$

Domaines de prédominance

- De l'expression de K_{fi} on tire la relation :

$$pL = -\log [L] = \log K_{fi} + \log \left(\frac{[ML_{i-1}]}{[ML_i]} \right) = pK_{di} + \log \left(\frac{[ML_{i-1}]}{[ML_i]} \right)$$

Le diagramme de prédominance des espèces **en fonction de pL** s'en déduit :

- Soit un cation métallique M et un ligand L ne formant, en solution aqueuse, que le complexe ML selon la réaction d'équation :

La constante d'équilibre de cette réaction en solution aqueuse diluée, est telle que :

$$K_f = \frac{1}{K_d} = \frac{[ML]}{[M] \cdot [L]}$$

soit :

$$pM = -\log [M] = \log K_f + \log \left(\frac{[L]}{[ML]} \right) = pK_{di} + \log \left(\frac{[L]}{[ML]} \right)$$

Le diagramme de prédominance des espèces **en fonction de pM** s'en déduit :

Réactions compétitives entre complexes, cations métalliques et ligands

L'utilisation des domaines de prédominance facilite l'étude des réactions compétitives entre complexes, cations métalliques et ligands (*doc. 1 et 2*).

Doc. 1 La réaction $M + M'L = M' + ML$ a une constante d'équilibre $K^0 = K_f / K'_f$ supérieure à 1.

Doc. 2 La réaction $L + ML' = L' + ML$ a une constante d'équilibre $K^0 = K_f / K'_f$ supérieure à 1.

Facteurs influençant la complexation

Un complexe $[ML_p]$ peut être totalement ou partiellement détruit :

- sous l'action d'un autre ligand L' , susceptible de donner avec M un complexe $[ML'_q]$ plus stable que $[ML_p]$;
- sous l'action d'un autre ion central M' susceptible de donner avec L un complexe $[M'L_r]$ plus stable que $[ML_p]$;
- sous l'action d'un acide HA susceptible de protoner le ligand L :

et donc de provoquer la dissociation du complexe $[ML_p]$.

Titrage d'un cation métallique par l'E.D.T.A. Y^{4-}

Dans une solution tampon de pH approprié l'E.D.T.A. Y^{4-} réagit avec le cation M^{n+} (Ca^{2+} , Mg^{2+} , Fe^{3+} , Ni^{2+} , ...) à doser, en présence d'un indicateur coloré, *Ind*.

Cet indicateur forme avec M^{n+} un complexe coloré, soit $[MInd]^{n+}$, qui peut être détruit par Y^{4-} .

Ind et $[MInd]^{n+}$ ayant des teintes différentes, l'équivalence du titrage est repéré par le changement de teinte de la solution.