Fiche 1 | Second degré

I - Rappels

Définition 1 (Fonction du second degré) — Toute fonction f définie sur $\mathbf{R}$ et pouvant s'écrire pour tout réel x :

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (\text{où } a \neq 0)$$

est appelée **fonction polynomiale (ou fonction polynôme) du second degré**, ou simplement, **fonction du second degré**.

Définition 2 — L'expression algébrique

$$ax^2 + bx + c \quad (\text{où } a \neq 0)$$

est appelée **trinôme du second degré**.

Définition 3 — La courbe représentative d'une fonction du second degré est une **parabole**.

II - Formes des trinômes du second degré

1 Forme développée

Définition 4 — L'écriture $f(x) = ax^2 + bx + c$ est la **forme développée** de f .

La forme développée sert à mettre en évidence la forme de la courbe du trinôme (« vers le haut » si $a > 0$, « vers le bas » si $a < 0$), et à avoir les limites du trinôme en plus et moins l'infini.

Exemple 1

$$f(x) = x^2 + 3x$$

$$g(x) = -x^2 - 0,5x + 1,5$$

2 Forme canonique

Théorème 1.1 (forme canonique) — Toute fonction polynôme du second degré définie par

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

et telle que $a \neq 0$ peut s'écrire de façon unique sous la forme :

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta \quad \text{où} \quad \begin{cases} \alpha = -\frac{b}{2a} \\ \beta = f(\alpha) = -\frac{b^2 - 4ac}{4a} \end{cases}$$

Le réel $b^2 - 4ac$ est appelé le **discriminant** du trinôme et est noté Δ .

Exemple 2 (Forme canonique) Je propose deux façons de calculer la forme canonique d'un trinôme, prenons par exemple

$$f(x) = 2x^2 - 4x + 1.$$

Première façon :

On suit le théorème précédent « bêtement » : ici $a = 2$, $b = -4$ et $c = 1$ donc :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = 1.$$

Ainsi : $f(x) = 2(x - 1)^2 + \beta$. Calculons β :
 $f(\alpha) = f(1) = -1$. Donc finalement :

$$f(x) = 2(x - 1)^2 - 1.$$

Deuxième façon :

Cette deuxième méthode demande plus de dextérité en calcul littéral mais est très efficace et permet de comprendre d'où viennent les formules pour α et β .

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x^2 - 4x + 1 \\ &= 2 \left(\underset{\text{début de } (x-1)^2}{x^2 - 2x} + \frac{1}{2} \right) && \text{Factorisation par } a \\ &= 2 \left((x-1)^2 - 1 + \frac{1}{2} \right) && \text{Technique du début de carré} \\ &= 2 \left((x-1)^2 - \frac{1}{2} \right) \\ &= 2(x-1)^2 - 1. \end{aligned}$$

La forme canonique sert à mettre en évidence le **sommet de la courbe du trinôme** ainsi que ses **variations**.

0.1 Interprétation géométrique de la forme canonique

Proposition 1.2 (sommet et axe de symétrie d'une parabole) — Avec les notations de la propriété précédente, la parabole définie par la courbe de la fonction f a pour sommet le point S de coordonnées (α, β) .

De plus, la parabole de sommet $S(\alpha, \beta)$ est **symétrique** par rapport à la droite d'équation $x = \alpha$ (on rappelle que $\alpha = -\frac{b}{2a}$).

☞ **Exemple 3** On considère la fonction définie par

$$f(x) = x^2 + 3x - 1.$$

On calcule :
$$\begin{cases} \alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{3}{2} \\ \beta = f(\alpha) = -\frac{b^2 - 4ac}{4a} = -\frac{13}{4} \end{cases}$$

Ainsi : $f(x) = \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{13}{4}.$

Le sommet S de la parabole a donc pour coordonnées $\left(-\frac{3}{2}, -\frac{13}{4}\right)$ et cette parabole a pour axe de symétrie la droite d'équation $x = -\frac{3}{2}.$

0.2 Sens de variation

Proposition 1.3 (Sens de variation) — Si f est un polynôme du second degré définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$ tel que $a \neq 0$, les variations de f dépendent du signe de a .

Si on pose comme précédemment $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et

$\beta = f(\alpha) = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$, le tableau de variations de f est le suivant :

Cas où $a > 0$

x	$-\infty$	α	$+\infty$
Variations de f

Cas où $a < 0$

x	$-\infty$	α	$+\infty$
Variations de f

☞ **Exemple 4 (Sens de variations de trinômes)** Déterminons le sens de variations de la fonction suivante définie sur $\mathbf{R}$:

$$f(x) = x^2 + 8x + 1.$$

On calcule la forme canonique de f qui est :

$$f(x) = (x + 4)^2 - 15.$$

On obtient donc directement :

x	$-\infty$	-4	$+\infty$
Variations de f			

3 Forme factorisée

Proposition 1.4 (factorisation) — Si f est définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$ alors sa factorisation dépend du signe du discriminant Δ :

- Si $\Delta < 0$ f **ne peut pas** être factorisée comme produit de polynômes du premier degré (dans $\mathbf{R}$).
- Si $\Delta = 0$, alors on a :

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2.$$

- Si $\Delta > 0$, alors en notant x_1 et x_2 les racines de f , on a :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2),$$

où $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$

La forme factorisée sert à mettre en évidence les racines et le signe du trinôme. Elle sert aussi à résoudre les équations du second degré.

☞ **Exemple 5 (Factorisation)** Factorisons (si possible) l'expression ci-dessous :

$$f(x) = x^2 + x + 1.$$

On calcule $\Delta = 1 - 4 = -3$, donc $\Delta < 0$, donc f **ne peut pas être factorisée** dans $\mathbf{R}$.

0.1 Équations du second degré

Définition 5 (Équation du second degré) — Une équation du second degré est une équation équivalente à la forme :

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

où $a \neq 0$.

0.2 Ensemble des solutions

Théorème 1.5 (Ensemble des solutions) — On note S l'ensemble des solutions de l'équation

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad \text{où} \quad a \neq 0.$$

Soit $\Delta = b^2 - 4ac$. L'ensemble des solutions (dans $\mathbf{R}$) est déterminé par le signe du discriminant Δ :

- Si $\Delta < 0$ alors l'équation n'a pas de solution :

$$S = \emptyset.$$

- Si $\Delta = 0$, l'équation a une unique solution :

$$S = \left\{ -\frac{b}{2a} \right\}.$$

- Si $\Delta > 0$, l'équation admet deux solutions distinctes :

$$S = \left\{ \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}; \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \right\}.$$

Définition 6 (racines) — On appelle **racines** de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ les solutions de cette équation. Les solutions de l'équation $f(x) = ax^2 + bx + c = 0$ sont appelées **racines** de f ou **zéros** de f .

☞ **Exemple 6 (Équation du second degré)** Déterminons les solutions de l'équation ci-dessous :

$$2x^2 + 8x - 10 = 0.$$

Ici, le réflexe à avoir est de se demander si calculer Δ en vaut la peine. Aucun des coefficients du trinôme n'est nul donc c'est en général le cas ici :

$$\Delta = 64 + 4 \times 2 \times 10 = 144.$$

$\Delta > 0$ donc on applique le théorème précédent : il y a deux solutions à l'équation $2x^2 + 8x - 10 = 0$ qui sont :

- $x_1 = -2 - 3 = -5$,
- $x_2 = -2 + 3 = 1$.

Remarque 1 Aller voir la dernière partie pour apprendre une façon plus simple de trouver ces racines dans ce cas un peu particulier !

0.3 Signe d'une fonction polynomiale du second degré

Proposition 1.6 (Signe d'un trinôme) — Soit f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$ (où $a \neq 0$) et $\Delta = b^2 - 4ac$.

On note x_1 et x_2 les racines de f si $\Delta > 0$, et x_0 l'unique racine de f si $\Delta = 0$.

Le tableau (figure 1) à la fin de la fiche récapitule les tableaux de signe possibles.

☞ **Exemple 7 (Inéquation du second degré)** Résolvons l'inéquation suivante :

$$2x^2 - x - 1 > 0.$$

On calcule le discriminant Δ :

$$\Delta = 1 + 4 \times 1 \times 2 = 9.$$

$\Delta > 0$ donc on applique la proposition :

- $x_1 = \frac{1}{4} - \frac{3}{4} = -\frac{1}{2}$,
- $x_2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$.

x	$-\infty$	$-1/2$	1	$+\infty$
$2x^2 - x - 1$	+	0	-	0
	+	-	+	+

Il faut maintenant revenir à l'inéquation de départ : les solutions sont donc $]-\infty; -\frac{1}{2}[\cup]1; +\infty[$.

III - Racines, somme, produit

Théorème 1.7 (Racines et coefficients) — On considère l'équation (où $a \neq 0$) :

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

Si cette équation admet deux solutions qu'on note x_1 et x_2 , alors :

$$\bullet \quad x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \qquad \bullet \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

☞ **Exemple 8** Reprenons l'équation que l'on a déjà résolue :

$$2x^2 + 8x - 10 = 0.$$

Si on est attentif, on peut se rendre compte que 1 est solution évidente car :

$$2 + 8 - 10 = 0.$$

Ainsi, si on note x_2 l'autre racine de l'équation, on a

$$1 \times x_2 = \frac{-10}{2} = -5.$$

d'où immédiatement cette deuxième racine !

☞ **Exemple 9** Sachant que l'équation $x^2 + 3x - 10 = 0$ admet 2 comme solution, on peut immédiatement trouver -5 comme autre racine de cette équation.

Théorème 1.8 (Somme et produit) — On considère deux nombres réels x_1 et x_2 et on note s leur somme ($s = x_1 + x_2$) et p leur produit ($p = x_1x_2$). Alors x_1 et x_2 sont les solutions de l'équation :

$$x^2 - sx + p = 0.$$

☞ **Exemple 10** Peut-on déterminer deux nombres dont la somme vaut 7 et le produit vaut 10?... Ce sont les racines de l'équation $x^2 - 7x + 10 = 0$!

Je laisse les résultats suivants indiqués mais ils sortent un peu du cadre de la Première/Terminal G.

Théorème 1.9 (Racine et factorisation, admis) — Soit P une fonction polynomiale à coefficients dans $\mathbf{R}$, c'est-à-dire qu'il existe $a_0, a_1, \dots, a_n$ des réels tels que :

$$\forall x \in \mathbf{R}, \quad P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0.$$

Alors si α est une racine de P alors il existe un polynôme Q tel que

$$\forall x \in \mathbf{R}, \quad P(x) = (x - \alpha)Q(x).$$

☞ **Exemple 11** En remarquant que 2 est racine de $x^3 + 2x^2 - 5x - 6$, trouver toutes les solutions éventuelles de l'équation $x^3 + 2x^2 - 5x - 6 = 0$.

Proposition 1.10 — Pour tout réel x et tout entier n non nul, on a :

$$x^n - 1 = (x - 1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1).$$

De même, pour tous réels a , x et tout entier n non nul, on a :

$$x^n - a^n = (x - a)(x^{n-1} + ax^{n-2} + a^2x^{n-3} \dots + a^{n-2}x + a^{n-1}).$$

	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$																									
$a > 0$	<table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>$-\infty$</td> <td>x_1</td> <td>x_2</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$f(x)$</td> <td>+</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>+</td> </tr> </table>	x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	$f(x)$	+	0	-	0	+	<table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>$-\infty$</td> <td>x_0</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$f(x)$</td> <td>+</td> <td>0</td> <td>+</td> </tr> </table>	x	$-\infty$	x_0	$+\infty$	$f(x)$	+	0	+	<table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>$-\infty$</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$f(x)$</td> <td colspan="2">+</td> </tr> </table>	x	$-\infty$	$+\infty$	$f(x)$	+	
	x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$																							
$f(x)$	+	0	-	0	+																							
x	$-\infty$	x_0	$+\infty$																									
$f(x)$	+	0	+																									
x	$-\infty$	$+\infty$																										
$f(x)$	+																											
$a < 0$	<table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>$-\infty$</td> <td>x_1</td> <td>x_2</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$f(x)$</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>+</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> </table>	x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	$f(x)$	-	0	+	0	-	<table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>$-\infty$</td> <td>x_0</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$f(x)$</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> </table>	x	$-\infty$	x_0	$+\infty$	$f(x)$	-	0	-	<table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>$-\infty$</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$f(x)$</td> <td colspan="2">-</td> </tr> </table>	x	$-\infty$	$+\infty$	$f(x)$	-	
	x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$																							
$f(x)$	-	0	+	0	-																							
x	$-\infty$	x_0	$+\infty$																									
$f(x)$	-	0	-																									
x	$-\infty$	$+\infty$																										
$f(x)$	-																											

FIGURE 1 – Tableau récapitulant le signe d'un trinôme.