Equilibres d'oxydoréduction

A- Réactions d'oxydoréduction

I- Couples redox

Définitions

réducteur : espèce chimique susceptible de libérer des électrons - **donneur d'électrons**
oxydant : espèce chimique susceptible de capter des électrons - **accepteur d'électrons**

A tout oxydant est associé un réducteur, le passage d'une forme à l'autre se fait par transfert d'électrons

{ schéma fonctionnel d'échange de particules -électrons- entre
 accepteur et donneur caractérisant le couple noté **Ox/red**

Exemples (élément fer et élément soufre)

II- Réactions d'oxydoréduction : réaction d'échange d'électrons entre deux couples redox

Les électrons n'existent pas à l'état libre en solution aqueuse

$n_2 \times (1) - n_1 \times (2)$ = équation bilan traduisant le transfert d'électrons du réducteur d'un couple à l'oxydant de l'autre.

Cette équation bilan est caractérisée par sa constante d'équilibre: $K^0(T) = \frac{a(\text{Red}_1)^{n_2} \cdot a(\text{Ox}_2)^{n_1}}{a(\text{Ox}_1)^{n_2} \cdot a(\text{Red}_2)^{n_1}}$
 $a(\text{B})$ = activité de B

Exemple : oxydation du cuivre par le fer(III) (avec [X] en mol.L⁻¹)

IV- Nombre d'oxydation

Le nombre d'oxydation caractérise l'état d'oxydation d'un élément seul ou dans un composé. Il est le reflet de la structure électronique de l'élément dans le composé.

Il est égal au nombre d'électrons, algébriquement "libérés" par l'élément lors du passage de l'état de corps pur simple non ionisé à l'état considéré.

A l'état de corps pur simple le nombre d'oxydation d'un élément est nul. Lorsqu'un élément est oxydé, son nombre d'oxydation augmente, le nombre d'oxydation diminue lorsque l'élément est réduit.

Exemple : élément chlore corps pur simple Cl_2 n.o. = 0
 Cl^- n.o. = -I (1/2 équation électronique (2))
 ClO^- n.o. = +I (1/2 équation électronique (3))

Exercice : Déterminer les n.o. du chlore dans les ions ClO_2^- , ClO_3^- , ClO_4^-

Règles permettant de déterminer, dans la plupart des cas, le nombre d'oxydation d'un élément sans écrire les 1/2 équations électroniques.

règle 1 : • le n.o. d'un élément est égal à 0 dans tout corps pur simple (Fe , H_2 , Cl_2 ...)

• le n.o. d'un élément dans un ion monoatomique est égal à la charge de l'ion :

Na^+ n.o.(Na)=+I ; Fe^{3+} n.o.(Fe)=+III ; Cl^- n.o.(Cl) = -I ...

règle 2 (peu utilisée): Quand 2 éléments sont unis par une liaison covalente, les électrons du doublet sont arbitrairement attribués à l'élément le plus électronégatif. Le nombre d'oxydation de chaque élément est égal au nombre de charge fictif qui lui est alors attribué

règle 2' (sous sa forme la plus couramment utilisée): Comme base de calcul, dans les composés, on prend généralement n.o.(H) = +I et n.o.(O) = -II.

règle 3 : La somme des n.o. des différents éléments dans la molécule d'un corps pur composé ou dans un ion polyatomique sont respectivement égales à 0 ou à la charge de l'ion.

exemples : dans H_2SO_4 : $2 \cdot \text{n.o.}(\text{H}) + \text{n.o.}(\text{S}) + 4 \cdot \text{n.o.}(\text{O}) = 0$ d'où n.o.(S) = +VI
 dans HPO_4^{2-} : $\text{n.o.}(\text{H}) + \text{n.o.}(\text{P}) + 4 \cdot \text{n.o.}(\text{O}) = -2$ d'où n.o.(P) = +V

Remarque :

- Il existe des exceptions à la base de calcul donnée
 Pour l'hydrogène, dans les hydrures (NaH ...) n.o.(H) = -I
 Pour l'oxygène, dans les composés peroxydés (ion O_2^{2-} , H_2O_2 ...) n.o.(O) = -I
- Le nombre d'oxydation d'un élément dans un édifice **peut ne pas être entier**. Cela se rencontre lorsque l'élément apparaît dans l'édifice sous différents degrés d'oxydation et le no fractionnaire trouvé est le no moyen de l'élément dans l'édifice.

Par exemple dans l'ion $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$, les règles (2') et (3)

donnent : $4 \text{no}(\text{S dans } \text{S}_4\text{O}_6^{2-}) - 6(-2) = -2$ et

donc $\text{no}(\text{S dans } \text{S}_4\text{O}_6^{2-}) = +\frac{5}{2}$

La structure de Lewis $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ est donnée ci-contre :

Si on utilise la règle 2 (O étant plus électronégatif que S) on obtient les ions ci-contre. Il apparaît ainsi que deux S sont au degré d'oxydation +V et deux sont au degré d'oxydation 0. On retrouve bien un no moyen de $+5/2$.

Application à l'équilibrage d'une équation bilan d'oxydoréduction :

Dans une demie réaction électronique, le nombre d'électrons (apparaissant du côté oxydant) correspond à la variation du n.o. de l'élément concerné

la demi équation (2) est écrite pour deux atomes de Cl ; d'où le nombre d'électrons.

Vérifiez l'équilibrage des demies équations correspondant aux couple (3), (4) et (5)

Dans une réaction d'oxydoréduction, la somme des variations des n.o. des éléments affectés de leur coefficient stoechiométrique est nulle (vérifier sur les exemples traités ci-dessus)