

I

Arithmétique euclidienne

1. Les anneaux \mathbb{Z} et $\mathbb{K}[X]$ sont tous deux munis d'une *division euclidienne*. L'arithmétique de ces anneaux est l'étude des propriétés qui se déduisent de la division euclidienne. Dans ce qui suit, A désignera aussi bien \mathbb{Z} que $\mathbb{K}[X]$.

1.1 Idéaux

L'idéal de \mathbb{Z} engendré par un entier x_0 sera noté $x_0\mathbb{Z}$ ou $\langle x_0 \rangle$. De même, l'idéal de $\mathbb{K}[X]$ engendré par un polynôme P_0 sera noté $\langle P_0 \rangle$.

1.2 \sphericalangle Éléments normalisés

Un entier $x \in \mathbb{Z}$ est **normalisé** lorsqu'il est positif : $x \in \mathbb{N}$.

Un polynôme non nul $P \in \mathbb{K}[X]$ est **normalisé** lorsque son coefficient dominant est égal à 1.

1.1 PGCD et relation de Bézout

2.1 \sphericalangle Soient a et b , deux éléments de A . Un élément d de A est un **plus grand commun diviseur (pgcd)** de a et b lorsque

$$dA = aA + bA.$$

2.2 Quels que soient a et b dans A , il existe au moins un pgcd $d \in A$ de a et b et si $(a, b) \neq (0, 0)$, alors il existe un, et un seul, pgcd normalisé.

2.3 Pour tout pgcd d de a et b , il existe u et v dans A tels que $au + bv = d$.

2.4 \sphericalangle PGCD normalisé

Soit $(a, b) \neq (0, 0)$, un couple d'éléments de A . Le **pgcd** de a et b est l'**unique élément normalisé** d_0 de A tel que

$$d_0A = aA + bA.$$

Ce pgcd est noté $a \wedge b$.

2.5 Cas particuliers

1. Si a ou b est inversible, alors $a \wedge b = 1$.
2. Si $a = 0$, alors b est un pgcd de a et b .
3. Le pgcd de a et b est nul si, et seulement si, $a = b = 0$.

3. \rightarrow Caractérisation des PGCD

Soient a, b et d , trois éléments de A . Alors d est un pgcd de a et b si, et seulement si,

1. l'élément d divise a et b et
2. tout élément δ qui divise a et b divise également d .

4. Éléments premiers entre eux

Le cas particulier où deux éléments sont *premiers entre eux* n'est en fait pas loin d'être le cas général. \rightarrow [7.3]

4.1 \sphericalangle Deux éléments a et b sont **premiers entre eux** lorsque leur pgcd $a \wedge b$ est égal à 1, c'est-à-dire

$$aA + bA = A.$$

4.2 Soient a et b , deux éléments premiers entre eux. Si $x \mid a$ et si $y \mid b$, alors x et y sont premiers entre eux.

4.3 \rightarrow Deux éléments a et b sont premiers entre eux si, et seulement si, tout diviseur commun à a et à b est inversible.

4.4 Si a divise b et si a et b sont premiers entre eux, alors a est inversible.

4.5 \rightarrow Soient a et b , deux éléments normalisés.

Si d est le pgcd normalisé de a et b , alors il existe deux éléments normalisés α et β tels que $a = d\alpha$ et $b = d\beta$.

Ces deux éléments α et β sont premiers entre eux.

5. Éléments irréductibles

On rappelle que les nombres premiers sont les éléments irréductibles de \mathbb{Z} .

5.1 \rightarrow Deux éléments irréductibles normalisés sont égaux ou premiers entre eux.

5.2 Si a est irréductible et si a ne divise pas b , alors

$$aA \subsetneq aA + bA = A$$

donc a et b sont premiers entre eux. \rightarrow [20.83.6]

5.3 Si a est irréductible mais n'est pas premier à b , alors a divise b .

5.4 Si a est irréductible et divise le produit $b_1 \cdots b_m$, alors a divise l'un des facteurs b_i au moins.

En particulier, si a est irréductible et divise b^m , alors a divise b .

6. PGCD d'une famille finie

6.1 \sphericalangle On appelle **pgcd** d'une famille finie $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ d'éléments de A tout élément $d \in A$ tel que

$$\sum_{i=1}^n a_i A = dA.$$

6.2 Toute une famille finie admet au moins un pgcd et si elle n'est pas la famille nulle, alors elle admet un, et un seul, pgcd normalisé.

6.3 \sphericalangle Les éléments $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont **premiers dans leur ensemble**, ou **globalement premiers entre eux**, lorsqu'ils admettent 1 pour pgcd.

6.4 Si deux des éléments $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont premiers entre eux, alors les $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont premiers dans leur ensemble.

6.5 Des éléments peuvent être premiers dans leur ensemble sans être deux à deux premiers entre eux. \rightarrow [12.2]

7. Théorème de Bézout

Le théorème de Bézout donne une caractérisation efficace des couples d'éléments premiers entre eux.

7.1 \rightarrow Deux éléments a et b sont premiers entre eux si, et seulement si, il existe $(u, v) \in A \times A$ tel que

$$1 = au + bv.$$

7.2 Si $1 = au + bv$, alors u et v sont premiers entre eux.

7.3 \rightarrow L'élément d est un pgcd de a et b si, et seulement si, il existe deux éléments α et β premiers entre eux de A tel que

$$a = d\alpha \quad \text{et} \quad b = d\beta.$$

8. Conséquences du théorème de Bézout

8.1 \rightarrow Si a et b sont premiers entre eux et divisent c , alors le produit ab divise c .

8.2 Soit $(b_i)_{1 \leq i \leq m}$, une famille d'éléments deux à deux premiers entre eux. Si a est divisible par chacun des b_i , alors a est divisible par le produit $b_1 \cdots b_m$.

8.3 \rightarrow Si $a \wedge b = a \wedge c = 1$, alors $a \wedge (bc) = 1$.

8.4 \triangleright Si a et b sont premiers entre eux, alors

$$\forall m, n \in \mathbb{N}, \quad a^m \wedge b^n = 1.$$

8.5 \triangleright S'il existe deux entiers $m \geq 1$ et $n \geq 1$ tels que a^m et b^n soient premiers entre eux, alors a et b sont premiers entre eux.

9. PPCM

9.1 \sphericalangle Soient a et b dans A . Un élément m de A est un **plus petit commun multiple (ppcm)** de a et b lorsque

$$mA = aA \cap bA.$$

9.2 Pour tout ppcm m de a et de b , il existe deux éléments u et v de A , premiers entre eux, tels que

$$m = au = bv.$$

9.3 Soient a et b dans A , non nuls. Le **ppcm (normalisé)** de a et b est l'unique élément normalisé m_0 de A tel que

$$m_0 A = aA \cap bA.$$

Ce ppcm est noté $a \vee b$.

9.4 On appelle **ppcm** d'une famille finie $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ d'éléments de A tout élément $m \in A$ tel que

$$\bigcap_{i=1}^n a_i A = mA.$$

9.5 Pour tout $1 \leq k < n$, un ppcm de $ppcm(a_1, \dots, a_k)$ et de $ppcm(a_{k+1}, \dots, a_n)$ est un ppcm de (a_1, \dots, a_n) .

10. Calcul du ppcm

Soient a et b , deux éléments normalisés.

1. En posant $d = a \wedge b$, on sait qu'il existe deux éléments normalisés α et β premiers entre eux tels que

$$a = d\alpha \quad \text{et} \quad b = d\beta.$$

2. Comme tout multiple commun à a et b est divisible par le produit $d\alpha\beta$,

$$ab = (a \wedge b)(a \vee b).$$

L'algorithme d'Euclide permet ainsi de calculer (indirectement) le ppcm de a et b .

11. Théorème de Gauss

On suppose que a et b sont premiers entre eux.

11.1 Pour tout $c \in A$, il existe $(u, v) \in A \times A$ tel que

$$c = auc + bvc.$$

11.2 → Si a et b sont premiers entre eux et si $a \mid bc$, alors $a \mid c$.

11.3 Si $a \mid b$, alors a est un élément inversible de A .

11.4 Si a^2 divise b^2 , alors a est inversible dans A .

12. Théorème de décomposition des noyaux

Dans l'anneau $A = \mathbb{Z}$ ou dans l'anneau $A = \mathbb{K}[X]$, on considère des éléments x_1, x_2, \dots, x_n deux à deux premiers entre eux.

12.1 On pose

$$x = x_1 x_2 \cdots x_n$$

et

$$\forall 1 \leq k \leq n, \quad y_k = \prod_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq k}} x_i$$

de telle sorte que

$$\forall 1 \leq k \leq n, \quad x = x_k y_k \quad \text{et} \quad x_k \wedge y_k = 1.$$

12.2 → Les éléments y_1, \dots, y_n sont premiers dans leur ensemble : il existe des éléments a_1, a_2, \dots, a_n de A tels que

$$\sum_{k=1}^n a_k y_k = 1.$$

13. Applications dans $\mathbb{K}[X]$

13.1 Si λ et μ sont deux scalaires distincts, alors les polynômes $X - \lambda$ et $X - \mu$ sont premiers entre eux :

$$\frac{1}{\lambda - \mu}(X - \mu) + \frac{-1}{\lambda - \mu}(X - \lambda) = 1.$$

13.2 Si le polynôme P est scindé :

$$P = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)^{m_i}$$

(où les racines λ_i sont deux à deux distinctes et les multiplicités m_i strictement positives), alors les facteurs $(X - \lambda_i)^{m_i}$ sont deux à deux premiers entre eux et le théorème [12.2] peut s'appliquer.

21.2

I.2 Factorisation des polynômes

14. On sait qu'on peut factoriser, de manière unique, tout entier naturel non nul en produit d'entiers premiers et qu'on peut obtenir cette factorisation par la méthode du *crible*.

Une factorisation analogue existe dans $\mathbb{K}[X]$, mais comme l'ensemble des polynômes n'est pas muni d'une relation d'ordre naturelle, le calcul effectif de cette factorisation est un problème difficile.

15. On notera \mathfrak{P} , l'ensemble des polynômes irréductibles unitaires et Ω , l'ensemble des familles presque nulles d'exposants entiers indicées par \mathfrak{P} . On rappelle que la famille d'entiers naturels

$$(\varepsilon_R)_{R \in \mathfrak{P}} \in \mathbb{N}^{\mathfrak{P}}$$

est *presque nulle* lorsque l'ensemble des polynômes $R \in \mathfrak{P}$ tels que $\varepsilon_R \neq 0$ est fini (éventuellement vide).

15.1 Si $(\varepsilon_R)_{R \in \mathfrak{P}} \in \Omega$, alors le produit

$$\prod_{R \in \mathfrak{P}} R^{\varepsilon_R}$$

est un polynôme en tant que produit d'un nombre fini de polynômes différents du monôme 1.

15.2 Soient $R_0 \in \mathfrak{P}$ et $\nu \in \mathbb{N}$. Si R_0^ν divise le polynôme

$$P = \prod_{R \in \mathfrak{P}} R^{\varepsilon_R} = R_0^{\varepsilon_0} \prod_{\substack{R \in \mathfrak{P} \\ R \neq R_0}} R^{\varepsilon_R},$$

où $(\varepsilon_R)_{R \in \mathfrak{P}}$ est une famille presque nulle d'entiers, alors R_0^ν divise $R_0^{\varepsilon_0}$ et $\nu \leq \varepsilon_0$.

15.3 Soient $(\varepsilon_R)_{R \in \mathfrak{P}}$ et $(\nu_R)_{R \in \mathfrak{P}}$, deux familles presque nulles d'entiers. Alors

$$\prod_{R \in \mathfrak{P}} R^{\nu_R} \text{ divise } \prod_{R \in \mathfrak{P}} R^{\varepsilon_R}$$

si, et seulement si, $\nu_R \leq \varepsilon_R$ pour tout $R \in \mathfrak{P}$.

15.4 Si $(\varepsilon_R)_{R \in \mathfrak{P}}$ et $(\nu_R)_{R \in \mathfrak{P}}$ sont deux familles presque nulles d'entiers telles que

$$\prod_{R \in \mathfrak{P}} R^{\varepsilon_R} = \prod_{R \in \mathfrak{P}} R^{\nu_R},$$

alors $\varepsilon_R = \nu_R$ pour tout $R \in \mathfrak{P}$.

16. → Tout polynôme de degré 1 est irréductible.

17. → Théorème de D'Alembert-Gauss (admis)

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.

18. ▷ Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 dont le discriminant est strictement négatif.

19. → Décomposition en produit d'irréductibles

Pour tout polynôme unitaire $P \in \mathbb{K}[X]$, il existe une, et une seule, famille presque nulle d'entiers $(\varepsilon_R)_{R \in \mathfrak{P}}$ telle que

$$P = \prod_{R \in \mathfrak{P}} R^{\varepsilon_R}$$

où \mathfrak{P} est l'ensemble des polynômes irréductibles unitaires de $\mathbb{K}[X]$.

20. Application au pgcd

Soient P_1, \dots, P_n , des polynômes unitaires de $\mathbb{K}[X]$. Le pgcd et le ppcm de ces polynômes sont respectivement égaux à

$$\prod_{R \in \mathfrak{P}} R^{m_R} \quad \text{et} \quad \prod_{R \in \mathfrak{P}} R^{M_R}$$

où

$$m_R = \min\{\varepsilon_R(P_1), \dots, \varepsilon_R(P_n)\},$$

$$M_R = \max\{\varepsilon_R(P_1), \dots, \varepsilon_R(P_n)\}$$

pour tout $R \in \mathfrak{P}$.

Entraînement

21. Questions pour réfléchir

1. Si $(a, b) = (0, 0)$, alors il existe un seul pgcd de a et b .
2. L'égalité $6 = -3 \times 8 + 1 \times 30$ signifie-t-elle que 6 est un pgcd de 8 et de 30?
3. Deux entiers consécutifs sont premiers entre eux.
- 4.a Si n est un entier impair, alors n et 2 sont premiers entre eux.
- 4.b Un entier pair et un entier impair sont-ils nécessairement premiers entre eux?
5. Les entiers 123 456 789 et 123 456 787 sont premiers entre eux.
6. S'il existe $(u, v) \in A \times A$ tel que

$$x = au + bv,$$

alors le pgcd de a et de b divise x .

7. Les égalités $60 = 6 \times 10 = 20 \times 3$ signifient-elles que 60 est un ppcm de 6 et de 20?
8. Soient x et y , deux éléments de \mathbb{Z} ou de $\mathbb{K}[X]$. Si x^2 divise y^2 , alors x divise y . →[11.4]
9. Si P et Q sont deux polynômes tels que $Q^2 = XP^2$, alors $P = Q = 0$.
10. Adapter le théorème de factorisation [19] au cas d'un polynôme qui n'est pas unitaire.

22. Pour tout entier $n \geq 2$, il existe une suite de n entiers consécutifs dont aucun n'est premier.

23. Un élément $x \neq 0$ de A divise $y \in A$ si, et seulement si, le reste de la division euclidienne de y par x est nul.

23.1 L'ensemble des solutions $x \in \mathbb{Z}$ de $x + 1 \mid x + 3$ est égal à $\{-3, -2, 0, 1\}$.

23.2 Un entier $x \in \mathbb{Z}$ est solution de $x + 2 \mid x^2 + 2$ si, et seulement si, $x + 2$ divise 6.

23.3 Le polynôme $X^4 + X^3 + aX^2 + bX + 2$ est divisible par $X^2 + 2$ dans $\mathbb{R}[X]$ si, et seulement si, $(a, b) = (3, 2)$.

23.4 Soit $n \geq 1$. Le polynôme $aX^{n+1} + bX^n + 1$ est divisible par $(X - 1)^2$ dans $\mathbb{R}[X]$ si, et seulement si, $a = n$ et $b = -(n + 1)$. Dans ce cas, le quotient de la division euclidienne est égal à

$$nX^{n-1} + (n - 1)X^{n-2} + \dots + 3X^2 + 2X + 1.$$

23.5 Un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ est divisible par son polynôme dérivé P' si, et seulement si, il existe deux scalaires α, β et un entier $n \geq 1$ tels que $P = \alpha(X - \beta)^n$.

24. Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$, un polynôme de degré 3. Si P admet une racine multiple $\alpha \in \mathbb{C}$, alors α est une racine de $P \wedge P'$ et $\alpha \in \mathbb{Q}$.

25. On pose $u_n = n^2 + (n + 1)^2 + (n + 3)^2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. On a $u_n = n(3n - 2) \pmod{10}$.
2. Les propositions suivantes sont équivalentes :
 - 2.a L'entier u_n est un multiple de 10.
 - 2.b L'un des entiers n ou $3n - 2$ est un multiple de 10.
 - 2.c L'entier n est congru à 0 ou à 4 modulo 10.

26. Soient $(a_i)_{1 \leq i \leq m}$ et $(b_j)_{1 \leq j \leq n}$, deux familles d'entiers. Si

$$\forall 1 \leq i \leq m, \forall 1 \leq j \leq n, \quad a_i \wedge b_j = 1,$$

alors les entiers $a_1 \cdots a_m$ et $b_1 \cdots b_n$ sont premiers entre eux.

27. Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$, un polynôme unitaire. Si a est une racine rationnelle de P , alors a est en fait un entier relatif.

Applications du théorème de Bézout

28. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, un entier composé (c'est-à-dire divisible par un entier $2 \leq q < n$). Alors n ne divise pas $(n - 1)! + 1$.

29. **Équations diophantiennes du premier ordre [5.45]**

1. L'équation $3x - 12y = 10$ n'a pas de solution dans \mathbb{Z}^2 .

2. Le couple $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ est une solution de $7x + 5y = 4$ si, et seulement si,

$$\exists k \in \mathbb{Z}, \quad (x, y) = (2, -2) + (5k, -7k).$$

Cette équation n'a pas de solution dans \mathbb{N}^2 .

3. Soit $n \in \mathbb{N}$.

3.a Le couple $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ est une solution de

$$(1) \quad 3x + 7y = n$$

si, et seulement si,

$$\exists k \in \mathbb{Z}, \quad (x, y) = (-2n + 7k, n - 3k).$$

3.b L'équation (1) admet au moins une solution dans \mathbb{N}^2 pour tout $n \geq 21$.

30. Soient a et b , deux entiers naturels premiers entre eux. Pour tout entier n strictement supérieur à

$$n_0 = ab - a - b,$$

l'équation de Bezout $au + bv = n$ admet au moins une solution $(u, v) \in \mathbb{N}^2$.

31. Exemples d'entiers premiers entre eux

31.1 Soit $n \in \mathbb{N}$.

1. Les entiers n et $n \pm 1$ sont premiers entre eux.
2. Les entiers $2n - 1$ et $2n + 1$ sont premiers entre eux.

31.2 Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

3. Les entiers n et $2n + 1$ sont premiers entre eux.
4. Les entiers $n + 1$ et $2n + 1$ sont premiers entre eux.

31.3 Les entiers $n^2 + n$ et $2n + 1$ sont premiers entre eux, de même que les entiers $3n^2 + 2n$ et $n + 1$. →[8.3]

32. Quels que soient les entiers a, b et n supérieurs à 1,

$$(a \wedge b)^n = a^n \wedge b^n.$$

33. PGCD et racines communes de deux polynômes

33.1 Si deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ sont premiers entre eux, alors ils n'ont aucune racine commune dans \mathbb{K} .

33.2 Si deux polynômes de $\mathbb{C}[X]$ n'ont aucune racine commune, alors ils sont premiers entre eux.

33.3 Si P est scindé à racines simples, alors P et P' sont premiers entre eux.

33.4 Les polynômes $(X^2 + 1)$ et $(X^2 + 1)X$ n'ont aucune racine réelle commune, alors qu'ils sont pas premiers entre eux dans $\mathbb{R}[X]$.

33.5 Soient P et Q , deux polynômes premiers entre eux à coefficients complexes.

1. Les polynômes $A = P + iQ$ et $B = P - iQ$ sont premiers entre eux.
2. Toute racine double de $P^2 + Q^2$ est une racine double de A ou de B et aussi une racine de $(P')^2 + (Q')^2$.

34. On considère des polynômes à coefficients dans un corps $\mathbb{K} \subset \mathbb{C}$.

34.1 Si $P \in \mathbb{K}[X]$ est irréductible, alors P et P' sont premiers entre eux.

34.2 Si $P_0 \in \mathbb{K}[X]$ est un facteur irréductible de $P \wedge P'$, alors P_0^2 est un diviseur de P .

34.3 Si $P \in \mathbb{K}[X]$ est irréductible et si $\alpha \in \mathbb{C}$ est une racine de P , alors α est une racine simple de P .

35. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, un polynôme unitaire, scindé, à racines simples.

35.1 Le polynôme P et son polynôme dérivé P' sont premiers entre eux.

35.2 Si P divise XP' , alors $P = X$.

36. Deux polynômes non nuls A et B de $\mathbb{K}[X]$ sont premiers entre eux si, et seulement si, les polynômes $A + B$ et AB sont premiers entre eux.

37. Soient $I = \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, I_n = \{(p, q) \in I : p \wedge q = n\}.$$

Alors $(I_n)_{n \geq 1}$ est une partition de I et comme l'application

$$[(\alpha, \beta) \mapsto (n\alpha, n\beta)]$$

est une bijection de I_1 sur I_n , alors

$$\sum_{(p,q) \in I} \frac{1}{p^2 q^2} = \left(\sum_{(p,q) \in I_1} \frac{1}{p^2 q^2} \right) \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} \right).$$

38. Soient m et n , deux éléments de $A = \mathbb{Z}$ ou de $A = \mathbb{K}[X]$.

38.1 Il existe une famille d'éléments irréductibles unitaires (p_1, \dots, p_r) et deux familles d'entiers naturels $(\alpha_k)_{1 \leq k \leq r}$ et $(\beta_k)_{1 \leq k \leq r}$ telles que

$$m = \prod_{k=1}^r p_k^{\alpha_k} \quad \text{et que} \quad n = \prod_{k=1}^r p_k^{\beta_k}.$$

Discuter l'unicité de ces factorisations.

38.2 L'élément m^2 divise l'élément n^2 si, et seulement si, l'élément m est un diviseur de n .

38.3 On suppose que m et n sont premiers entre eux.

1. Pour tout $1 \leq k \leq r$, l'un des deux exposants α_k ou β_k est nul.

2. On dit que mn est un **carré parfait** lorsqu'il existe $x \in A$ tel que $mn = x^2$. Dans ce cas, m et n sont des carrés parfaits.

3. Si m et n ne sont pas premiers entre eux, alors le produit mn peut être un carré parfait sans que x ou y soit un carré parfait.

39. Soit $n \geq 2$, un entier naturel. On note N , le nombre de diviseurs de n (compris entre 1 et n inclus) et P , le produit des diviseurs de n .

39.1 Le nombre N est impair si, et seulement si, n est un carré parfait.

39.2 En regroupant deux par deux les diviseurs de n dans le produit P^2 pour former N produits égaux à n , on obtient

$$P^2 = n^N.$$

40. Soit $n \geq 2$, un entier naturel. On note N , le nombre de diviseurs de n (compris entre 1 et n inclus).

40.1 Si la factorisation de n en produit de facteurs premiers est

$$n = \prod_{k=1}^r p_k^{\alpha_k},$$

alors [38]

$$N = \prod_{k=1}^r (\alpha_k + 1).$$

40.2 On suppose ici que n possède 15 diviseurs. Si n est divisible par 6, mais pas par 8, alors $n = 324$.

40.3 Le plus petit entier qui possède exactement 28 diviseurs est égal à 960.

40.4 Retrouver le résultat établi au [39].

41. Fonction de Möbius

On dit qu'un entier n est **sans facteur carré** lorsqu'il peut se factoriser sous la forme

$$n = p_1 \times p_2 \times \dots \times p_r$$

où les p_k sont des nombres premiers deux à deux distincts.

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $\mu(n) = 0$ lorsqu'il existe un nombre premier p tel que p^2 divise n et $\mu(n) = (-1)^r$ lorsque n est le produit de r nombres premiers deux à deux distincts.

41.1 On considère la factorisation d'un entier $n \geq 2$ en produits de facteurs premiers :

$$n = \prod_{k=1}^s p_k^{\alpha_k}$$

où les α_k sont des entiers naturels non nuls.

Alors l'entier n admet 2^s diviseurs sans facteur carré et

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \sum_{r=0}^s \binom{s}{r} (-1)^r = 0.$$

41.2 On définit une partition dénombrable de $I = \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ en posant

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, I_n = \{(p, q) \in I : pq = n\}.$$

On en déduit que

$$\left(\sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{p^2} \right) \left(\sum_{q=1}^{+\infty} \frac{\mu(q)}{q^2} \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{n^2} \right) = 1.$$

42. Soient A et B , deux polynômes à coefficients dans \mathbb{Z} . S'il existe un nombre premier p qui divise tous les coefficients du produit AB , alors p divise tous les coefficients de A ou tous les coefficients de B .

43. Si A et B sont deux polynômes premiers entre eux, alors

$$\forall C \in \mathbb{K}[X], A \wedge (BC) = A \wedge C.$$

II

Structure d'anneau de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

44. *L'arithmétique modulaire* est une initiation, limitée ici à l'anneau des entiers \mathbb{Z} , à la structure d'**anneau quotient**. →[148]

45.1 \nrightarrow Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Un entier $a \in \mathbb{Z}$ est **congru modulo n** à $b \in \mathbb{Z}$ lorsqu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = a + kn$. On note alors :

$$a \equiv b \pmod{n}$$

ou encore $a \equiv b [n]$.

45.2

$$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (b - a) \\ \iff b \equiv a \pmod{n}$$

45.3 Exemples

1. Pour tout entier n ,

$$n(n+1) \equiv 0 \pmod{2} \quad \text{et} \quad (n-1)n(n+1) \equiv 0 \pmod{3}.$$

2. Si $p > 3$ est premier, alors $p^2 \equiv 1 \pmod{24}$.

II.1 Classes de congruence modulo n

46.1 \rightarrow La congruence modulo n est une relation d'équivalence sur \mathbb{Z} .

46.2 \nrightarrow La **classe modulo n** de $a \in \mathbb{Z}$ est l'ensemble des entiers congrus à a modulo n .

$$\mathcal{C}(a) = \{a + kn, k \in \mathbb{Z}\}$$

Elle est aussi notée $a + n\mathbb{Z}$, \bar{a} , à, ou même a (quand aucune ambiguïté n'est possible).

46.3

$$\mathcal{C}(a) = \mathcal{C}(b) \iff b \in \mathcal{C}(a)$$

46.4 Si $\mathcal{C}(a) \cap \mathcal{C}(b) \neq \emptyset$, alors $\mathcal{C}(a) = \mathcal{C}(b)$.

46.5 Si $r \in \mathbb{N}$ est le reste de la division euclidienne de a par n , alors $\mathcal{C}(a) = \mathcal{C}(r)$.

47.1 \Leftrightarrow Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, l'ensemble des classes de congruence modulo n des éléments de \mathbb{Z} .

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\mathcal{C}(a), a \in \mathbb{Z}\}$$

$$\mathbb{Z} = \bigcup_{a \in \mathbb{Z}} \mathcal{C}(a) = \bigsqcup_{C \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} C$$

47.2 L'application \mathcal{C} est une surjection de \mathbb{Z} sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

47.3 \Leftrightarrow Un entier $k \in \mathbb{Z}$ est un **représentant** de la classe $C \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ lorsque $C = \mathcal{C}(k)$.

48. \rightarrow Le cardinal de l'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est égal à n et

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\mathcal{C}(r), 0 \leq r < n\}.$$

49. L'ensemble $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ est constitué d'une part de l'ensemble $\mathcal{C}(0)$ des entiers pairs et de l'ensemble $\mathcal{C}(1)$ des entiers impairs.

II.2 Opérations modulo n

Addition

50.1 Quels que soient $\alpha \in \mathcal{C}(a)$ et $\beta \in \mathcal{C}(b)$,

$$\mathcal{C}(\alpha + \beta) = \mathcal{C}(a + b).$$

50.2 \Leftrightarrow Soient C_1 et C_2 dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: il existe a et b dans \mathbb{Z} tels que $C_1 = \mathcal{C}(a)$ et $C_2 = \mathcal{C}(b)$ et la **somme** de C_1 et de C_2 est définie par

$$C_1 \oplus C_2 = \mathcal{C}(a + b).$$

50.3 \rightarrow L'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ muni de \oplus est un groupe cyclique.

50.4 \rightarrow Tout groupe cyclique d'ordre n est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \oplus)$.

51. Exemples de morphismes de groupes

1. Le seul morphisme de groupes de $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ est le morphisme trivial : $[x \mapsto 0]$.

2. Il existe six morphismes de groupes de $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ dans \mathbb{U}_6 , dont seulement deux sont des isomorphismes.

3. Si f est un automorphisme de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, alors $f(1)$ est un élément d'ordre 4. Les automorphismes de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ sont $[x \mapsto x]$ et $[x \mapsto -x]$.

4. Il existe autant de morphismes de groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ que d'éléments de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ dont l'ordre divise n .

Multiplication modulo n

52.1 Quels que soient $\alpha \in \mathcal{C}(a)$ et $\beta \in \mathcal{C}(b)$,

$$\mathcal{C}(\alpha\beta) = \mathcal{C}(ab).$$

52.2 \Leftrightarrow Soient C_1 et C_2 dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: il existe a et b dans \mathbb{Z} tels que $C_1 = \mathcal{C}(a)$ et $C_2 = \mathcal{C}(b)$ et le **produit** de C_1 et de C_2 est défini par

$$C_1 \otimes C_2 = \mathcal{C}(ab).$$

52.3 \rightarrow L'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ muni de \oplus et de \otimes est un anneau commutatif.

53. Calculs de puissances

53.1

$$\forall a \in \mathbb{Z}, \forall m \in \mathbb{N}^*, \mathcal{C}(a^m) = \mathcal{C}(a)^{\otimes m}.$$

53.2 La suite des puissances de $\mathcal{C}(a)$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est périodique à partir d'un certain rang :

$$\exists 1 \leq p \leq n, \exists 0 \leq n_0 < n, \forall q \geq n_0, [\mathcal{C}(a)]^{q+p} = [\mathcal{C}(a)]^q.$$

53.3 Exemples

1. Le chiffre des unités de $7^{(7^7)}$ est égal à 3 et celui de $(7^7)^7$ est égal à 7.

2. Le chiffre des unités de 1789^{1515} est égal à 9.

3. $5^{2n} + 5^n = 0 \pmod{13} \iff n = 2 \pmod{4}$.

4. L'équation $x^3 = x$ a trois solutions dans $\mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$, mais elle en a 9 dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

5. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$5n^3 + n = 0 \pmod{6}$$

$$3^{2n+1} + 2^{n+2} = 0 \pmod{7}$$

$$2^{2n+1} + 3^{2n+1} = 0 \pmod{5}$$

$$5^4 \cdot 3^{8n} + 7^3 \cdot 5^{6n} = 0 \pmod{11}$$

$$4^n = 3n + 1 \pmod{9}$$

$$16^n = 15n + 1 \pmod{225}$$

Morphisme canonique

54. \Leftrightarrow L'application $\mathcal{C} : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est appelée **réduction modulo n** ou **projection canonique sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$** .

55. \rightarrow La réduction modulo n est un morphisme surjectif de l'anneau $(\mathbb{Z}, +, \times)$ sur l'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \oplus, \otimes)$ et son noyau est $n\mathbb{Z}$.

56. Preuve par 9

Pour tout entier $a \in \mathbb{N}$, on note n_a , la somme des chiffres utilisés pour écrire a en base dix (écriture décimale habituelle) et on suppose ici que \mathcal{C} désigne la réduction modulo 9.

1.

$$\forall a \in \mathbb{N}, \mathcal{C}(a) = \mathcal{C}(n_a).$$

2. Si $c = ab$, alors $\mathcal{C}(n_c) = \mathcal{C}(n_a) \otimes \mathcal{C}(n_b)$.

II.3 Groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$

57. Exemples de tables de multiplication

L'élément 0 est absorbant pour la multiplication dans chaque anneau : il est inutile de le faire apparaître dans la table de multiplication.

Les anneaux considérés sont commutatifs : les tables de multiplication sont symétriques.

Table de $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$					Table de $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$					
\times	1	2	3	4	\times	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	1	1	2	3	4	5
2	2	4	1	3	2	2	4	0	2	4
3	3	1	4	2	3	3	0	3	0	3
4	4	3	2	1	4	4	2	0	4	2
					5	5	4	3	2	1

Les carrés apparaissent sur la diagonale.

Un élément est inversible si, et seulement si, le nombre 1 apparaît dans sa colonne.

Un élément est un diviseur de zéro si, et seulement si, le nombre 0 apparaît dans sa colonne.

58. Éléments inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit $n \in \mathbb{N}$, non nul.

58.1 La classe $\mathcal{C}(n-1)$ est inversible et égale à son inverse.

58.2 \rightarrow La classe $\mathcal{C}(a)$ est inversible pour la structure d'anneau sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si, et seulement si, a et n sont premiers entre eux.

58.3 Si $1 < p < n$ divise n , alors la classe $\mathcal{C}(p)$ est un diviseur de zéro dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

59. \rightarrow L'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \oplus, \otimes)$ est un corps si, et seulement si, l'entier n est un nombre premier.

Si p est premier, le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est traditionnellement noté \mathbb{F}_p .

60. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

60.1 Le groupe additif $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est engendré par $\mathcal{C}_n(1)$.

60.2 \rightarrow L'élément $\mathcal{C}_n(k)$ engendre le groupe additif $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si, et seulement si, il est inversible dans l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

61. Exemples

61.1 Il y a 24 éléments inversibles dans $\mathbb{Z}/78\mathbb{Z}$.

61.2 Dans l'anneau $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, l'élément 3 est inversible et l'équation $3x + 4 = 0$ admet $x = 2$ pour seule solution.

61.3 Dans un anneau de cardinal fini, on peut chercher les racines d'un polynôme en évaluant ce polynôme en chaque point. Dans un corps fini, on peut ainsi obtenir la forme factorisée [19] de ce polynôme. Ainsi, dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$,

$$X^5 - 3X^4 - 2X^3 + 2X^2 + 3X - 1 = (X - 1)(X - 3)^2(X + 2)^2.$$

61.4 Sur le corps \mathbb{F}_5 , le système

$$\begin{cases} 3x + 7y = 3 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

est un système de Cramer et admet $(1, 0)$ pour unique solution. Sur l'anneau $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, son déterminant n'est pas inversible et le système admet $(1, 0)$ et $(3, 2)$ pour solutions.

61.5 Le système

$$\begin{cases} 6x + 7y = 30 \\ 3x - 7y = 0 \end{cases}$$

admet $(28, 12)$ pour seule solution dans $\mathbb{Z}/37\mathbb{Z}$.

62. Petit théorème de Fermat

Le petit théorème de Fermat permet de simplifier le calcul des puissances d'un entier n modulo un nombre premier p . Ce résultat sera généralisé avec le théorème d'Euler [73.3].

62.1 Si p est un nombre premier, alors pour tout $1 \leq k < p$, le coefficient binomial $\binom{p}{k}$ est un multiple de p .

62.2 \rightarrow Soit p , un nombre premier. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$n^p \equiv n \pmod{p}$$

et si n n'est pas un multiple de p , alors

$$n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

62.3 Applications simples

1. $2^{123} + 3^{121} \equiv 0 \pmod{11}$
2. $1234^{4321} + 4321^{1234} \equiv 4 \pmod{7}$

62.4 Résidus quadratiques

Soient $p \geq 3$, un nombre premier impair et $\mathbb{K} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

On pose $q = (p - 1)/2$.

1. Si le degré de $P \in \mathbb{K}[X]$ est égal à $d \in \mathbb{N}$, alors [20.102. 4] le polynôme P admet au plus d racines dans le corps \mathbb{K} .
2. Il y a exactement q carrés non nuls dans \mathbb{K} et chaque carré $x \neq 0$ est une racine de $(X^q - 1)$.
3. Le polynôme $X^{p-1} - 1 = (X^q - 1)(X^q + 1)$ est scindé à racines simples dans \mathbb{K} .
4. Un élément non nul x de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un carré si, et seulement si, $x^q = 1$.

II.4 Lemme chinois

63. Soient m et n , deux entiers premiers entre eux.

63.1 Il existe deux entiers e_1 et e_2 tels que

$$\begin{cases} e_1 \equiv 1 \pmod{m} \\ e_1 \equiv 0 \pmod{n} \end{cases} \quad \text{et que} \quad \begin{cases} e_2 \equiv 0 \pmod{m} \\ e_2 \equiv 1 \pmod{n}. \end{cases}$$

63.2 Si x et x' sont deux entiers tels que

$$\begin{cases} x \equiv x' \pmod{m} \\ x \equiv x' \pmod{n}, \end{cases}$$

alors $x \equiv x' \pmod{mn}$.

63.3 \rightarrow Si m et n sont deux entiers premiers entre eux, alors

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2, \exists x \in \mathbb{Z}, \begin{cases} x \equiv a \pmod{m} \\ x \equiv b \pmod{n}. \end{cases}$$

De plus, si x_0 est une solution particulière de ce système, alors x est une solution de ce système si, et seulement si,

$$x \equiv x_0 \pmod{mn}.$$

64. Un isomorphisme canonique

Soient m et n , deux entiers naturels premiers entre eux.

64.1 L'application

$$\begin{aligned} \Phi : \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ k &\mapsto (\mathcal{C}_m(k), \mathcal{C}_n(k)) \end{aligned}$$

est un morphisme de groupes.

64.2 Il existe un morphisme d'anneaux Ψ de $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tel que \rightarrow [146.3]

$$\forall k \in \mathbb{Z}, \Psi(\mathcal{C}_{mn}(k)) = (\mathcal{C}_m(k), \mathcal{C}_n(k)).$$

64.3 \rightarrow L'application Ψ est un isomorphisme d'anneaux de $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

64.4 Action sur les éléments inversibles [20.71.2]

L'isomorphisme Ψ induit une bijection de l'ensemble $(\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})^\times$ sur le produit cartésien $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. \rightarrow [74.3]

65. Généralisation

65.1 Soient m_1, m_2, \dots, m_n , des entiers naturels deux à deux premiers entre eux.

1. Pour tout $1 \leq i \leq n$, on pose

$$M_i = \prod_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} m_j$$

et [12.2] il existe $u_i \in \mathbb{Z}$ tel que $M_i u_i \equiv 1 \pmod{m_i}$.

2. Quels que soient les entiers a_1, a_2, \dots, a_n , l'entier

$$x = \sum_{i=1}^n a_i M_i u_i \in \mathbb{Z}$$

vérifie $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ pour tout $1 \leq i \leq n$.

2.a Si $y \in \mathbb{Z}$ vérifie $y \equiv a_i \pmod{m_i}$ pour tout $1 \leq i \leq n$, alors la différence $x - y$ est divisible par le produit $m_1 m_2 \dots m_n$.

65.2 Un entier x

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 1 \pmod{6} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

si, et seulement si,

$$\exists k \in \mathbb{Z}, \quad x = 163 + 210k.$$

Entraînement

66. Questions pour réfléchir

1. Si $a \equiv b \pmod{n}$, alors $a^n \equiv b^n \pmod{n^2}$.
2. Soit $n \geq 2$, un entier.
 - 2.a Soit $x \in \mathbb{N}^*$. Il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que n divise x^k si, et seulement si, tout diviseur premier de n est aussi un diviseur premier de x .
 - 2.b Il existe des éléments nilpotents dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si, et seulement si, n est divisible par le carré d'un nombre premier.

67. Soient $\mathbb{K} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, avec p premier. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$\sigma_k = \sum_{x \in \mathbb{K}} x^k.$$

Comme

$$\sigma_k^2 = \sum_{a \in \mathbb{K}^*} \sum_{x \in \mathbb{K}} (ax)^k = (p-1)\sigma_k,$$

alors σ_k est égal à 0 ou à -1 .

68. Applications du lemme chinois [63.3]

Un entier $x \in \mathbb{N}$ est une solution du système

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{6} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

si, et seulement si, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $x = 37 + 42k$.

Un entier $x \in \mathbb{N}$ est une solution du système

$$\begin{cases} 3x \equiv 2 \pmod{5} \\ 5x \equiv 1 \pmod{6} \end{cases}$$

si, et seulement si, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $x = 29 + 30k$.

69. Équations du second degré dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Quel que soit l'anneau A dans lequel on calcule, on résout une équation de la forme

$$ax^2 + bx + c = 0$$

en commençant par l'écrire sous forme réduite :

$$(x - \alpha)^2 = \beta.$$

Il suffit pour cela que a soit inversible dans A puis que ba^{-1} soit factorisable par 2 dans A .

Il reste alors à trouver les éléments $y \in A$ tels que $y^2 = \beta$.

69.1 Dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, l'équation $x^2 = 1$ admet quatre solutions : ± 1 et ± 3 .

69.2 Dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$, l'équation $x^2 + 3x + 4 = 0$ devient sous forme réduite $(x + 5)^2 = 0$. Elle admet 2 pour seule solution.

69.3 Dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$:

L'équation $x^2 + 2x + 2 = 0$ admet deux solutions : 1 et 2.

L'équation $x^2 - 3x = 1$ devient $(x + 1)^2 = 2$ et n'a pas de solution.

69.4 Dans l'anneau $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, l'élément $\mathcal{C}(2)$ est inversible, d'inverse $\mathcal{C}(5)$; l'image de la fonction $[x \mapsto x^2]$ est constituée des éléments $\mathcal{C}(0)$, $\mathcal{C}(1)$, $\mathcal{C}(4)$ et $\mathcal{C}(7)$.

L'équation $x^2 + bx + c = 0$ admet exactement deux solutions dans $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ si, et seulement si, son discriminant $b^2 - 4c$ est égal à 1, 4 ou 7.

69.5 Dans l'anneau $\mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$, les solutions de l'équation

$$x^2 - 4x - 1 = 0$$

sont 6 et 9; les solutions du système

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ xy = 10 \end{cases}$$

sont (6, 9) et (9, 6).

70. Nombres de Carmichael

Un entier $n \geq 2$ est un *nombre de Carmichael* lorsque

$$\forall a \in \mathbb{N}^*, \quad a^n \equiv a \pmod{n}$$

sans être un nombre premier.

→[62]

70.1 Rédiger une procédure en langage Python qui vérifie si un entier n donné est, ou non, un nombre de Carmichael.

70.2 On suppose qu'un nombre de Carmichael n admet un facteur carré : il existe donc deux entiers p et m tels que $n = p^2m$. Avec $a = 1 + pm$, on obtient

$$a^n \equiv 1 \pmod{n} = 1 + pm \pmod{n},$$

ce qui est absurde : les nombres de Carmichael n'admettent pas de facteur carré.

71. Exemples et contre-exemples de groupes cycliques

1.a Les groupes $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \oplus)$ et $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, \oplus)$ sont cycliques.

1.b Le groupe multiplicatif $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times$ est engendré par $\mathcal{C}_7(3)$.

1.c Les groupes $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, \mathbb{U}_6 , $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times$ et $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ sont isomorphes.

2. Le groupe multiplicatif $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$ est cyclique, isomorphe à $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

3. Le groupe $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \oplus)$ n'est pas cyclique.

4. Les éléments du groupe multiplicatif $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$ sont tous d'ordre inférieur à 2. Ce groupe n'est pas cyclique.

5. Le groupe multiplicatif $(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z})^\times$ n'est pas cyclique.

III

Indicatrice d'Euler

72. \Leftarrow L'*indicatrice d'Euler* (ou Euler totient function) est l'application de \mathbb{N}^* dans \mathbb{N} qui, à tout entier $n \geq 1$, associe le nombre $\varphi(n)$ d'entiers $1 \leq k \leq n$ qui sont premiers à n .

73.1 Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'ordre de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ est égal à $\varphi(n)$.

73.2

$$\forall x \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times, \quad x^{\varphi(n)} = 1$$

73.3 → **Théorème d'Euler**

$$\forall x \in \mathbb{Z}, \quad x \wedge n = 1 \Rightarrow x^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

73.4 Le théorème d'Euler [73.3] est une généralisation du petit théorème de Fermat [62].

74. Expression de l'indicatrice d'Euler

74.1 Si p est premier, alors $\varphi(p) = p - 1$ et

$$\forall x \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \quad x^p = x$$

soit

$$\forall x \in \mathbb{Z}, \quad x^p \equiv x \pmod{p}.$$

74.2 Si p est premier et si α est un entier supérieur à 2, alors

$$\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1} = p^{\alpha-1}(p - 1).$$

74.3 L'indicatrice d'Euler est une *fonction multiplicative* :

$$\forall (m, n) \in \mathbb{Z}^2, \quad m \wedge n = 1 \Rightarrow \varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n).$$

74.4 → *Connaissant la décomposition en produit de facteurs premiers*

$$n = \prod_{k=1}^q p_k^{m_k}$$

(où les nombres premiers p_k sont deux à deux distincts et les multiplisités m_k sont strictement positives), on en déduit que :

$$\varphi(n) = \prod_{k=1}^q p_k^{m_k-1} (p_k - 1).$$

75. Utilisation

Pour calculer les deux dernières décimales de 3^{1789} , il suffit de savoir que $\varphi(100) = 40$, mais il vaut mieux remarquer que $3^{20} \equiv 1 \pmod{100}$.

Pour calculer les deux dernières décimales de 4^{2026} , la connaissance de $\varphi(100)$ est inutile. On aboutit au résultat avec la relation :

$$\forall (k, r) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*, \quad 4^{10k+r} \equiv 4^r \pmod{100}.$$

Entraînement

76. Le code Python suivant permet de calculer les valeurs de la fonction d'Euler.

```
def phi(n):
    liste = [0]+[1]*(n-1)
    for k in range(2, n//2+1):
        if n%k==0:
            for j in range(1, (n-1)//k+1):
                liste[j*k] = 0
    return sum(liste)
```

77. Soient $n \geq 1$, un entier et D_n , l'ensemble des entiers naturels qui divisent n .

77.1 Pour tout entier $d \in D_n$, on pose

$$A_d = \{1 \leq k \leq n : n \wedge k = d\}.$$

Le cardinal de A_d est égal à $\varphi(n/d)$ et

$$\{1, \dots, n\} = \bigsqcup_{d \in D_n} A_d.$$

77.2 L'application $[d \mapsto n/d]$ est une bijection de D_n sur D_n , donc

$$\sum_{d \in D_n} \varphi(d) = \sum_{d \in D_n} \varphi(n/d) = n.$$

78. Point de vue probabiliste

Soit $n \geq 2$, un entier. L'ensemble $\Omega = \{1, \dots, n\}$ est muni de la mesure de probabilité uniforme :

$$\forall k \in \Omega, \quad P(\{k\}) = \frac{1}{n}.$$

78.1 Pour tout diviseur d de n , on note M_d , l'ensemble des multiples de d qui appartiennent à Ω . La probabilité $Q(M_d)$ est égale à $1/d$.

78.2 On considère la décomposition de n en produit de facteurs premiers :

$$n = \prod_{k=1}^s p_k^{\alpha_k}$$

où les α_k sont des entiers naturels non nuls.

1. Comme

$$M_{p_1} \cap \dots \cap M_{p_r} = M_{p_1 \dots p_r}$$

pour tout $1 \leq r \leq s$, les événements M_{p_k} sont indépendants pour la mesure de probabilité Q .

2. L'ensemble des entiers de Ω qui sont premiers avec n est égal à

$$\bigcap_{k=1}^s M_{p_k}^c.$$

On retrouve ainsi l'expression de $\varphi(n)$ en fonction des facteurs premiers de n .

79. Le système RSA

Soient p et q , deux nombres premiers distincts. On pose

$$n = pq$$

et on choisit deux entiers r et s tels que

$$rs \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}.$$

79.1 L'entier $\varphi(n)$ est égal à $(p-1)(q-1)$ et il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $rs = k(p-1)(q-1) + 1$ et

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{Z}, \quad x^{rs} &\equiv x \pmod{p} \\ &\equiv x \pmod{q}. \end{aligned}$$

79.2 Les applications

$$f : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \quad \text{et} \quad g : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

définies par

$$\forall u \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \quad f(u) = u^r \quad \text{et} \quad g(u) = u^s$$

sont bijectives et réciproques l'une de l'autre.

Questions, exercices & problèmes

Perfectionnement

80. Exemples et contre-exemples

1. Exemples d'éléments nilpotents :

1.a dans $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$;

1.b dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

2. Exemple de polynôme à coefficients dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ admettant deux factorisations différentes.

81. Méthodes

1. Comment calculer facilement $\mathcal{C}(a^m)$?

2. Comment résoudre une équation polynomiale dont l'inconnue appartient à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$?

3. Comment factoriser un polynôme dont les coefficients appartiennent à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$?

82. Questions pour réfléchir

1. Soient P et Q dans $\mathbb{R}[X]$. Si $D \in \mathbb{R}[X]$ est un pgcd de P et Q considérés comme des éléments de $\mathbb{R}[X]$, alors D est aussi un pgcd de P et Q considérés comme des éléments de $\mathbb{C}[X]$.

2. Discuter l'existence du pgcd d'une famille infinie d'éléments de A .

3. Discuter l'existence du ppcm d'une famille infinie d'éléments de A .

4. Relier la propriété [12.2] :

$$\frac{1}{P} = \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{P_k}$$

à l'existence d'une **décomposition en éléments simples** pour la fraction rationnelle $1/P$.

5. Discuter l'intérêt pratique des formules [20].

83. Soit $n \geq 1$, un entier. Pour tout $1 \leq k \leq n$, on note r_k , le reste de la division euclidienne de n par k .

83.1 Le reste r_k est supérieur à $k/2$ si, et seulement si, il existe un entier $1 \leq q \leq n$ tel que

$$(2q+1)k \leq 2n < (2q+2)k.$$

83.2 Comme le nombre d'entiers compris entre deux réels a et b est compris entre $(b-a) - 1$ et $(b-a) + 1$, la proportion

$$\frac{\#\{1 \leq k \leq n : r_k \geq k/2\}}{n}$$

tend vers [6.41.2]

$$\sum_{q=1}^{+\infty} \frac{1}{(2q+1)(q+1)} = 2 \ln 2 - 1.$$

Équation de Bézout

84. Calculer le pgcd de 1683 et 969. En déduire les couples $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ qui vérifient les équations suivantes :

1. $969x - 1683y = 51$ (on vérifiera que $(7, 4)$ est une solution)

2. $969x - 1683y = 102$

3. $969x - 1683y = 84$

85. Déterminer les couples $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ tels que

$$23x + 56y = 3.$$

86.1 On considère l'équation

$$13x - 7y = 1$$

d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$. En remarquant que $x + 1$ est divisible par 7, déterminer une solution particulière (x_0, y_0) avec $0 \leq x_0 \leq 7$. En déduire les autres solutions.

86.2 Résoudre l'équation $13x - 7y = 2$ d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$.

87. On considère deux entiers naturels a et b et on note $d = a \wedge b$. Déterminer le pgcd des entiers

$$a' = 13a + 5b \quad \text{et} \quad b' = 5a + 2b.$$

88. Soient n , un entier naturel non nul, et p , un entier premier (distinct de n). Déterminer les nombres complexes z qui vérifient les deux équations suivantes.

$$z^n + 1 = 0 \quad z^p + 1 = 0$$

On fera intervenir le pgcd $d = n \wedge p$.

89. Suite de [20.113] – Soient α , une racine complexe du polynôme $P_0 = X^3 - 2$ et $R \in \mathbb{Q}_2[X]$.

1. Si $R(\alpha) \neq 0$, alors R et P_0 sont premiers entre eux.
2. Il existe un polynôme $V \in \mathbb{Q}_2[X]$ tel que $R(\alpha)V(\alpha) = 1$.

Calculs algébriques dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

90. Étudier, suivant la valeur de l'entier n , le reste de la division euclidienne par 6 de l'entier 5^n . Pour quelles valeurs de n le nombre $A_n = 5^n + 5n + 1$ est-il divisible par 6?

91. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, déterminer le reste modulo 7 de 5^n . En déduire le reste modulo 7 de 1972^{57} et les entiers n pour lesquels 1972^n est congru à 4 modulo 7.

92. Déterminer le reste de 8^{1974} modulo 5.

93. Pour tout entier naturel n , l'entier

$$u_n = 3^{n+3} - 4^{4n+2}$$

est divisible par 11.

94. Déterminer les entiers naturels n tels que

$$5^{2n} + 5^n \equiv 0 \pmod{13}.$$

95. Déterminer les restes modulo 13 des entiers 5^k pour tout entier $0 \leq k < 5$. En déduire que l'entier

$$u_n = 31^{4n+1} + 18^{4n-1}$$

est divisible par 13 pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$.

96. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'entier n^2 est congru à 0, à 1 ou à 4 modulo 8. En déduire les entiers relatifs x tels que

$$(5x + 3)^2 - 1 = 0 \pmod{8}.$$

97. Résoudre l'équation $x^2 + x + 6 = 0$ dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$.

98. Résoudre les systèmes

$$\begin{cases} 2x - 4y = 2 \\ x + 5y = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

99. Dresser la table de multiplication de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Résoudre le système

$$\begin{cases} 3x + y = 3 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

dans $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^2$.

100. Dresser la table de multiplication de l'anneau $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. En déduire les solutions de l'équation $2x = 0$ dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ et résoudre le système suivant dans $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})^2$.

$$\begin{cases} 2x + 2y = 4 \\ 5x + 3y = 3 \end{cases}$$

101. Dresser la table de multiplication de l'anneau $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$. En déduire les solutions des équations

$$3x + 4 = 0 \quad 2x + 1 = 0$$

dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, puis résoudre le système suivant dans $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^2$.

$$\begin{cases} 3x + 4y = 1 \\ 2x + 3y = 2 \end{cases}$$

Démontrer que l'équation $x^2 + x + 1 = 0$ n'a pas de solution dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$.

102. Résoudre l'équation

$$x^3 = x$$

dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, puis dans $\mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$.

103. On considère l'équation

$$x^2 + 2x - 3 = 0.$$

103.1 Résoudre l'équation dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$.

103.2 Déterminer les diviseurs de zéro dans $\mathbb{Z}/21\mathbb{Z}$. En déduire les solutions de l'équation dans $\mathbb{Z}/21\mathbb{Z}$.

104. Résoudre l'équation

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$. En déduire les entiers relatifs n tels que le reste de la division euclidienne de $n^2 - 3n$ par 5 soit égal à 3.

105. Déterminer les entiers relatifs n tels que

$$n^3 + 1 = 0 \pmod{7}$$

puis les entiers relatifs n tels que

$$n^3 - 1 = 0 \pmod{7}.$$

Quel que soit l'entier relatif n , l'entier

$$u_n = n(n^3 + 1)(n^3 - 1)$$

est divisible par 42.

106. On pose ici $\mathbb{K} = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ et on considère l'équation

$$x^2 + px + q = 0$$

où les coefficients p et q ainsi que l'inconnue x appartiennent au corps \mathbb{K} .

Déterminer successivement les couples $(p, q) \in \mathbb{K}^2$ tels que l'équation étudiée admette 0 (resp. 1, resp. 2) pour solution. Pour quels couples (p, q) cette équation n'admet-elle aucune solution?

107. Soit $n \geq 3$, un nombre premier. On dit que $a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un *carré parfait* lorsqu'il existe un élément b non nul de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tel que $a = b^2$.

107.1 L'équation $x^2 = 0$ admet une, et une seule, solution dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Si a est un carré parfait, alors l'équation $x^2 = a$ admet exactement deux solutions dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

107.2 On considère l'équation

$$(*) \quad ax^2 + bx + c = 0$$

dont les coefficients a, b, c et l'inconnue x appartiennent à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. On suppose que a n'est pas nul.

1. L'équation $2ap = b$ admet une, et une seule, solution $p \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

2. L'équation $(*)$ admet deux solutions dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si, et seulement si, $ap^2 - c$ est un carré parfait. Que dire de l'équation $(*)$ lorsque $ap^2 - c = 0$?

107.3 On suppose ici que $n = 7$ et on considère l'équation

$$5x^2 + 3x + 2 = 0.$$

Quels sont les carrés parfaits de $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$? En déduire les solutions de l'équation.

108. On note p_1, \dots, p_n , les n premiers nombres premiers congrus à 1 modulo 4.

On pose

$$a = p_1 \cdots p_n, \quad N = a^2 + 1$$

et on note q , un diviseur premier de N .

1. L'entier q est impair, distinct de p_1, \dots, p_n .
2. Comme $a^2 \equiv -1 \pmod{q}$, alors $a^4 \equiv 1 \pmod{q}$.
3. D'après le petit Théorème de Fermat, q est congru à 1 modulo 4. L'ensemble des nombres premiers congrus à 1 modulo 4 est donc infini.

109. On considère l'ensemble X des nombres premiers congrus à -1 modulo 4.

1. L'ensemble X n'est pas vide.
2. Si p et q sont congrus à 1 modulo 4, alors pq est congru à 1 modulo 4.
3. Si l'ensemble X était fini, on pourrait l'énumérer

$$X = \{p_1, \dots, p_n\}$$

et considérer l'entier

$$a = 4p_1 \cdots p_n - 1.$$

L'entier a est strictement supérieur à 1 et impair. Il admet un facteur premier congru à -1 modulo 4, alors qu'il est premier à p_1, \dots, p_n . L'ensemble X est donc infini.

110. Carrés modulo p

Soient p , un nombre premier impair et G , le groupe des éléments inversibles du corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

On définit l'entier q par $(p-1) = 2q$.

1. L'application

$$\varphi = [x \mapsto x^2]$$

est un endomorphisme de groupe de G . Le noyau de ce morphisme est égal à $\{\pm 1\}$, donc son image est un sous-groupe d'ordre q .

2. D'après le petit théorème de Fermat, chaque élément y de $\text{Im } \varphi$ est une racine du polynôme $X^q - 1$. Comme le polynôme $X^q - 1$ admet au plus q racines distinctes,

$$\forall y \in G, \quad \exists x \in G, \quad y = x^2 \iff y^q = 1$$

et en particulier,

$$\exists x \in G, \quad -1 = x^2 \iff q \in 2\mathbb{N}.$$

Donc -1 est un carré dans G si, et seulement si, $p \equiv 1 \pmod{4}$.

3. On suppose qu'il n'existe qu'un nombre fini de nombres premiers congrus à 1 modulo 4 :

$$p_1, p_2, \dots, p_n$$

et on considère un nombre premier p qui divise

$$a = (p_1 p_2 \cdots p_n)^2 + 1.$$

L'entier p est impair, distinct de p_1, \dots, p_n et pourtant, p est congru à 1 modulo 4.

111. Soit p , un nombre premier. Pour tout entier $k \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$S_k = \sum_{x \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} x^k$$

1. Pour tout $y \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, on a

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad y^k S_k = S_k$$

donc $S_k = 0$ ou $S_k = -1$.

2. Si k est un multiple de $(p-1)$, alors $S_k = 0$.

3. Sinon, on pose $d = (p-1) \wedge k$.

3.a Si $y^k = 1$, alors $y^d = 1$.

3.b Comme le polynôme $X^d - 1$ ne peut avoir $(p-1)$ racines, la somme S_k est nulle.

112. Soient p , un nombre premier et $G = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, le groupe multiplicatif des éléments inversibles du corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

1. Soient q , un diviseur premier de $(p-1)$ et m , l'entier défini par $(p-1) = qm$.

1.a Pour tout $x \in G$, l'ordre de x^m est un diviseur de q . Comme le polynôme $X^m - 1$ n'est pas identiquement nul sur G , il existe au moins un élément de G dont l'ordre est égal à q .

1.b S'il existe un entier $\alpha \in \mathbb{N}^*$ tel que q^α divise $(p-1)$, alors il existe au moins un élément $x_\alpha \in G$ dont l'ordre est égal à q^α .

2. Il existe des nombres premiers distincts q_1, \dots, q_r et des entiers naturels non nuls $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ tels que

$$p-1 = q_1^{\alpha_1} q_2^{\alpha_2} \cdots q_r^{\alpha_r}$$

L'ordre de $x_{\alpha_1} \cdots x_{\alpha_r}$ est égal à $(p-1)$. Autrement dit, le groupe (G, \times) est cyclique.

Lemme chinois des restes

113. Soient a et b , deux entiers naturels donnés. On cherche les entiers $x \in \mathbb{Z}$ qui vérifient le système suivant.

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{9} \\ x \equiv b \pmod{11} \end{cases}$$

Vérifier que toutes les solutions sont congrues à un même entier x_0 modulo 99. En déduire l'ensemble des solutions du système.

114. On considère l'ensemble E des entiers relatifs x qui vérifient simultanément les relations suivantes.

$$\begin{aligned} x &\equiv 2 \pmod{3} & x &\equiv 2 \pmod{5} \\ x &\equiv 2 \pmod{7} & x &\equiv 2 \pmod{9} \end{aligned}$$

Donner la forme générale des éléments de E . Déterminer les éléments de E qui sont compris (au sens large) entre -1000 et -500 . Quel est le pgcd de deux éléments consécutifs de E ?

115. On note S , l'ensemble des entiers relatifs x tels que

$$x \equiv 1 \pmod{3} \quad \text{et} \quad x \equiv 2 \pmod{5}.$$

Déterminer un entier $x \in S$ compris entre 0 et 10. Démontrer que

$$\forall (a, b) \in S \times S, \quad (a-1) \equiv (a-1)(b-1) \pmod{15}.$$

Déterminer les éléments de S .

116. Résoudre le système suivant d'inconnue $x \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{cases} 3x \equiv 1 \pmod{4} \\ 2x \equiv 4 \pmod{5} \end{cases}$$

Factorisation, ppccm, pgcd

117. Déterminer les couples $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ tels que

$$x^2 - 4y^2 = 36.$$

118. Déterminer les entiers naturels impairs n tels que la fraction

$$\frac{n^3 - n}{n + 2}$$

soit réductible.

119. Soit $1 \leq a \leq 100$, un entier naturel. On suppose que les entiers (a, b, c, d, e) forment une progression géométrique de raison entière $q \geq 2$. Si

$$6a^2 = e - b,$$

alors $q = 3$ et $a = 13$.

120. Déterminer les entiers naturels a et b dont le pgcd d et le ppccm m vérifient la relation suivante.

$$m - 2d = 22$$

121. Déterminer les entiers naturels a et b dont le pgcd d et le ppccm m vérifient la relation suivante.

$$m - d = 77$$

122. Soit N , un entier naturel dont la décomposition en facteurs premiers est

$$N = a^\alpha b^\beta c^\gamma$$

où les valuations α, β et γ sont strictement positives.

122.1 On note $\sigma(N)$, la somme des diviseurs de N . Démontrer que

$$\sigma(N) = \sum_{k=0}^{\alpha} a^k \sum_{k=0}^{\beta} b^k \sum_{k=0}^{\gamma} c^k.$$

Que vaut $\sigma(175)$?

122.2 L'entier N est dit *parfait* lorsque $\sigma(N) = 2N$. Si l'entier $2^n - 1$ est premier, alors l'entier

$$N = 2^{n-1}(2^n - 1)$$

est parfait.

123.1 L'entier $2^{11} - 1$ est-il premier?

123.2 Soient p et q , deux entiers naturels non nuls. Quel est le reste de la division euclidienne de $2^{pq} = (2^p)^q$ par $2^p - 1$? En déduire que $2^{pq} - 1$ est divisible par $(2^p - 1)$ et par $(2^q - 1)$.

123.3 Si $2^n - 1$ est premier, alors n est premier. La réciproque est fautive.

124. Soient a et b , deux nombres premiers distincts. On note E , l'ensemble des entiers naturels qui n'ont pas d'autre diviseur premier que a et b .

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad n \in E \iff \exists (\alpha, \beta) \in \mathbb{N}^2, \quad n = a^\alpha b^\beta.$$

124.1 Soit $n = a^\alpha b^\beta \in E$. Le nombre $\sigma(n)$ de diviseurs de n est égal à $(\alpha + 1)(\beta + 1)$.

124.2 Soient x et y dans E . On suppose que $\sigma(x) = 12$ et que $\sigma(y) = 10$.

1. Quelles sont les décompositions primaires possibles de x et de y ?

2. On suppose de plus que $x \wedge y = 10$. Déterminer x et y , ainsi que a et b .

125.1 Déterminer les entiers relatifs a, b, c et d tels que

$$X^3 + aX^2 + 4x + 8 = (X + b)(X^2 + cX + d).$$

125.2 Soit $p \geq 2$, un nombre premier. Déterminer en fonction de p les entiers relatifs a, b, c et d tels que

$$X^3 + aX^2 + 4x + p = (X + b)(X^2 + cX + d).$$

126.1 Soient x et y , deux entiers naturels non nuls, premiers entre eux. Démontrer que les deux entiers $x + y$ et xy sont de parités différentes.

126.2 Donner la liste (croissante) des diviseurs positifs de 84.

126.3 Déterminer les entiers naturels a et b tels que

$$a + b = 84 \quad \text{et} \quad M = \Delta^2$$

où $M = a \vee b$ et $\Delta = a \wedge b$. (On posera $a = \Delta\alpha$ et $b = \Delta\beta$.)

127. On note E , l'ensemble des entiers naturels n pour lesquels il existe trois entiers naturels premiers $a < b < c$ dont l'un est la somme des deux autres et tels que $n = abc$.

1. L'entier $n = 286$ appartient à E .
2. Déterminer l'entier a .
3. On suppose que N_1 et N_2 sont deux entiers tels que

$$N_1 \leq n < N_2.$$

Encadrer l'entier b à l'aide de N_1 et N_2 . En déduire les entiers n appartenant à E et compris entre $N_1 = 6.10^4$ et $N_2 = 8.10^4$.

Approfondissement

128. Code Python

Écrire des fonctions en langage Python qui effectuent les opérations suivantes.

128.1 Factoriser un entier $n \geq 1$ en produit de facteurs premiers. La factorisation

$$n = \prod_{k=1}^r p_k^{\alpha_k}$$

sera représentée par une liste de listes $((p_i, \alpha_i))_{0 \leq i < r}$.

128.2 Comment utiliser cette factorisation pour vérifier qu'un entier est premier? Cette méthode est-elle efficace?

128.3 Comment utiliser cette factorisation pour vérifier qu'un entier est un carré parfait?

128.4 Comment factoriser simultanément deux entiers m et n comme au [38]?

129. Soient P et Q , deux polynômes unitaires, à coefficients complexes, non constants.

1. Soient d , le degré de P ; m , le nombre de racines distinctes de P et n , le nombre de racines distinctes de $P - 1$.

$$P = \prod_{k=1}^m (X - \lambda_k)^{a_k} \quad P - 1 = \prod_{\ell=1}^n (X - \mu_\ell)^{b_\ell}$$

Alors, comme P et $P - 1$ n'ont pas de racine commune,

$$d \leq m + n - 1.$$

2. On suppose d'une part que P et Q ont les mêmes racines et d'autre part que $(P - 1)$ et $(Q - 1)$ ont les mêmes racines. (Dans les deux cas, on ne fait aucune hypothèse sur les multiplicités respectives des racines.) Alors $P = Q$.

130. Factorisation dans $\mathbb{Q}[X]$

1. Soient $P = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n \in \mathbb{Z}[X]$ et $r \in \mathbb{Q}$, une racine de P représentée sous forme irréductible par $r = p/q$. L'entier p divise a_0 et l'entier q divise a_n . La différence $q - p$ divise $P(1)$ et la somme $q + p$ divise $P(-1)$.

2. Comment programmer le calcul de toutes les racines rationnelles d'un polynôme à coefficients rationnels?

3. Comment obtenir la factorisation suivante?

$$29X^3 - 175X^2 + 267X - 9 = (X - 3)^3(29X - 1)$$

4. Le polynôme $Q = 3X^3 - 19X^2 + 33X + 9$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

131. Factorisations dans \mathbb{Z}

On démontre qu'un entier est composé [20.83.1] en le factorisant sous la forme d'un produit de deux entiers supérieurs à 2.

131.1 Suite de [130] – Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, l'entier $n^4 - n + 16$ est composé.

131.2 L'entier $4n^3 + 6n^2 + 4n + 1 = (n + 1)^4 - n^4$ est composé pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

131.3 Série géométrique

1. Pour tout entier $a \geq 3$ et tout entier $n \geq 2$, l'entier $a^n - 1$ est composé.

2. Si $a \geq 2$ et si n n'est pas premier, alors il existe deux entiers $b \geq 4$ et $p \geq 2$ tels que

$$a^n - 1 = (b - 1) \sum_{k=0}^{p-1} b^k$$

et $(a^n - 1)$ n'est pas premier.

3. Soit $a \geq 2$.

3.a Si n est divisible par un entier impair, alors il existe deux entiers $b \geq 2$ et $p \geq 2$ tels que

$$a^n + 1 = (b + 1) \sum_{k=0}^{p-1} (-1)^{p-k-1} b^k.$$

3.b Si $a^n + 1$ est premier, alors n est une puissance de 2.

4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$U_n = 1 + 10 + 10^2 + \dots + 10^n.$$

4.a Si n est divisible par 3, alors U_{n-1} est divisible par 3.

4.b Si p est un nombre premier distinct de 2, 3 et 5, alors p divise $10^{p-1} - 1$ et U_{p-2} .

131.4 Nombres de Mersenne

Si l'entier $a^p - 1$ est premier avec $a \geq 2$ et $p \geq 2$, alors $a = 2$ et p est premier.

La réciproque est fautive, puisque $2^{11} - 1 = 23 \times 89$.

132. Soient m et n , deux entiers naturels non nuls.

1. Si la division euclidienne de m par n s'écrit $m = qn + r$ avec $q \geq 2$, alors

$$X^m - 1 = X^r(X^n - 1)(X^{(q-1)n} + \dots + X^n + 1) + (X^r - 1).$$

Que devient cette relation pour $q = 1$ et $q = 0$?

2. Le pgcd de $(X^m - 1)$ et de $(X^n - 1)$ est égal au pgcd de $(X^n - 1)$ et de $(X^r - 1)$.

3. Le pgcd de $(X^m - 1)$ et de $(X^n - 1)$ est égal à $(X^{m \wedge n} - 1)$.

133. Triplets pythagoriciens

On étudie les solutions $(x, y, z) \in \mathbb{N}^3$ de l'équation

$$(2) \quad x^2 + y^2 = z^2.$$

133.1 Analyse

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{N}^3$, une solution de (2).

1. Les pgcd $x \wedge y$, $y \wedge z$ et $z \wedge x$ sont égaux [38].

2. On suppose que x , y et z sont deux à deux premiers entre eux.

2.a Les entiers x et y sont de parités différentes : l'un est pair, l'autre est impair.

2.b On suppose que x est pair et que y est impair :

$$\exists (m, n, q) \in \mathbb{N}^3, \quad x = 2m, \quad y = 2n + 1, \quad z = 2q + 1.$$

Alors

$$m^2 = (n + q + 1)(q - n)$$

et les facteurs $n + q + 1$ et $q - n$ sont premiers entre eux, donc il existe [38.3] deux entiers k et ℓ , premiers entre eux, tels que

$$n + q + 1 = \pm k^2 \quad \text{et} \quad q - n = \pm \ell^2.$$

133.2 Synthèse

Le triplet $(x, y, z) \in \mathbb{N}^3$ est solution de (2) si, et seulement si, il existe deux entiers $0 \leq k < \ell$ premiers entre eux tels que

$$(x, y, z) = (2k\ell, \ell^2 - k^2, \ell^2 + k^2).$$

134. Points entiers d'une hyperbole

1. Soit p , un nombre premier.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, le pgcd de n et de $(n - p)$ est égal à 1 ou à p .

2. Les couples $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ qui appartiennent à l'hyperbole $[xy = 2x + 3y]$ sont :

$$(-3, 1), (0, 0), (1, -1), (2, -4), (4, 8), (5, 5), (6, 4), (9, 3).$$

3. Les couples $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ qui appartiennent à l'hyperbole $[xy = 5x + 5y]$ sont :

$$(-20, 4), (0, 0), (4, -20), (6, 30), (10, 10), (30, 6).$$

4. Si $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ est un point de l'hyperbole

$$\mathcal{H} = [x^2 - y^2 - 4x - 2y = 7]$$

alors $(x + y - 1)(x - y - 3) = 10$.

Comme $(x + y - 1)$ et $(x - y - 3)$ ont même parité, l'hyperbole \mathcal{H} ne rencontre pas \mathbb{Z}^2 .

135.1 Le couple $(x, y) \in \mathbb{N}^2$ est une solution de

$$\begin{cases} x \wedge y = 5 \\ x \vee y = 60 \end{cases}$$

si, et seulement si, il existe un couple (α, β) tel que

$$(x, y) = (5\alpha, 5\beta) \quad \text{et} \quad \{\alpha, \beta\} = \{1, 12\} \quad \text{ou} \quad \{3, 4\}.$$

135.2 Le couple $(x, y) \in \mathbb{N}^2$ est une solution de

$$\begin{cases} x + y = 100 \\ x \wedge y = 10 \end{cases}$$

si, et seulement si, il existe un couple (α, β) tel que

$$(x, y) = (10\alpha, 10\beta) \quad \text{et} \quad \{\alpha, \beta\} = \{1, 9\} \quad \text{ou} \quad \{3, 7\}.$$

135.3 Le couple $(x, y) \in \mathbb{N}^2$ est une solution de

$$\begin{cases} 11x - 5y = 10 \\ x \wedge y = 10 \end{cases}$$

si, et seulement si, il existe un entier $k \in \mathbb{N}$ tel que

$$(x, y) = (10\alpha, 10\beta) \quad \text{où} \quad (\alpha, \beta) = (1 + 5k, 2 + 11k).$$

136. Théorème de Wilson

Le théorème de Wilson est une caractérisation, peu utile, des entiers premiers.

136.1 Soit p , un nombre premier.

1. Résoudre l'équation $x^2 = 1$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

2. Si $p \geq 3$, il y a $(p - 3)$ éléments inversibles et distincts de leur inverse dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, donc $(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

136.2 Soit n , un nombre composé. Il existe donc deux entiers p et q tels que $2 \leq p \leq q \leq n - 1$ et que $n = pq$.

3. Si $p < q$, alors $(n - 1)! \equiv 0 \pmod{n}$.

4. Si $3 \leq p = q$, alors $2 \leq p < 2p \leq n - 1$ et $(n - 1)!$ est un multiple de n .

136.3 → Un entier $n \geq 2$ est premier si, et seulement si,

$$(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}.$$

137. Soient a, b et c , trois entiers compris entre 0 et 4, l'entier a étant non nul. On suppose qu'un entier N s'écrit $abc0$ en base 5 et abc en base 12 :

$$N = 5^3a + 5^2b + 5c = 12^2a + 12b + c.$$

Déterminer a, b, c et N en raisonnant dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

138. Soit $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$, une fonction non identiquement nulle telle que

$$\forall p \in \mathbb{Z}, \quad f(2p) = 0 \quad \text{et} \quad f(p+4) = f(p)$$

et que

$$\forall (p, q) \in \mathbb{Z}^2, \quad f(pq) = f(p)f(q).$$

Que vaut $f(1)$? Que vaut $f(3)$? En déduire les valeurs de $f(k)$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

139. **Théorème de Lagrange [20.27.2] dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$**

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{Z}$. On note $d \in \mathbb{N}^*$, le pgcd de n et x .

1. Il existe $\delta \in \mathbb{N}^*$ et $\zeta \in \mathbb{Z}$, premiers entre eux, tels que $n = d\delta$ et $x = d\zeta$. L'entier n divise δx .

2. Si n divise kx , alors il existe $\ell \in \mathbb{Z}$ tel que $kx = n\ell$ et $k\zeta = \ell\delta$. L'entier δ divise k .

3. L'ordre de $\mathcal{C}(x)$ est égal à δ .

140. Si l'entier n admet $p_1^{\alpha_1} \cdots p_q^{\alpha_q}$ pour décomposition en produit de facteurs premiers, alors l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est isomorphe au produit

$$\mathbb{Z}/p_1^{\alpha_1}\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/p_q^{\alpha_q}\mathbb{Z}.$$

Relier cette factorisation au théorème [59].

141. Soit (G, \star) , un groupe commutatif d'ordre n , dont l'élément neutre est noté e . On suppose qu'il existe deux entiers a et b , premiers entre eux, tels que

$$n = ab$$

et on pose

$$G_a = \{x^a, x \in G\}, \quad G_b = \{x^b, x \in G\}.$$

1. Pour tout $x \in G$, $x^n = e$.
2. Les ensembles G_a et G_b sont des sous-groupes de (G, \star) et $G_a \cap G_b = \{e\}$.
3. Pour tout $x \in G$, il existe un, et un seul, couple (u, v) appartenant à $G_a \times G_b$ tel que

$$x = u \star v.$$

Expliciter un isomorphisme de groupes de G sur le groupe produit $G_a \times G_b$.

142. **Somme des diviseurs d'un entier**

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, on note \mathcal{D}_n , l'ensemble des diviseurs positifs de n :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad k \in \mathcal{D}_n \iff k \mid n$$

et $\sigma(n)$, la somme des diviseurs positifs de n :

$$\sigma(n) = \sum_{k \in \mathcal{D}_n} k.$$

142.1 Si p est premier, alors $\sigma(p) = p + 1$. Plus généralement,

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \sigma(p^k) = \frac{p^{k+1} - 1}{p - 1}.$$

142.2 On considère deux entiers naturels m et n premiers entre eux.

1. Si a divise m et si b divise n , alors ab divise mn . Comme $a \wedge b = b \wedge m = 1$, alors $a = (ab) \wedge m$.

2. Réciproquement, soit $d \in \mathbb{N}^*$, un diviseur de mn . On pose

$$a = d \wedge m.$$

2.a Il existe deux entiers $b \in \mathbb{N}^*$ et $q \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$d = ab \quad \text{et} \quad mn = qd.$$

2.b Il existe deux entiers naturels μ et δ , premiers entre eux, tels que

$$a\mu n = qa\delta = qab.$$

Donc b est un diviseur de n .

142.3 En considérant les décompositions de m et de n en produit de facteurs premiers, on peut retrouver une bijection entre l'ensemble \mathcal{D}_{mn} des diviseurs de mn et l'ensemble $\Delta = \mathcal{D}_m \times \mathcal{D}_n$.

142.4 La fonction σ est multiplicative : si $m \wedge n = 1$, alors

$$\sigma(mn) = \sigma(m)\sigma(n).$$

On en déduit l'expression de $\sigma(n)$ pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$.

143. **Comparaison de groupes**

On compare ici les groupes $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/np\mathbb{Z}$.

143.1 On pose $G = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Les images du morphisme $[x \mapsto 2x]$ en tant qu'application $G \rightarrow G$ et en tant qu'application $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ ne sont pas isomorphes, donc les groupes G et $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ ne sont pas isomorphes.

143.2 L'addition dans le groupe produit $G = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ est définie par la table suivante.

\oplus	(0,0)	(1,0)	(0,1)	(1,1)	(0,2)	(1,2)
(0,0)	(0,0)	(1,0)	(0,1)	(1,1)	(0,2)	(1,2)
(1,0)	(1,0)	(0,0)	(1,1)	(0,1)	(1,2)	(0,2)
(0,1)	(0,1)	(1,1)	(0,2)	(1,2)	(0,0)	(1,0)
(1,1)	(1,1)	(0,1)	(1,2)	(0,2)	(1,0)	(0,0)
(0,2)	(0,2)	(1,2)	(0,0)	(1,0)	(0,1)	(1,1)
(1,2)	(1,2)	(0,2)	(1,0)	(0,0)	(1,1)	(0,1)

L'application

$$\theta : \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

$$\mathcal{C}_6(n) \mapsto (n\mathcal{C}_2(1), n\mathcal{C}_3(1))$$

est un isomorphisme de groupes.

144. Soient P et Q , deux polynômes à coefficients réels, scindés sur \mathbb{R} , à racines simples :

$$P = \prod_{k=1}^m (X - a_k), \quad Q = \prod_{\ell=1}^n (X - b_\ell).$$

On suppose que P et Q n'ont pas de racine commune et que leurs racines sont "entrelacées" : entre deux racines de chaque polynôme se trouve au moins une racine de l'autre polynôme.

1. On peut supposer, sans perte de généralité, que

$$a_1 < b_1 < a_2 < b_2 < \cdots < b_{m-1} < a_m < b_m$$

ou que

$$a_1 < b_1 < a_2 < b_2 < \cdots < b_{m-1} < a_m.$$

2. Quels que soient les réels λ et μ non nuls, le polynôme $\lambda P + \mu Q$ est scindé à racines simples.

Pour aller plus loin

145. **Questions pour réfléchir**

1. Mettre au point un algorithme qui calcule les tables [57] et [143].

2. Un anneau intègre contient-il un élément nilpotent? Et un anneau qui n'est pas intègre?

3. Suite de [31.1] – Condition sur les entiers a, b, c et d pour que les entiers $an + b$ et $cn + d$ soient premiers tout n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

146. Théorèmes de factorisation

Pour un entier $n \geq 1$ fixé, on note \mathcal{C} , le morphisme canonique de \mathbb{Z} sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. [46.2]

146.1 Si $\psi : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow G$ est un morphisme de groupes, alors l'application $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow G$ définie par $\varphi = \psi \circ \mathcal{C}$ est un morphisme de groupes dont le noyau contient $n\mathbb{Z}$.

146.2 Premier théorème [20.59]

Soit $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow G$, un morphisme de groupes.

Si $n\mathbb{Z} \subset \text{Ker } \varphi$, alors il existe un, et un seul, morphisme de groupes

$$\psi : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow G$$

tel que $\varphi = \psi \circ \mathcal{C}$.

146.3 Second théorème de factorisation [20.95]

Soit $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow A$, un morphisme d'anneaux tel que $n\mathbb{Z} \subset \text{Ker } \varphi$. Il existe un, et un seul, morphisme d'anneaux

$$\psi : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow A$$

tel que $\varphi = \psi \circ \mathcal{C}$.

147. Caractéristique d'un corps

Soit $(\mathbb{K}, +, \times)$, un corps.

147.1 L'application $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{K}$ définie par

$$\forall k \in \mathbb{Z}, \quad \varphi(k) = k \cdot 1_{\mathbb{K}}$$

est un morphisme d'anneaux.

147.2 Si $n = pq$ avec $1 < p \leq q < n$, alors il n'existe pas d'isomorphisme d'anneaux $\psi : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{K}$.

147.3 Suite de [146.3] – Si φ n'est pas injectif, alors il existe un nombre premier p tel que $\text{Ker } \varphi = p\mathbb{Z}$.

147.4 Un corps \mathbb{K} est un corps de caractéristique nulle lorsque le morphisme $[k \mapsto k \cdot 1_{\mathbb{K}}]$ est injectif.

147.5 Un corps \mathbb{K} est un corps de caractéristique p lorsque le noyau du morphisme $[k \mapsto k \cdot 1_{\mathbb{K}}]$ est égal à $p\mathbb{Z}$.

Dans ce cas, l'entier p est premier.

147.6 Exemples

Les corps $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Q}(X), \mathbb{R}(X), \mathbb{C}(X)$ et

$$\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2}, (a, b) \in \mathbb{Q}^2\}$$

sont des corps de caractéristique nulle.

Les corps $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})(X)$ ont pour caractéristique 2.

147.7 Si \mathbb{K} est un corps de caractéristique nulle, alors il existe un morphisme d'anneaux injectif de \mathbb{Q} dans \mathbb{K} .

148. Quotients de $\mathbb{R}[X]$ [20.95]

On transpose ici à l'anneau $\mathbb{R}[X]$ l'étude de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

148.1 Exemples de calculs modulo P_0

Soient $A = X^{100} - X^4 + X - 1$ et $P_0 = X^3 + X^2 + X + 1$.

1. Il existe $P_1 \in \mathbb{R}[X]$ tel que $X^4 = 1 + P_1P_0$.
2. Il existe $P_2 \in \mathbb{R}[X]$ tel que $X^{100} = 1 + P_2P_0$.
3. Le reste de la division euclidienne du polynôme A par P_0 est égal à $(X - 1)$.

148.2 Généralisation

Soit $P_0 \in \mathbb{R}[X]$, un polynôme dont le degré est supérieur à 1. On pose

$$\forall P \in \mathbb{R}[X], \quad \mathcal{C}(P) = \{P + P_0Q, Q \in \mathbb{R}[X]\}$$

et

$$\mathbb{R}[X]/\langle P_0 \rangle = \{\mathcal{C}(P), P \in \mathbb{R}[X]\}.$$

4. Définir une structure d'anneau sur $\mathbb{R}[X]/\langle P_0 \rangle$ qui soit compatible avec la structure d'anneau de $\mathbb{R}[X]$.

5. Si $\text{deg } P_0 = 1$, alors il existe un isomorphisme d'anneaux de $\mathbb{R}[X]/\langle P_0 \rangle$ sur \mathbb{R} .

6. Si $P_0 = X^2 + 1$, alors il existe un isomorphisme d'anneaux de $\mathbb{R}[X]/\langle P_0 \rangle$ sur \mathbb{C} .

149. Fractions continues

Une fraction continue est une expression de la forme

$$a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \dots}}}$$

où $a_0 \in \mathbb{Z}$ et les $a_k \in \mathbb{N}^*$ pour $k \geq 1$. (La famille des entiers (a_k) peut être finie ou infinie.)

149.1 Étant donnée une suite finie $(a_k)_{0 \leq k \leq n}$ ou infinie $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ d'entiers tels que $a_0 \in \mathbb{Z}$ et $a_k \in \mathbb{N}^*$ pour $k \geq 1$, la réduite de rang k est le rationnel noté $[a_0, \dots, a_k]$ et défini récursivement par

$$[a_0] = a_0 \quad \text{et} \quad \forall k \geq 1, \quad [a_0, \dots, a_k] = a_0 + \frac{1}{[a_1, \dots, a_k]}$$

149.2 Développement d'un rationnel

Soit r , un nombre rationnel. On le représente sous forme d'une fraction

$$r = \frac{p_0}{p_1}$$

et on définit une famille finie $(p_k)_{0 \leq k \leq n+1}$ par récurrence : tant que $p_i \geq 1$, on définit a_{i-1} et p_{i+1} sont le quotient et le reste de la division euclidienne de p_{i-1} par p_i .

$$p_{i-1} = a_{i-1}p_i + p_{i+1}$$

Le dernier entier p_{n+1} est le pgcd de p_0 et de p_1 .

149.3 Réduites d'une fraction continue

Soit (a_k) , un développement en fraction continue. On définit deux familles d'entiers (P_k) et (Q_k) en posant

$$(P_{-2}, Q_{-2}) = (0, 1), \quad (P_{-1}, Q_{-1}) = (1, 0)$$

et pour $k \geq 0$,

$$(P_k, Q_k) = (a_k P_{k-1} + P_{k-2}; a_k Q_{k-1} + Q_{k-2}).$$

Alors, pour tout indice $k \geq 0$,

$$\frac{P_k}{Q_k} = [a_0, a_1, \dots, a_k], \quad a_k = -\frac{P_k Q_{k-2} - P_{k-2} Q_k}{P_k Q_{k-1} - P_{k-1} Q_k},$$

$$P_{k-1} Q_k - P_k Q_{k-1} = (-1)^k.$$

En particulier, la fraction $\frac{P_k}{Q_k}$ est irréductible.

149.4 Développement en série de Engel

Pour tout réel $0 < x \leq 1$, il existe une, et une seule, suite croissante $(a_n)_{n \geq 1}$ d'entiers supérieurs à 2 telle que

$$x = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\prod_{k=1}^n \frac{1}{a_k} \right).$$

Reconnaitre x dans le cas où les a_k sont tous égaux à 2 et dans le cas où $a_k = k + 1$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

150. Nombres de Fibonacci

La suite de Fibonacci est définie par la donnée de $F_0 = 0, F_1 = 1$ et par la relation de récurrence

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

1. Comme

$$\forall n \geq 1, \quad F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$$

les entiers F_n et F_{n+1} sont premiers entre eux.

2. Soit $m \geq 1$.

2.a

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad F_{m+n} = F_m F_{n+1} + F_{m-1} F_n$$

2.b

$$\forall n \geq 1, \quad F_n \wedge F_{m+n} = F_n \wedge F_m$$

2.c Si r est le reste de la division euclidienne de m par n , alors

$$\forall n \geq 1, \quad F_m \wedge F_n = F_n \wedge F_r.$$

2.d

$$\forall m \geq 1, \forall n \geq 1, F_m \wedge F_n = F_{m \wedge n}.$$

151. Critère d'Eisenstein

Soit $A = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n \in \mathbb{Z}[X]$. On suppose qu'il existe un nombre premier p qui divise a_0, a_1, \dots, a_{n-1} mais ne divise pas a_n et que p^2 ne divise pas a_0 .

1. On suppose qu'il existe

$$B = \sum_{k=0}^{m_1} b_k X^k \in \mathbb{Z}[X], \quad C = \sum_{k=0}^{m_2} c_k X^k \in \mathbb{Z}[X]$$

tels que $A = BC$, avec $m_1 < n$ et $m_2 < n$.

1.a Comme $a_0 = b_0 c_0$, alors b_0 ou c_0 est divisible par p . Est-il possible que p divise b_0 et c_0 ?

1.b Si $p \mid b_0$, alors $p \mid b_k$ pour tout $0 \leq k \leq m_1$ et, en particulier, $p \mid a_n$.

2. Le polynôme A est irréductible en tant qu'élément de l'anneau $\mathbb{Q}[X]$.

3. Le polynôme $X^5 - 12X^2 + 9X - 3 \in \mathbb{Q}[X]$ est irréductible.

152. Polynômes cyclotomiques

Pour tout entier $n \geq 1$, on pose $\zeta_n = \exp(\frac{2i\pi}{n})$. On définit alors les polynômes $\Phi_1 = X - 1$ et

$$\forall n \geq 2, \Phi_n = \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \wedge n = 1}} (X - \zeta_n^k).$$

152.1 Soit $n \geq 2$.

1. Chaque $z \in \mathbb{U}_n$ engendre un sous-groupe de (\mathbb{U}_n, \times) et

$$\mathbb{U}_n = \bigsqcup_{d \mid n} \{z \in \mathbb{U}_n : \#(z) = d\}.$$

2. Si $\#(z) = d$, alors il existe $0 \leq k < d$ tel que $z = \zeta_d^k$ et $k \wedge d = 1$.

3. On en déduit [72] que

$$\forall n \geq 2, \quad n = \sum_{d \mid n} \varphi(d)$$

et que

$$\forall n \geq 2, \quad X^n - 1 = \prod_{d \mid n} \Phi_d.$$

4. Les coefficients des polynômes Φ_n sont des entiers relatifs, quel que soit $n \in \mathbb{N}^*$.

152.2 Soit p , un nombre premier.

5.

$$\Phi_p = 1 + X + X^2 + \dots + X^{p-1}$$

6. D'après [151], le polynôme $\Phi_p(X + 1)$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$. Le polynôme Φ_p est donc irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

7. Le complexe ζ_p est un entier algébrique, son polynôme minimal est le polynôme Φ_p .

8. La dimension de l'algèbre

$$\mathbb{Q}[\zeta_p] = \{Q(\zeta_p), Q \in \mathbb{Q}[X]\} = \text{Vect}_{\mathbb{Q}}(1, \zeta_p, \dots, \zeta_p^{p-2})$$

est égale à $(p - 1)$ et comme le polynôme Φ_p est irréductible, cette algèbre est un sous-corps de \mathbb{C} .

153. Quotient par un idéal maximal

Soit A , un anneau commutatif. Un idéal $I \subsetneq A$ est dit *maximal* lorsque le seul idéal J de A tel que

$$I \subsetneq J \subset A$$

est l'idéal $J = A$.

153.1 Les idéaux maximaux de $A = \mathbb{K}[X]$ sont les idéaux engendrés par un polynôme irréductible.

Les idéaux maximaux de \mathbb{Z} sont les idéaux engendrés par un nombre premier.

153.2 Soit I , un idéal de A . La *classe modulo* I de $x \in A$ est définie par

$$x + I = \{x + y, y \in I\}.$$

En particulier, l'idéal I est la classe de 0.

Le *quotient* de l'anneau A par un idéal I est l'ensemble $R = A/I$ des classes modulo I .

$$A/I = \{x + I, x \in A\}$$

1. Étant donnés deux éléments u et v de R , il existe deux éléments x et y de A tels que

$$u = x + I \quad \text{et} \quad v = y + I.$$

1.a La somme $u \oplus v$ est bien définie par

$$u \oplus v = (x + y) + I.$$

L'élément I de R , classe de 0 modulo I , est neutre pour \oplus .

1.b Le produit $u \otimes v$ est bien défini par

$$u \otimes v = (x * y) + I.$$

L'élément $1 + I$ de R , classe de 1 modulo I , est neutre pour \otimes .

1.c Le quotient R est muni d'une structure d'anneau commutatif pour les opérations \oplus et \otimes .

153.3 Soit $u = x + I \in R$, distinct de $0 + I$.

2. L'idéal de R engendré par u :

$$\begin{aligned} \langle u \rangle &= \{u \otimes v, v \in R\} \\ &= \{(x * y) + I, y \in A\} \end{aligned}$$

est un idéal de A qui contient I et $x \notin I$, donc $\langle u \rangle = A$.

3. Il existe $y \in A$ tel que la classe $y + I$ soit l'inverse de la classe u pour la multiplication \otimes .

4. L'anneau quotient $R = A/I$ est un corps. \rightarrow [59], [148]

Complément : Quelques codes**Autour des nombres premiers**

154. Si l'entier $n \geq 1$ est composé, alors il est divisible par un entier $q \geq 2$ tel que $q^2 \leq n$. Le code suivant renvoie le plus grand entier r tel que $r^2 \leq n$.

```
def racine_entiere(n):
    r, carre = 1, 1
    continuer = (carre < n)
    while continuer:
        carre += 2*r+1
        r += 1
        continuer = (carre < n)
    if carre==n:
        return r
    else:
        return r-1
```

155. Crible d'Eratosthène

La méthode du crible permet de calculer les entiers premiers inférieurs à un entier n donné. On utilise ici une liste N de booléens : après les cas particuliers 0 et 1 (qui ne sont ni premiers, ni composés), tous les indices k multiples d'un indice donné j sont mis à `False` si bien que, à la fin de la boucle, N_i est égal à `True` si, et seulement si, l'entier $0 \leq i \leq n$ est premier.

```
def crible(n):
    N = [True]*(n+1)
    # ni 0, ni 1 ne sont premiers
    N[0], N[1] = False, False
    for j in range(2, len(N)):
        if N[j]:
            k = 2*j
            while (k<len(N)):
                N[k] = False
                k += j
    liste_preemiers = []
    for i, premier in enumerate(N):
        if premier:
            liste_preemiers.append(i)
    return liste_preemiers
```

156. Premier diviseur

On calcule le plus petit diviseur premier d'un entier $n \geq 2$. Si l'entier n est premier, ce diviseur est égal à n . Si au contraire l'entier n est composé, alors ce plus petit diviseur premier p vérifie $p^2 \leq n$.

```
def premier_diviseur(n):
    R = racine_entiere(n)
    for p in crible(R):
        if n%p==0:
            return p
    return n
```

157. Valuation

On suppose que p est un diviseur premier de n . On calcule alors le couple (m, q) tel que $n = p^m q$ où le quotient q est premier à p .

```
def valuation(n, p):
    m, q = 0, n
    while q%p==0:
        m += 1
        q = q/p
    return (m, q)
```

158. Décomposition en produit de facteurs premiers

À l'aide du crible, on cherche la valuation de chaque nombre premier p tel que $p^2 \leq n$. Si on trouve un tel facteur premier pour n , on sait que cet entier n est composé. Si, au contraire, il est premier, sa factorisation est triviale!

```
def factorisation(n):
    R = racine_entiere(n)
    diviseurs_stricts = crible(R)
    F, est_premier = [], True
    for p in diviseurs_stricts:
        if n%p==0:
            est_premier = False
            v, n = valuation(n, p)
            F.append((p, v))
    if est_premier:
        F = [(n,1)]
    return F
```

Code de l'algorithme de Blankinship

159.1 La fonction `score` va servir à calculer la solution optimale.

```
def score(ak, bk):
    return abs(ak)+abs(bk)
```

159.2 Les arguments u et v sont supposés premiers entre eux et, un troisième entier c étant donné, on cherche à résoudre l'équation $au + bv = c$ d'inconnues a et b . Pour cela, dans un premier temps, on multiplie par c une solution (a_0, b_0) de l'équation $au + bv = 1$.

```
def solution_Bezout(u, v, c):
    M = np.mat([[1,0,u],[0,1,v]], dtype=np.int64)
    # calcul de a_0 et b_0
    while M[1,2]!=0:
        q = M[0,2]//M[1,2]
        M[0,:] = M[0,:] - q*M[1,:]
        M[1, :], M[0, :] = M[0, :].copy(), M[1, :].copy()
    d = M[0,2] # un pgcd de u et v, égal à +/-1
    a, b = d*c*M[0,0], d*c*M[0,1]
    # calcul d'une solution minimale :
    # (a_k, b_k) = (a_0 + k.v, b_0 - k.u)
    score_ref = score(a, b)
    meilleur = True
    # Faut-il prendre k positif ou négatif ?
    if score(a+v, b-u)<score_ref:
        signe = 1
    elif score(a-v, b+u)<score_ref:
        signe = -1
    else:
        # On a déjà une solution optimale !
        meilleur = False
    while meilleur:
        # On continue pour améliorer le score
        aa, bb = a+signe*v, b-signe*u
        nouveau_score = score(aa, bb)
        meilleur = nouveau_score<score_ref
        if meilleur:
            # Éviter l'affectation de trop !
            score_ref = nouveau_score
            a, b = aa, bb
    return a, b
```
