Programme de colle

Semaine 6 (du 13/10 au 17/10)

Les colles se déroulent en trois parties : une (au moins, il peut y en avoir plusieurs) question de cours tirée de la liste ci-dessous, puis un exercice imposé parmi ceux listés et enfin, si le temps le permet, un exercice au choix du colleur.

Partie 1 – Questions de cours

Thermodynamique de la transformation chimique

- Définir l'état standard puis l'état standard de référence, donner des exemples
- Justifier que l'enthalpie libre est le potentiel thermodynamique adapté pour les transformations spontanées isothermes et isobares, donner l'expression de sa différentielle
- Définir les grandeurs molaires partielles, énoncer la relation d'Euler
- Définir le potentiel chimique à l'aide de l'enthalpie libre, l'exprimer en fonction du potentiel chimique standard et de l'activité
- Définir les grandeurs de réaction puis les grandeurs standard de réaction, énoncer la loi de Hess
- Retrouver la relation entre les transferts thermiques et l'enthalpie standard de réaction dans le cas d'une transformation isobare et isotherme, commentaire.
- Enthalpie et entropie standard de réaction : cas de la formation d'un composé, lien entre les deux lors d'un changement d'état, prévision du signe
- Manipulation des grandeurs de réaction : lois de Kirchoff, approximation d'Ellingham
- Énoncer les relations donnant les dérivées par rapport à la température de $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ (relations de Kirchoff). En déduire les dérivées par rapport à la température de $\Delta_r G^\circ$ et $\frac{\Delta_r G^\circ}{T}$. Faire les commentaires qui s'imposent.

Évolution et équilibre chimique

- Établir le lien entre la création d'entropie et l'enthalpie libre de réaction lors d'une transformation d'un système physico-chimique à P et T fixées
- Donner la relation entre la constante thermodynamique d'équilibre K° et l'enthalpie libre standard de réaction, combinaison de réactions
- Énoncer la condition d'évolution d'un système physico-chimique à P et T fixées à l'aide de $\Delta_r G$ ou de Q_r et K^0
- Énoncer la relation de Van't Hoff, application à la détermination de la valeur de K° à une température quelconque
- Déterminer la composition chimique d'un système dans l'état final (équilibre $\neq$ transformation totale)
- Paramètres d'influence d'un équilibre chimique
- Optimisation d'un procédé chimique

Partie 2 – Exercices imposés

Exercice 1 Pyrométallurgie du nickel

La réaction de corrosion (ou d'oxydation) du nickel est donnée par l'équation suivante :

avec $\Delta_r G^\circ = -490 + 0,19T$ (en $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$).

1. Donner l'expression de la pression partielle en oxygène $P_{\text{O}_2,eq}$ à l'équilibre chimique de la réaction en fonction de T et de $\Delta_r G^\circ$.
2. Exprimer l'enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$ du système chimique. En déduire le sens d'évolution de la réaction.
3. À 300 K, l'application numérique donne $P_{\text{O}_2,eq} = 4 \times 10^{-76}$ bar. Quelle est l'évolution attendue pour un barreau de nickel exposé dans ces conditions à l'air ?
4. Ce phénomène n'est pas observé : proposer une explication.

Exercice 2 Synthèse de l'éthanethiol

L'éthanethiol peut être obtenu par réaction entre le sulfure de dihydrogène et d'éthène en phase gazeuse, selon :

1. Calculer l'enthalpie standard de réaction et l'entropie standard de réaction à 298 K. Commenter.
2. En déduire l'enthalpie libre standard de réaction pour toute température. Quelle hypothèse est nécessaire ?
3. Calculer la constante d'équilibre standard de la réaction à 473 K.
4. Le mélange initial contient $n(\text{C}_2\text{H}_4) = n(\text{H}_2\text{S}) = n_0$. Déterminer le taux de conversion de l'éthène en éthanethiol à 473 K et pression standard (le taux de conversion est le rapport de la quantité formée de thiol par la quantité initiale d'alcène).

Données (à 298 K) :

	$\text{C}_2\text{H}_4(\text{g})$	$\text{H}_2\text{S}(\text{g})$	$\text{C}_2\text{H}_5\text{SH}(\text{g})$
$\Delta_f H^\circ$ (kJ · mol ⁻¹)	52,4	-20,6	-37,4
S_m° (J · K ⁻¹ · mol ⁻¹)	219,3	205,8	286,0

Exercice 3 Bromation du méthane

Le bromométhane est utilisé comme nématocide et pesticide. L'équation-bilan de sa réaction de synthèse est :

1. Calculer l'enthalpie standard et l'entropie standard de cette réaction à 298 K.
2. Calculer la constante de cet équilibre à 527 °C.
3. Quelle est l'influence sur cet équilibre :
 - a) d'une diminution isotherme de pression
 - b) d'une augmentation isobare de température
 - c) de l'ajout de diazote (gaz inerte) en opérant à température et pression constantes
 - d) de l'ajout de diazote (gaz inerte) en opérant à température et volume constant d'autre part ?

Données (à 298 K) :

	$\text{Br}_2(\text{g})$	$\text{CH}_4(\text{g})$	$\text{CH}_3\text{Br}(\text{g})$	$\text{HBr}(\text{g})$
$\Delta_f H^\circ$ (kJ · mol ⁻¹)	30,9	-74,8	-37,5	-36,4
S_m° (J · K ⁻¹ · mol ⁻¹)	245,4	186,2	245,9	198,6

Partie 3 – Exercices supplémentaires

Tout exercice de chimie de MPSI (réactions acido-basiques ou de précipitation, cinétique chimique, cristallographie) ou tout exercice de thermochimie (cf TD 5 et 6).