

CCINP MP 2023

Ex 1 : Soit E un \mathbb{K} -espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ de rang un.

1. Montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que : $f^2 = \lambda f$.
2. A-t-on : $E = \text{Im}(f) \oplus \text{Ker}(f)$?
3. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :
 - i. Il existe un scalaire c non nul tel que cf soit un projecteur ;
 - ii. $f \circ f \neq 0$;
 - iii. $E = \text{Im}(f) \oplus \text{Ker}(f)$.

Ex 2 : Soit $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$.

1. Montrer que f est un endomorphisme de \mathbb{C} considéré comme un \mathbb{R} -espace vectoriel si et seulement s'il existe deux nombres complexes a, b tels que $\forall z \in \mathbb{C}, f(z) = az + b\bar{z}$.
2. Montrer l'unicité du couple (a, b) .
3. Montrer que f est un projecteur si et seulement si $a^2 + |b|^2 = a$ et $b(a + \bar{a}) = b$.
4. Montrer que f est un projecteur différent de l'endomorphisme nul et de l'identité si et seulement si $\text{Re}(a) = \frac{1}{2}$ et $|a| = |b|$.

Ex 3 : Soient E un \mathbb{K} -espace vectoriel de dimension n et $u \in \mathcal{L}(E)$.

1. Montrer que si u est nilpotent, alors $u^n = 0$.

2. Montrer qu'il existe une base \mathcal{B} de E telle que : $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & & 0 \\ 1 & 0 & (0) & \vdots \\ 0 & 1 & & \vdots \\ & & \ddots & \vdots \\ (0) & & & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

3. Déterminer les matrices X de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $X^2 = A$.

Ex 4 : On pose $A = \begin{pmatrix} 0_n & I_n & 0_n \\ 0_n & 0_n & I_n \\ 0_n & 0_n & 0_n \end{pmatrix}$

1. Calculer le polynôme caractéristique, le polynôme minimal et le rang de A
2. Soit u un endomorphisme, montrer que $\dim(\text{Ker}(u^2)) \leq 2\dim(\text{Ker}(u))$
3. Soit $B \in \mathcal{M}_{3n}(\mathbb{R})$ telle que $B^3 = 0$ et $\text{rg}(B) = 2n$
 - i. Montrer que $\text{Im}(B^2) \subset \text{Ker}(B)$
 - ii. En déduire la dimension de $\text{Im}(B^2)$
 - iii. Soit $(E_1; \dots; E_m)$ une base d'un supplémentaire de $\text{Ker}(B^2)$.

Montrer que $(B^2E_1; \dots; B^2E_m; BE_1; \dots; BE_m; E_1; \dots; E_m)$ est une famille libre

iv. Montrer que A et B sont semblables.

Ex 5 : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Soit $\omega \in \mathbb{C}$ une valeur propre de A de multiplicité $p \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\bar{\omega}$ est une valeur propre de A de multiplicité p .
 2. i. Montrer que le polynôme $X^3 - 3X - 4$ admet une unique racine réelle.
ii. On suppose que $A^3 - 3A - 4I_n = 0$. Montrer que $\det(A) \geq 0$.
 3. On suppose que $A^2 + A + I_n = 0$. Montrer que n est pair.
-

Ex 6 : Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 5 & 5 & 9 \end{pmatrix}$.

1. Donner les conditions de diagonalisabilité concernant les polynômes annulateurs et caractéristiques.
 2. Montrer que pour $B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ qui vérifie $B^2 = A$, alors B est diagonalisable.
 3. Trouver toutes les matrices B de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ qui vérifient $B^2 = A$.
-

Ex 7 :

1. Localiser les racines réelles de $X^3 - X - 1$.
 2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Déterminer $\chi_A(0)$, $\lim_{+\infty} \chi_A$ et $\lim_{-\infty} \chi_A$.
 3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $A^3 = A + I_n$. Montrer que $\det(A) > 0$.
-

Ex 8 : Soit $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Diagonaliser A .
 2. Soit $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $M^2 + M = A$.
 - i. Trouver un polynôme annulateur de A de degré 2, puis un polynôme annulateur de M de degré 4.
 - ii. Montrer que M est diagonalisable, et préciser les valeurs possibles de son spectre.
 - iii. Donner les différentes formes possibles de M .
-

Ex 9 : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vérifiant $A^2 + A^T = I_n$.

1. Justifier que, pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\text{Sp } M = \text{Sp } M^T$.
 2. Montrer que A est inversible si et seulement si $1 \notin \text{Sp } A$.
 3. Montrer que le polynôme $X^4 - 2X^2 + X$ est annulateur de A . La matrice A est-elle diagonalisable ?
-

Ex 10 : Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^{*2}$, $(M, A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^3$ telles que $A + B = I_n$, $M = \lambda A + \mu B$, $M^2 = \lambda^2 A + \mu^2 B$.

1. Déterminer $M^2 - (\lambda + \mu)M + 2\lambda\mu I_n$.
 2. Montrer que M est inversible et calculer M^{-1} .
 3. Montrer que A et B sont des matrices de projecteurs.
 4. La matrice M est-elle diagonalisable? Déterminer son spectre.
-

Ex 11 : Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $B = \begin{pmatrix} A & A \\ 0 & A \end{pmatrix}$.

1. Montrer que, pour $P \in \mathbb{R}[X]$, $P(B) = \begin{pmatrix} P(A) & AP'(A) \\ 0 & P(A) \end{pmatrix}$.
 2. Donner une condition nécessaire et suffisante sur A pour que B soit diagonalisable.
-

Ex 12 : Soit a, b, c, d, e, f des réels et

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & b & c \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & d & 1 & e \\ 0 & f & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que A est trigonalisable.
 2. Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que la matrice A soit diagonalisable.
 3. Dans ce cas, trouver une base de vecteur propres
-

Ex 13 :

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ si et seulement si $ab > 0$ ou $a = b = 0$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}$ pair et $A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_n \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & a_2 & & \vdots \\ a_1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

- i. Déterminer un espace de dimension deux stable par A .
 - ii. Montrer que A soit diagonalisable si et seulement si :
 $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_i = a_{n+1-i} = 0$ ou $a_i a_{n+1-i} > 0$.
-

Ex 14 : Soit $E = \mathbb{R}_{2n+1}[X]$. Soit $P \in E$ et on pose $f(P) = Q$, avec $Q = (X^2 - 1)P'(X) - (2n+1)XP(X)$.

1. Montrer que f est un endomorphisme de E .
 2. Donner les valeurs propres et les sous-espaces propres de f (on pourra résoudre une équation différentielle).
 3. Montrer que f est diagonalisable.
-

Ex 15 : Soit f l'application de $M_2(\mathbb{R})$ dans lui-même donnée par $f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} d & 2b \\ 2c & a \end{pmatrix}$.

1. Montrer que f est un endomorphisme.
 2. Redéfinir la base canonique de $M_2(\mathbb{R})$. Écrire la matrice de f dans cette base.
 3. Donner les éléments propres de f .
 4. L'application f est-elle inversible? Est-elle diagonalisable? Si c'est le cas, exprimer la matrice de f dans la base canonique en fonction d'une matrice diagonale.
 5. Pour n dans \mathbb{N} , exprimer f^n .
-

Ex 16 : Soit u un endomorphisme d'un \mathbb{R} -espace vectoriel E de dimension finie $n \geq 2$. On suppose que E est le seul sous-espace vectoriel stable par u non réduit à $\{0\}$.

1. Que dire du spectre de u ?
 2. Montrer que, pour tout vecteur $x \neq 0_E$, $(x, u(x), u^2(x), \dots, u^{n-1}(x))$ est une base de E . Quelle est la forme de la matrice de u dans cette base?
 3. Montrer que cette matrice ne dépend pas du vecteur x choisi.
-

Ex 17 : Soit $\phi : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto M + \text{tr}(M)I_n$.

1. Montrer que ϕ est un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
 2. Cet endomorphisme est-il diagonalisable?
 3. Trouver une base des sous-espaces propres de ϕ .
 4. Déterminer $\text{tr } \phi$ et $\det \phi$.
 5. L'endomorphisme ϕ est-il inversible? Si oui, déterminer ϕ^{-1} .
-

Ex 18 : Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et N_n l'ensemble des matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes :

- i. A est diagonalisable;
 - ii. $\forall P \in \mathbb{C}[X], P(A) \in N_n \Leftrightarrow P(A) = 0$.
-

Ex 19 : Soit E un \mathbb{K} -espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$ ainsi que deux endomorphismes u et v de E . On suppose que u et v commutent et u diagonalisable avec n valeurs propres distinctes.

1. Montrer que tous les vecteurs propres de u sont également vecteurs propres de v .
2. Montrer que v est diagonalisable dans une même base que u .

3. Montrer qu'il existe $(a_k)_{0 \leq k \leq n-1} \in \mathbb{K}^n$ telle que $v = \sum_{k=0}^{n-1} a_k u^k$.
-

Ex 20 : Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, où $a_{1,i} = a_{i,1} = 1$ pour $1 \leq i \leq n$, les autres coefficients étant nuls. On note f l'endomorphisme canoniquement associé à A .

1. Quel est le rang de A ?
2. Trouver les valeurs propres et sous-espaces propres de A .
3. Donner la matrice de la projection orthogonale de \mathbb{R}^n sur l'image de f pour la structure euclidienne canonique.

Ex 21 : On note $E = \mathbb{R}[X]$.

1. Montrer que l'on définit un produit scalaire sur E en posant $\langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(t)Q(t)dt$.
 2. Trouver a et b dans \mathbb{R} tels que $\int_0^1 (t^2 - at - b)^2 dt$ soit minimal :
 - en construisant une base orthonormée de $\mathbb{R}_1[X]$;
 - en recherchant a et b tels que $X^2 - aX - b$ soit orthogonal à $\mathbb{R}_1[X]$.
-

Ex 22 : On définit trois fonctions sur le segment $[0, 1]$: $f_0 : t \mapsto 1, f_1 : t \mapsto t$ et $f_2 : t \mapsto e^t$, et on note $E = \text{Vect}_{\mathbb{R}}(f_0, f_1, f_2)$.

1. Montrer que $(f, g) \mapsto \int_0^1 f(t)g(t)dt$ est un produit scalaire sur E .
 2. Trouver une base orthonormée de $F = \text{Vect}(f_0, f_1)$.
 3. Trouver a et b tels que la distance de f_2 à $t \mapsto at + b$ soit minimale.
-

Ex 23 : Soient $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, un espace euclidien, $v \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\forall x \in E, \|v(x)\| \leq \|x\|$.

1. Montrer que $\text{Ker}(v - \text{id}) \oplus \text{Im}(v - \text{id}) = E$.
Ind. Considérer l'application $t \mapsto \|x + ty\|^2 - \|v(x + ty)\|^2$.
 2. Soit, pour $x \in E$ et $p \in \mathbb{N}, w_p(x) = \frac{1}{p+1} \sum_{k=0}^p v^k(x)$.
Montrer que, pour tout $x \in E$, la suite $(w_p(x))$ converge. Déterminer sa limite.
-

Ex 24 : Soient u et v deux endomorphismes autoadjoints d'un espace euclidien $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$.

1. Montrer que u et v commutent si et seulement si $u \circ v$ est autoadjoint.
 2. Montrer que u et v commutent si et seulement s'il existe une base orthonormée de vecteurs propres communs à u et v .
 3. Soit s la symétrie orthogonale par rapport au plan $x + y + z = 0$. Caractériser les symétries orthogonales de \mathbb{R}^3 qui commutent avec s .
-

Ex 25 : Soit E un espace euclidien de dimension n . On note $S(E)$ l'ensemble des endomorphismes autoadjoints de E .

1. Soit $v \in S(E)$ tel que : $\forall x \in E, (v(x)|x) = 0$. Montrer que $v = 0$.
2. i. Montrer qu'un projecteur orthogonal de E est autoadjoint.
ii. Montrer qu'un projecteur de $S(E)$ est un projecteur orthogonal.
3. Soient $u_1, \dots, u_p \in S(E)$ tels que $rg(u_1) + \dots + rg(u_p) = n$ et :

$$\forall x \in E, \sum_{i=1}^p (u_i(x)|x) = (x|x).$$

- i. Montrer que $u_1 + \dots + u_p = \text{Id}_E$.
- ii. Montrer que $\text{Im}(u_1) \oplus \dots \oplus \text{Im}(u_p) = E$.

- iii. Montrer que pour tout i de $\llbracket 1, p \rrbracket$, u_i est la projection sur $\text{Im}(u_i)$ parallèlement à $\text{Im}(u_1) \oplus \dots \oplus \text{Im}(u_{i-1}) \oplus \text{Im}(u_{i+1}) \oplus \dots \oplus \text{Im}(u_p)$.
- iv. Montrer que les $\text{Im}(u_i)$ sont orthogonaux entre eux deux à deux.
-

Ex 26 : Soient E un espace euclidien et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^* \circ u = u \circ u^*$,

1. Soient $\lambda \in \text{sp } u$ et x un vecteur propre associé. Montrer que $\|u^*(x)\|^2 = \lambda^2 \|x\|^2$. Montrer que u et u^* ont les mêmes espaces propres.
 2. Montrer que u et u^* ont les mêmes espaces propres.
 3. Montrer que les espaces propres de u sont orthogonaux.
 4. Montrer que, si u est diagonalisable, alors u est symétrique.
-

Ex 27 : Soient $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien de dimension $n \geq 2$, f un endomorphisme autoadjoint de E , a sa plus petite valeur propre et b sa plus grande valeur propre.

1. Montrer que, pour tout $x \in E$, $a\|x\|^2 \leq \langle x, f(x) \rangle \leq b\|x\|^2$,
 2. Soient $k \in \mathbb{R}$ et $A = (a_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ où $a_{i,j} = k$ si $i = j$, $a_{i,j} = 1$ si $|i - j| = 1$, les autres coefficients étant nuls.
Montrer que la plus grande valeur propre b de A vérifie $k + 2 \geq b$,
-

Ex 28 : Soient E un espace euclidien, a et b deux vecteurs linéairement indépendants.

Soit $u : x \mapsto \langle a, x \rangle a + \langle b, x \rangle b$.

1. Montrer que u est un endomorphisme autoadjoint.
 2. Déterminer son noyau.
 3. Déterminer les éléments propres de u , lorsque a et b sont unitaires.
-

Ex 29 : Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace euclidien et $f \in \mathcal{L}(E)$ autoadjoint.

1. Montrer que :
 - i. $f \in S_n^+(\mathbb{R}) \iff \text{Sp}(f) \subset \mathbb{R}_+$.
 - ii. $f \in S_n^{++}(\mathbb{R}) \iff \text{Sp}(f) \subset \mathbb{R}_+^*$.
 2. Soit f symétrique positive, montrer qu'il existe un endomorphisme g autoadjoint et positif tel que $f = g^2$. Que dire si f est défini positif?
 3. Soit f défini positif et g positif, montrer que $f \circ g$ est diagonalisable.
-

Ex 30 : Soit $A = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -1 & 4 & 4 & 4 \\ 4 & 5 & -2 & -2 \\ 4 & -2 & 5 & -2 \\ 4 & -2 & -2 & 5 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $A^T A$.
2. Sans utiliser χ_A , trouver les valeurs propres de A et les multiplicités associées.
3. Calculer π_A et χ_A .
4. Trouver $P \in \mathcal{O}_4(\mathbb{R})$ telle que $P^T A P$ soit diagonale.

5. Trouver le commutant de A .

Ex 31 : $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, muni d'une norme sous-multiplicative $\|\cdot\|$, ie :
 $\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2, \|AB\| \leq \|A\|\|B\|$.

1. Soit $H \in E, \|H\| < 1$, montrer que $I_n - H$ est inversible, d'inverse $\sum_{n=0}^{\infty} H^n$
2. Montrer que $GL_n(\mathbb{R})$ est ouvert dans E
3. Soit $f : \begin{cases} GL_n(\mathbb{R}) & \rightarrow GL_n(\mathbb{R}) \\ M & \mapsto M^{-1} \end{cases}$.
 - i. Montrer que f est différentiable en I_n et que $df(I_n)(H) = -H$
 - ii. Montrer que f est différentiable en tout point de E
(on remarquera que $(M + H)^{-1} = (M(I_n + M^{-1}H))^{-1}$).

Ex 32 : On pose $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2, u_n = \sum_{k=1}^n (\ln(k))^2$

1. Montrer que $\sum u_n$ diverge.
2. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$:

$$\int_1^n (\ln(t))^2 dt \leq u_n \leq \int_2^{n+1} (\ln(t))^2 dt$$

3. Pour $x \geq 1$, calculer $\int_1^x (\ln(t))^2 dt$ et en trouver un équivalent en $+\infty$ en fonction de $x \mapsto x(\ln(x))^2$.
4. Déterminer un équivalent de $\left(\frac{1}{u_n}\right)_{n \geq 2}$ et en déduire la nature de $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{u_n}$.

Ex 33 : Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \sum_{k=1}^n (-1)^k \sqrt{k}$.

1. Montrer que : $u_{2n} = \sum_{\ell=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\ell} + \sqrt{2\ell - 1}}$.
2. En déduire que $u_{2n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\sqrt{2n}}{2}$.
3. Déterminer un équivalent simple de u_n quand n tend vers $+\infty$.
4. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $v_n = u_n + u_{n+1}$. Justifier que la série $\sum_{n \geq 1} (v_{n+1} - v_n)$ est convergente de somme strictement négative.
5. Trouver la nature de $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{u_n}$.

Ex 34 :

1. Soit $M > 0$ et $u : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ de classe \mathcal{C}^1 tel que : $\forall x \in [1, +\infty[, |u(x)| \leq M$.
Montrer que $\int_1^\infty \frac{u'(t)}{t} dt$ converge.
 2. Montrer que $\int_1^\infty \frac{\sin t}{t} dt$ et $\int_1^\infty \sin(t^2) dt$ convergent.
 3. Montrer que $\int_1^\infty \sin(t^3) dt$ converge.
-

Ex 35 : On note $I = \int_0^{+\infty} \frac{t \sin(t)}{t^2 + 1} dt$.

1. Montrer que I converge.
 2. On pose $\forall x \in \mathbb{R}, J(x) = \int_0^x \frac{t |\sin(t)|}{t^2 + 1} dt$.
Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, J(n\pi) = \sum_{k=0}^{n-1} \int_0^\pi \frac{(u + k\pi) \sin(u)}{(u + k\pi)^2 + 1} du$.
 3. I converge-t-elle absolument ?
-

Ex 36 : Soit, pour n un entier naturel non nul, $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1 + t^4)^n} dt$.

1. Montrer que I_n est défini, puis que la suite $(I_n)_{n>0}$ converge vers une limite à déterminer.
 2. Trouver une relation de récurrence entre I_n et I_{n+1} . En déduire une seconde façon de déterminer la limite de la suite $(I_n)_{n>0}$.
-

Ex 37 : Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1 + x^3)^n}$.

1. Justifier que I_n est bien définie pour tout $n \geq 1$.
 2. Montrer que $I_{n+1} = \left(1 - \frac{1}{3n}\right) I_n$.
 3. On pose $u_n = n^{1/3} I_n$. Étudier la convergence de la suite (u_n) . Ind. Poser $v_n = \ln(u_n)$.
 4. Étudier la convergence de la série $\sum I_n$.
-

Ex 38 : On pose, pour tous $n \in \mathbb{N}^*$ et $t \in [0, 1]$, $g_n(t) = e^t \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n$.

1. Montrer que : $\forall (t, n) \in [0, 1] \times \mathbb{N}^*, |g'_n(t)| \leq \frac{e^t}{n}$.
2. Montrer que : $\forall (t, n) \in [0, 1] \times \mathbb{N}^*, \left|e^{-t} - \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n\right| \leq \frac{t}{n}$.
3. Étudier la convergence simple et uniforme sur $[0, 1]$ de la suite de fonctions $(G_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par $G_n : x \in [0, 1] \mapsto \int_0^x g_n(t) dt$.

Ex 39 : Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $v_n(x) = n^x e^{-nx}$.

Soit $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} v_n(x)$.

1. Donner l'ensemble de définition de S .
 2. Montrer que S est continue sur son ensemble de définition.
 3. Donner la limite de S en $+\infty$ à l'aide du théorème de la double limite.
 4. $\sum_{n \geq 0} v_n$ converge-t-elle uniformément sur $]0, +\infty[$?
 5. S est-elle dérivable sur $]0, +\infty[$?
-

Ex 40 : Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $f_n(x) = \frac{2x}{x^2 + n^2}$.

1. Justifier la convergence simple sur \mathbb{R} de la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$. On note S la fonction somme :

$$\forall x \in \mathbb{R}, S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x).$$

2. Justifier la continuité de S sur \mathbb{R} .
 3. Démontrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} S(x) = \pi$
(on pourra considérer, pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, la fonction $t \mapsto \frac{2x}{x^2 + t^2}$).
-

Ex 41 : Soit $(a_n)_{n \geq 0}$ une suite décroissante de réels positifs qui converge vers 0, Pour tout $t \in [0, 1]$, on pose $u_n(t) = a_n(1-t)t^n$.

1. Montrer que la série de fonctions $\sum u_n$ converge simplement sur $[0, 1]$.
 2. Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que cette série converge normalement.
 3. Montrer que la série $\sum u_n$ converge uniformément sur $[0, 1]$.
-

Ex 42 : On pose $f_n(t) = \frac{(t^2 - 1)^{n+1}}{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$ et $t \in \mathbb{R}$.

1. Déterminer l'intervalle de convergence de $\sum u_n$, noté D .

2. Déterminer $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t)$ pour $t \in D$.

3. Étudier la convergence normale sur $[0, 1]$ de $\sum f_n$

4. Convergence uniforme ?

5. Soit $u_n = \int_0^1 \frac{(t^2 - 1)^{n+1}}{n+1} dt$. Montrer que $\sum u_n$ converge.

6. Calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.

Ex 43 : Pour tout $(n, x) \in \mathbb{N} \times \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, on pose $f_n(x) = \frac{1 - x^{2n+2}}{1 + x}$.

1. Étudier la convergence simple de (f_n) .
 2. Étudier la convergence uniforme de (f_n) sur son intervalle de convergence simple.
 3. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(t) dt$.
 4. Montrer que : $\forall (n, x) \in \mathbb{N} \times]-1, 1[$, $f_n(x) = \sum_{k=0}^n x^{2k} - \sum_{k=0}^n x^{2k+1}$.
 5. Montrer que $\sum \frac{(-1)^k}{k+1}$ converge et calculer sa somme à l'aide des questions précédentes.
-

Ex 44 : On considère la suite définie pour tout n par : $u_n = \int_0^1 \left(\frac{1+t^2}{2}\right)^n dt$.

1. Montrer que $(u_n)_n$ tend vers 0.
 2. Montrer que $\sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k u_k = \int_0^1 \frac{2}{3+t^2} dt$.
 3. Calculer $\int_0^1 \frac{2}{3+t^2} dt$.
-

Ex 45 : On définit pour $n \geq 1$, $f_n : t \mapsto \frac{t^{n-1} \ln(t)}{n}$ sur $I =]0, 1[$ avec la convention $f_n(0) = 0$.

1. Déterminer $\|f_n\|_{\infty, I}$.
 2. On pose $g : t \mapsto \frac{\ln(1-t) \ln(t)}{t}$ sur $J =]0, 1[$.
 - i. Montrer que g est intégrable sur J . Indication : on pourra rappeler la valeur de $\lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{\ln(t)}{t-1}$.
 - ii. Montrer que : $\int_0^1 g(t) dt = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^3}$.
-

Ex 46 :

1. Justifier l'existence de $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{t}}{e^t - 1} dt$.
 2. Montrer que $I = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$. On admet que $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.
-

Ex 47 : Pour $(p, q) \in \mathbb{N}^2$, on pose $I_{p,q} = \int_0^1 x^p \ln(x)^q dx$.

1. Montrer la convergence des intégrales $I_{p,q}$ et les calculer.
2. Montrer que $\int_0^1 e^{x \ln(x)} dx = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^n}$.

Ex 48 : Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$ et $n \in \mathbb{N}$, on pose $f_n : x \mapsto \frac{(x \ln(x))^n}{n!}$.

1. Montrer que $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement sur \mathbb{R}_+^* et calculer sa somme.
 2. Montrer que $\int_0^1 f_n(t) dt$ converge et calculer cette intégrale.
 3. Montrer que $\int_0^1 t^t dt$ converge et exprimer cette intégrale sous la forme d'une série.
-

Ex 49 : On définit la suite réelle (I_n) par : $I_0 = I_1 = 1$ et $\forall n \geq 2 \quad I_n = I_{n-1} + (n-1)I_{n-2}$.

Soit $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{I_n}{n!} x^n$.

1. Montrer que le rayon de convergence R vérifie $R \geq 1$.
 2. Donner une équation différentielle du premier ordre vérifiée par f .
 3. Donner l'expression de f , le rayon de convergence, exprimer I_n .
-

Ex 50 : On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n(t) dt$.

1. Montrer que, pour $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq I_n \leq \frac{\pi}{4}$. En déduire que le rayon de convergence de $\sum I_n x^n$ est ≥ 1 .
 2. Montrer, pour $n \in \mathbb{N}$, que $I_{n+2} + I_n = \frac{1}{n+1}$.
 3. Donner un équivalent simple de I_n .
 4. Déterminer le rayon de convergence R de $\sum I_n x^n$. Calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} I_n x^n$ pour $x \in]-R, R[$.
-

Ex 51 :

1. Étudier la convergence simple de la série entière $\sum_{n \geq 1} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) x^n$. On note D l'ensemble de convergence et $S(x)$ la somme sur D . L'application S est-elle continue sur D ?
 2. Montrer que $\sum_{n \geq 1} \left(\sin \frac{1}{\sqrt{n}} - \sin \frac{1}{\sqrt{n-1}} \right) x^n$ converge normalement sur $[-1, 1]$.
 3. En déduire la valeur de $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)S(x)$.
-

Ex 52 : Soit $h(x) = \int_0^{+\infty} e^{(-t^2 - \frac{x^2}{t^2})} dt$

1. Montrer que $t \mapsto \frac{a}{t^2} e^{-t^2 - \frac{b}{t^2}}$ est intégrable sur $]0; +\infty[$ pour $a > 0$ et $b > 0$.
2. Montrer que h est continue sur \mathbb{R} et dérivable sur \mathbb{R}_+^* .
3. Montrer que $h'(x) = -2h(x)$, en déduire une expression de h en fonction de x et de $h(0)$.

Ex 53 : Soit $f : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{\text{Arctan}(xt) - \text{Arctan}(t)}{t} dt$.

1. Montrer que f est bien définie sur \mathbb{R}^{+*} .
 2. Montrer que f est continue sur \mathbb{R}^{+*} , puis que f est de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R}^{+*} . En déduire l'expression de f' puis de f .
 3. Calculer $\int_0^{+\infty} \frac{\text{Arctan}(at) - \text{Arctan}(bt)}{t} dt$ pour $(a, b) \in (\mathbb{R}^{+*})^2$.
-

Ex 54 : On pose $G : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{t - [t]}{t(x+t)} dt$.

1. Montrer que G est bien définie pour $x > 0$.
 2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\int_0^y \frac{t - [t]}{t(n+t)} dt = \frac{1}{n} \left(\int_0^n \frac{t - [t]}{t} dt - \int_y^{y+n} \frac{t - [t]}{t} dt \right)$.
 3. On pose $H(n) = nG(n)$. Montrer que la série de terme général $H(n+1) - H(n) - \frac{1}{2n}$ converge. En déduire un équivalent de $G(n)$.
-

Ex 55 : On pose : $\forall x \in [0, +\infty[$, $F(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt$ et $G(x) = \int_0^x e^{-u^2} du$.

1. Montrer que F est \mathcal{C}^∞ sur $[0, +\infty[$ et exprimer $F'(x)$.
 2. Montrer que $G^2(x) = \frac{\pi}{4} - F(x)$.
 3. En déduire la valeur de $\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du$.
-

Ex 56 : On recherche les fonctions $x, y, z, u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe \mathcal{C}^1 vérifiant le système

$$\begin{cases} x' &= x + 2y - 2z \\ y' &= x - y + u \\ z' &= x - z + u \\ u' &= 2y - 2z + u \end{cases}.$$

On note $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ et f l'endomorphisme canoniquement associé à A .

1. Déterminer le polynôme caractéristique et le polynôme minimal de f .
2. Justifier avec un minimum de calcul que f n'est pas diagonalisable.

3. Déterminer une base de \mathbb{R}^4 dans laquelle la matrice de f vaut $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

4. Résoudre le système différentiel.
-

Ex 57 : Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tel que $f(0,0) = 0$ et $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) > \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) \right|$.

On pose : $u : x \mapsto f(x, x)$, $v : x \mapsto f(x, -x)$ et $w_x : y \mapsto f(x, y)$.

1. Calculer les dérivées de u , v et w_x .
 2. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe un unique $y_x \in \mathbb{R}$ tel que $|y_x| \leq |x|$ et $w_x(y_x) = 0$.
 3. On pose $\varphi : x \mapsto y_x$ (on suppose que φ est dérivable). Exprimer $\varphi'(x)$ en fonction des dérivées partielles de f en $(x, \varphi(x))$. Montrer que φ est de classe \mathcal{C}^1 .
-

Ex 58 : On note, pour tous réels x et y : $f(x, y) = y^2 \sin(x/y)$ si $y \neq 0$ et $f(x, 0) = 0$.

1. On pose $X_0 = (x_0, 0)$ où $x_0 \in \mathbb{R}$.
 - i. Montrer que f est continue en X_0 .
 - ii. Montrer que f est continue sur \mathbb{R}^2 .
 2. On considère $X_1 = (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$ avec $y_1 \neq 0$.
 - i. Calculer les dérivées partielles de f en X_1 .
 - ii. f est-elle différentiable en X_1 ? Si oui, donner la différentielle de f en X_1 , puis en $(0, 1)$.
 3. Calculer les dérivées partielles de f en X_0 . Si on suppose que f est différentiable en X_0 , que vaut sa différentielle?
-

Ex 59 : Soit (Ω, \mathcal{A}, P) un univers probabilisé fini.

Soit X, Y deux variables aléatoires.

Soit $(i, j) \in \{1, \dots, n+1\}^2$.

On définit $a_{i,j} = P(X = i, Y = j) = \frac{1}{2n}$ si $|i + j - (n + 2)| = 1$ et $a_{i,j} = P(X = i, Y = j) = 0$ sinon.

1. Montrer que $(a_{i,j})_{(i,j) \in \{1, \dots, n+1\}^2}$ définit une loi de probabilité de couple.
2. Expliciter A , la matrice dont les coefficients sont les $a_{i,j}$, et montrer que A est diagonalisable.
3. Donner les lois marginales de X et Y .
4. On pose $b_{i,j} = P(X = i | Y = j)$ les coefficients de la matrice B .

Exprimer B et montrer que $v = \begin{pmatrix} P(X = 1) \\ P(X = 2) \\ \dots \\ P(X = n + 1) \end{pmatrix}$ est un vecteur propre de B .

Ex 60 : Soit $n \in \mathbb{N}^*$ puis X et Y deux variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé et à valeurs dans $\llbracket 1, n + 1 \rrbracket$ dont la loi de couple est donnée par :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n + 1 \rrbracket^2, P(X = i, Y = j) = \lambda \binom{n}{i-1} \binom{n}{j-1}.$$

1. Montrer que $\lambda = \frac{1}{4^n}$.
2. Déterminer les lois marginales de X et Y . Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes?
3. Déterminer l'espérance et la variance de X .
4. Soit $B = (b_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n+1} \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$ telle que $b_{i,j} = P(X = i, Y = j)$ pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n + 1 \rrbracket^2$.
 - i. Justifier que B est diagonalisable.
 - ii. En calculant B^2 , déterminer les valeurs propres de B et donner la dimension des sous-espaces propres associés.

Ex 61 : Soit X une variable aléatoire réelle discrète à valeurs dans \mathbb{N} . On définit le taux de panne de X comme la suite (x_n) telle que : $\forall n \in \mathbb{N}, x_n = \mathbb{P}(X = n | X \geq n)$. Soit $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{N}^*$ telle que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(Y = n) = \frac{1}{n(n+1)}$.

1. Montrer que la loi de Y est bien une loi de probabilité.
 2. Soit X une variable aléatoire réelle discrète telle que $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$.
 - i. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(X \geq n) = \prod_{k=0}^{n-1} (1 - x_k)$.
 - ii. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, exprimer $\mathbb{P}(X = n)$ en fonction des x_k .
 3. Déterminer les variables aléatoires réelles discrètes ayant un taux de panne constant.
 4. Déterminer le taux de panne de Y .
-

Ex 62 : On dispose d'une urne contenant $n \in \mathbb{N}$ ($n \geq 2$) boules numérotées de 1 à n dans laquelle on effectue des tirages successifs avec remise. Soit X_n la variable aléatoire égale au rang d'obtention de la première boule différente de la première tirée.

1. Donner la loi de X_n .
 2. Justifier que X_n admet une espérance finie et la calculer.
 3. On note Y_n la variable aléatoire correspondant au rang où pour la première fois toutes les boules ont été tirées au moins une fois.
 - (a) Donner la loi de Y_2 .
 - (b) Donner la loi de Y_3 .
-

Ex 63 : Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires à valeurs dans \mathbb{N}^2 tel qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ vérifiant, $\forall (k, \ell) \in \mathbb{N}^2, \mathbf{P}(X = k, Y = \ell) = \frac{\alpha}{2^{k+\ell}}$.

1. Trouver α . Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?
 2. Calculer $G_X(t), \mathbf{E}(X), V(X)$ et $\text{cov}(X, Y)$.
 3. Calculer $\mathbf{P}(X \geq k)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$ et retrouver $\mathbf{E}(X)$.
 4. On pose $Z = \min(X, Y)$. Déterminer la loi de Z .
 5. Calculer $\mathbf{P}(X \geq Y)$.
-

Ex 64 : Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans \mathbb{N} .

1. Montrer que : $\sum_{k=1}^n kP(X = k) = \sum_{k=0}^{n-1} P(X > k) - nP(X > n)$.
2. Montrer que si la famille $(P(X > k))_{k \geq 0}$ est sommable, alors X admet une espérance finie.
3. Étude de la réciproque : montrer que si X admet une espérance finie, alors la suite $(nP(X > n))_{n \geq 1}$ converge vers 0 et que $E(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} P(X > k)$.
4. Application : on considère une urne contenant N boules identiques numérotées de 1 à N . On effectue n tirages avec remise. On note X la variable aléatoire égale au plus grand nombre tiré au cours des n tirages.

(a) Calculer $P(X \leq k)$ et en déduire la loi de X .

(b) Montrer, à l'aide d'une somme de Riemann, que la suite $\left(\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \left(\frac{k}{N}\right)^n\right)_{N \geq 1}$ admet une limite finie et la calculer.

(c) En déduire que $\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{E(X)}{N} = \frac{n}{n+1}$.

IMT 1 MP 2023

Ex 65 : Soit \mathcal{S} l'ensemble des couples $(P, Q) \in \mathbb{R}[X]^2$ tels que $(X-1)^n Q(X) + X^n P(X) = 1$.

1. Montrer l'existence et l'unicité d'un couple $(P_0, Q_0) \in \mathbb{R}_{n-1}[X]^2$ dans \mathcal{S} .
 2. Déterminer \mathcal{S} .
-

Ex 66 : Soient E un espace vectoriel et u un endomorphisme nilpotent de E . Soit $x \in E$ et $k \in \mathbb{N}$ tels que $u^k(x) \neq 0$. Montrer que $(x, u(x), \dots, u^k(x))$ est libre.

Ex 67 : Soit $n \in \mathbb{N}$, $p \in \mathbb{N}$.

Soit $A \in M_{n,p}(\mathbb{R})$, $B \in M_{p,n}(\mathbb{R})$.

Montrer que : $p + \text{rg}(I_n + AB) = n + \text{rg}(I_p + BA)$.

Ex 68 :

1. Soient $n \in \mathbb{N}^*$, u et v deux endomorphismes nilpotents non nuls de \mathbb{R}^n tels que $u \circ v = v \circ u$. Montrer que $\text{rg}(u \circ v) < \text{rg}(v)$.
 2. Montrer que la composée de n endomorphismes nilpotents de \mathbb{R}^n qui commutent deux à deux est nulle.
-

Ex 69 : Soient E un espace vectoriel de dimension finie et f un endomorphisme de E . Montrer que $\text{rg}(f) + \text{rg}(f^3) \geq 2 \text{rg}(f^2)$.

Ind. Utiliser le théorème du rang pour les restrictions de f à $\text{Im}(f)$ puis $\text{Im}(f^2)$.

Ex 70 : Soient E un \mathbb{R} -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 = -\text{id}$,

1. Montrer que $\dim(E)$ est pair.
 2. Montrer que, pour tout $x \in E$, $\text{Vect}(x, f(x))$ est stable par f .
 3. Montrer que, si $\dim(E) = 2n$, il existe des vecteurs e_1, \dots, e_n de E tels que la famille $(e_1, f(e_1), \dots, e_n, f(e_n))$ soit une base de E . Donner la matrice de f dans cette base.
-

Ex 71 : Soit $A \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$. On suppose que AB est semblable à la matrice diagonale $\text{diag}(0, 9, 9)$. Calculer le rang de BA et déterminer BA .

Ex 72 : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 = A$.

1. Montrer que A est diagonalisable.
 2. On suppose que $\text{rg}(A) = \text{tr}(A)$. Montrer que A est la matrice d'une projection.
-

Ex 73 : Soit $\Phi : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto \text{tr}(M)A - M^T$.

1. L'application Φ est-elle un automorphisme ?
 2. L'application Φ est-elle diagonalisable ? Donner les valeurs propres et les sous-espaces propres associés.
-

Ex 74 : Soient E un \mathbb{K} -espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$.

On pose $\Phi_u : v \in \mathcal{L}(E) \mapsto u \circ v \in \mathcal{L}(E)$.

1. Quels sont les éléments propres de ϕ_u ?
 2. Montrer que ϕ_u est diagonalisable si et seulement si u est diagonalisable.
-

Ex 75 : Soit $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ pour laquelle qu'il existe $n \geq 1$ telle que $M^n = I_2$. Montrer que $M^{12} = I_2$.

Ex 76 : Soient $a, b, c \in \mathbb{R}^{+*}$ et $M = \begin{pmatrix} 1 & \frac{b}{c} & \frac{c}{a} \\ \frac{a}{b} & 1 & \frac{a}{c} \\ \frac{a}{c} & \frac{b}{a} & 1 \end{pmatrix}$. Déterminer les valeurs propres et les espaces propres de M .

Ex 77 : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = -I_n$, montrer que $\det A = 1$.

Ex 78 : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ A & A \end{pmatrix}$.

1. Comparer le spectre de A et celui de M .
 2. Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, exprimer $P(M)$ en fonction de $P(A)$.
 3. Conclure en donnant une condition nécessaire et suffisante portant sur A quant à la diagonalisabilité de M .
-

Ex 79 :

1. Soient $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
Montrer que $\det(AB - I_n) = \det(BA - I_n)$.
2. Généraliser le résultat avec A non inversible.
On pourra considérer la suite $A_p = A - \frac{1}{p}I_n$.

Ex 80 : Soit $n \geq 3$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que A contient que des 1 sur sa première ligne, première colonne, sur sa diagonale et que des 0 ailleurs.

Montrer que 1 est valeur propre, donner son sous-espace propre. En déduire les autres valeurs propres.

Ex 81 : On note $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Soit X tel que $X^2 = A$.

1. Montrer que X est triangulaire supérieure.
 2. Donner tous les X .
-

Ex 82 : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $4A^3 + 4A^2 + A = 0$. Étudier la convergence et la limite éventuelle de la suite $(A^k)_{k \in \mathbb{N}}$.

Ex 83 : Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $B = A^3 + A + I_n$.

1. On suppose que A est diagonalisable, à valeurs propres réelles. Montrer que A est un polynôme en B .
 2. Est-ce encore vrai si les valeurs propres de A sont complexes ?
-

Ex 84 :

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 + A + I_n = 0$. Montrer que n est pair.
 2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 + A^2 + A = 0$. Montrer que $\text{rg}(A)$ est pair.
-

Ex 85 : Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ et admet une unique valeur propre réelle a . Montrer que $a > 1$.
 2. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $\sum_{\lambda \in \text{Sp}(A)} \lambda^n$ est un entier.
 3. Montrer que $\sum_{n \geq 0} \sin(\pi a^n)$ converge.
-

Ex 86 : Soit E l'espace des fonctions C^1 sur \mathbb{R} telles que $f(0) = 0$. Soit $f \in E$, on définit T l'application telle que $\forall x \in \mathbb{R}$, $T(f)(x) = \int_0^x \frac{f(t)}{t} dt$. Montrer que T est un endomorphisme de E , puis déterminer ses éléments propres.

Ex 87 : Soit E un espace euclidien ; soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et $u = f^* \circ f$.

1. Montrer que u est diagonalisable et que ses valeurs propres sont dans \mathbb{R}_+ .
 2. Montrer que $\text{Ker } u = \text{Ker } f$ et $\text{Im } u = \text{Im } f^*$.
-

Ex 88 : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ symétrique telle que $A^{2023} = A^{2024}$.

1. Montrer que $\sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j}^2 = \text{rg}(A)$.
 2. Le résultat reste-t-il vrai si A est seulement diagonalisable ?
-

Ex 89 : On pose $E = \mathcal{C}^\infty([0; 1])$ que l'on muni de $\|\cdot\|_\infty$. On pose $\forall f \in E$, $u(f)(x) = \int_0^1 \inf(x, t)f(t) dt$. Montrer que u est un endomorphisme continu de E et calculer $\|u\|$.

Ex 90 : On note E l'ensemble des fonctions $f \in \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ telles que $f(0) = 0$. Pour $f \in E$, on pose $N(f) = \|f + f'\|_\infty$ et $N'(f) = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$.

1. Montrer que N et N' sont des normes sur E .
 2. Montrer que N et N' sont équivalentes. Ind. Exprimer f en fonction de $g = f + f'$.
-

Ex 91 : Soit N définie sur $\mathbb{R}[X]$ par $N\left(\sum_{i=0}^n a_i X^i\right) = \max_{0 \leq i \leq n} |a_i|$.

1. Montrer que N est une norme.
 2. Soient $a \in \mathbb{R}$ et $\phi : P \in \mathbb{R}[X] \mapsto P(a)$. Pour quelles valeur de a , l'application ϕ est-elle continue pour la norme N ?
-

Ex 92 : Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\begin{array}{cc} \cos\left(\frac{a}{n}\right) & \sin\left(\frac{b}{n}\right) \\ \sin\left(\frac{b}{n}\right) & \cos\left(\frac{a}{n}\right) \end{array} \right)^n$.

Ex 93 : Soient E un espace euclidien et \mathcal{K} l'ensemble des projecteurs orthogonaux de E . Soit p un projecteur.

1. Montrer que : $p \in \mathcal{K} \Leftrightarrow \forall x \in E, \|p(x)\| \leq \|x\|$.
 2. Montrer que \mathcal{K} est un compact.
-

Ex 94 : Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel normé de dimension finie. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ une suite telle que, pour tout vecteur $x \in E$, la suite $(\|x - u_n\|)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

1. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ a une valeur d'adhérence.
2. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

Ex 95 : On définit, pour x réel, $f(x) = [x] + (x - [x])^2$.

1. Discuter la continuité de f .
 2. Tracer le graphe de f .
 3. On définit la suite (x_n) par $x_0 \in \mathbb{R}$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = f(x_n)$. Étudier la monotonie et la convergence de (x_n) .
-

Ex 96 : On définit la suite (u_n) par $u_0 \in]0, \frac{\pi}{2}]$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sin(u_n)$.

1. Montrer que (u_n) converge vers 0.
 2. Déterminer $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $(u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha)$ converge vers une limite non nulle.
 3. Déterminer un équivalent de u_n . Quelle est la nature de $\sum u_n$?
-

Ex 97 : On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{(-1)^{k-1}}{\sqrt{k}}\right)$. Donner un équivalent de u_n lorsque n tend vers $+\infty$. Quelle est la nature de la série $\sum u_n$?

Ex 98 : On pose, pour $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$: $u_n = \sum_{k=2}^n \frac{\ln k}{k}$.

1. Montrer que $u_n \sim \frac{1}{2} \ln^2 n$. On note v_n cette dernière quantité.
 2. Donner un équivalent de $u_n - v_n$.
-

Ex 99 : Justifier la convergence de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \left(1 - t \operatorname{Arctan} \left(\frac{1}{t}\right)\right) dt$ puis calculer sa valeur.

Ex 100 : Soit $I = \int_0^1 \frac{t-1}{\ln(t)} dt$.

1. Étude de la convergence de I .
 2. Calcul de I .
-

Ex 101 : Calculer : $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \alpha \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha+1}}$.

Ex 102 : Montrer que $\int_0^1 \frac{du}{1+u^4} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{1+4k}$.

Ex 103 : $\int_{1/2}^{3/2} \frac{dx}{x^n + (1-x)^n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\pi 2^n}{4 n}$.

On pourra utiliser le changement de variable $x = \frac{1}{2}(1 + \frac{t}{n})$.

Ex 104 : On pose $u_n(x) = \text{Arctan}(\sqrt{n+x}) - \text{Arctan}(\sqrt{n})$ et $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x)$.

- i. Étudier la convergence simple, puis la convergence normale de S .
 - ii. Montrer que S est de classe \mathcal{C}^∞ et calculer S' .
-

Ex 105 : Soit, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = (-1)^n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)^n dx$. Étudier la convergence de $\sum u_n$. Calculer sa somme.

Ex 106 : Montrer l'existence de $\int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{1+n^2 t^2} dt$ et en donner la valeur.

Ex 107 : On pose $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n^{(-1)^n} x^n$.

1. Donner le rayon de convergence de f .
 2. Calculer f .
-

Ex 108 : Soit $r > 0$. On note $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$a_n = \begin{cases} r^{\sqrt{n}} & \text{si } n \text{ est un carré} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Donner le rayon de convergence de $\sum a_n x^n$.

Ex 109 : Soit $q \in]-1, 1[$.

1. Montrer qu'il existe une unique fonction f continue en 0 telle que $f(0) = 1$ et :
 $\forall x \in]-1, 1[, f(x) = \frac{1+x}{1-x} f(qx)$.
 2. Cette fonction est-elle décomposable en série entière et si oui, quel est son rayon de convergence ?
-

Ex 110 : On pose $F(x) = \int_0^\infty \ln t e^{-xt} dt$.

1. Déterminer le domaine de définition de F .
2. Montrer que F est de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R}_+^* .

3. Déterminer une équation différentielle dont F est solution sur \mathbb{R}_+^* , puis résoudre cette équation différentielle.
-

Ex 111 : Soit $F : t \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{\text{Arctan}(xt)}{x(1+x^2)} dx$. Montrer que F est continue sur \mathbb{R} , puis de classe \mathcal{C}^1 . En déduire F .

Ex 112 : Soit $F : x \mapsto \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t)^x dt$,

1. Montrer que F est de classe C^∞ sur $] -1, +\infty[$.
 2. Montrer que $F(n+2) = \frac{n+1}{n+2} F(n)$. Calculer $(n+1)F(n)F(n+1)$.
 3. Donner un équivalent de $F(x)$ quand x tend vers $+\infty$.
-

Ex 113 : Trouver toutes les fonctions f continues sur \mathbb{R} telles que :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x) = \int_{x-y}^{x+y} f(t) dt$$

Ex 114 :

1. Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) + f'(x) = e^{-x}$. Montrer que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.
 2. Plus généralement, montrer que si $f(x) + f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$, alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.
-

Ex 115 : On se place dans $A = \{1, \dots, n\}$. On choisit F et G deux parties de A de manière équiprobable et indépendante. Soit $i \in A$.

1. Montrer que $P(i \in F) = \frac{1}{2}$.
 2. Montrer que les événements $(i \in F)$ et $(j \in G)$ sont indépendants pour $j \neq i$.
-

Ex 116 : Soit $a \in]1, +\infty[$ et on pose $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^a}$.

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans \mathbb{N}^* telle que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, P(X = n) = \frac{1}{\zeta(a)n^a}$.

1. Montrer que X définit bien une variable aléatoire discrète.
 2. Est-ce que X admet une espérance ? Si oui, la calculer.
 3. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. On pose $A_k = \{kp, p \in \mathbb{N}^*\}$. Calculer $P(X \in A_k)$.
 4. À quelle condition $(X \in A_i)$ et $(X \in A_j)$ sont indépendants, pour i, j dans \mathbb{N}^* ?
-

Ex 117 : Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant des lois géométriques de paramètres respectifs p et q . On note $Z = \frac{X}{Y}$.

1. Montrer que $Z \leq X$. Montrer que Z admet une espérance et une variance. Calculer $\mathbf{E}(Z)$
 2. Donner la loi de Z .
-

Ex 118 : Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires à valeurs dans \mathbb{N}^2 dont la loi est donnée par :

$$\forall (j, k) \in \mathbb{N}^2, P((X, Y) = (j, k)) = \frac{(j+k) \left(\frac{1}{2}\right)^{j+k}}{e^j k!}.$$

1. Déterminer les lois marginales de X et de Y . Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?
 2. Prouver que $E[2^{X+Y}]$ existe et la calculer.
-

Ex 119 : On possède une urne contenant n boules numérotées de 1 à n . On réalise deux tirages successifs sans remise. On note X la variable aléatoire correspondant au numéro de la première boule tirée et Y celle correspondant au numéro de la seconde.

1. Donner la loi de X .
 2. Donner la loi de Y .
 3. Calculer $V(X)$, $V(Y)$ et $V(X+Y)$.
-

Ex 120 :

1. On note l^2 l'ensemble des suites réelles (p_i) telles que la série de terme générale p_i^2 converge. Montrer que l^2 est un espace vectoriel et que l'application :

$$\forall (p_i), (q_i) \in l^2, \langle p_i, q_i \rangle = \sum_{i=0}^{+\infty} p_i q_i \text{ est un produit scalaire.}$$

2. Soit X une variable aléatoire à valeur dans \mathbb{N} , admettant un moment d'ordre 2. On note $\forall i \in \mathbb{N}$, $p_i = P(X = i)$ et $p_{-1} = 0$.

$$\text{On note } I(X) = \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{(p_i - p_{i-1})^2}{p_i}$$

- i. Montrer que $I(X) \geq \frac{1}{V(X)}$
 - ii. Enfin montrer que $I(X) = \frac{1}{V(X)}$
-

Ex 121 : Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes telles que $X \sim \mathcal{G}\left(\frac{1}{3}\right)$ et $Y \sim \mathcal{G}\left(\frac{2}{3}\right)$.
Loi de $Z = X + Y$?

IMT 2 MP 2023

Ex 122 : Soit E un \mathbb{K} -espace vectoriel tel que $f \circ f = f$.

1. Montrer que $\text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(f) = E$. Interpréter géométriquement.
2. Si E est de dimension finie, que dire de la matrice dans une base bien choisie ?

3. Donner un exemple d'un endomorphisme f de E tel que $\text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(f) = E$.

Ex 123 : Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^4)$ telle que $f \circ f = 0$. Montrer que $\text{rg}(f) \leq 2$.

Ex 124 : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle qu'il existe p dans \mathbb{N}^* vérifiant $A^p = 0$.

1. Montrer que $A^n = 0$.
 2. Calculer $\det(I_n + A)$.
 3. Montrer que $C(A) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), AM = MA\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
 4. Soit $M \in C(A) \cap GL_n(\mathbb{C})$. Calculer $\det(A + M)$.
 5. Montrer que $GL_n(\mathbb{C})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. En déduire de cette preuve que le résultat de la question précédente reste vrai si on a seulement M dans $C(A)$.
 6. Que permettent de dire les matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ par rapport à l'exercice ?
-

Ex 125 : Soit E un espace vectoriel avec $\dim E = n \geq 1$.

1. Soit u un endomorphisme nilpotent, montrer que : $u^n = 0$.
2. Trouver une base \mathcal{B} de E tel que :

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. Chercher des X tels que : $A = X^2$
-

Ex 126 : Calculer $\Delta_n(x) = \begin{pmatrix} 1+x^2 & -x & & & 0 \\ -x & \ddots & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & -x \\ 0 & & & -x & 1+x^2 \end{pmatrix}$.

Ex 127 : Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Montrer que : $A^2 = -I_n \implies \det A = 1$.

Ex 128 : La matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est-elle inversible ? Déterminer A^n pour tout $n \in \mathbb{Z}$.

Ex 129 : Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $Sp(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$ avec les λ_k deux à deux distincts et

$$P = \prod_{k=1}^p (X - \lambda_k).$$

1. Donner une condition nécessaire et suffisante sur P pour que u soit diagonalisable. Prouver le.
 2. Existe-t-il dans \mathbb{R}^7 un endomorphisme u tel que $(X - 1)(X^2 + 1)$ annule u et $tr(u) = 0$?
Soit u un endomorphisme de \mathbb{R}^7 tel que $(X - 1)(X^2 + 1)$ annule u . Déterminer $\det(u)$.
-

Ex 130 : Soient $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

1. La matrice A est-elle diagonalisable?
 2. On veut montrer qu'il n'existe pas de matrice B telle que $B^2 = A$. On suppose l'existence d'une telle matrice. Trouver un polynôme annulateur simple de B . Conclure.
 3. Montrer que A est semblable à C .
-

Ex 131 : Soient u et v deux endomorphismes de E qui commutent.

1. Démontrer que les sous-espaces propres de u sont stables par v .

2. Soit $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ la matrice associée à l'endomorphisme u . Combien y a-t-il de droites vectorielles stables par u ?

Ex 132 : Soit E un espace vectoriel sur \mathbb{R} de dimension $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ ayant n valeurs propres distinctes et $g \in \mathcal{L}(E)$ vérifiant $f \circ g = g \circ f$.

1. Montrer que f est diagonalisable.
 2. Soit (e_1, \dots, e_n) une base de vecteurs propres pour f . Montrer que les e_i sont aussi vecteurs propres de g .
On note μ_1, \dots, μ_n les valeurs propres associées.
 3. Les μ_i sont-ils forcément deux à deux distincts?
 4. L'endomorphisme g est-il forcément diagonalisable?
-

Ex 133 : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On définit f sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ par : $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), f(M) = \text{Tr}(M)A + \text{Tr}(A)M$.

1. Montrer que f est un endomorphisme.
 2. f est-il diagonalisable?
-

Ex 134 : Soient E un \mathbb{C} -espace vectoriel, $u \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisable, $e = (e_1, \dots, e_n)$ une base de vecteur propre.

1. Montrer que $\chi_u(u) = 0$ sans utiliser le théorème de Cayley-Hamilton.

2. On écrit $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. Calculer $\det_e(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$.

Ex 135 :

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. La matrice A admet-elle toujours une valeur propre ?
 2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $A^2 + A + I_n = 0$. Que dire du spectre réel de A ? du spectre complexe ?
-

Ex 136 :

1. Soient E un \mathbb{R} -espace vectoriel de dimension finie et u un endomorphisme de E . On note $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ ses valeurs propres distinctes et $P = \prod_{k=1}^p (X - \lambda_k)$.
Donner une condition nécessaire et suffisante portant sur P pour que u soit diagonalisable et la démontrer.
 2. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^7)$. Est-il possible d'avoir simultanément $Q = (X - 1)(X^2 + 1)$ annulateur de f et $\text{Tr}(f) = 0$?
 3. Soit $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^7)$ tel que $Q(g) = 0$. Calculer $\det(g)$.
-

Ex 137 : Soit $A \in \mathbb{R}_n[X] \setminus \{0\}$.

1. Montrer que l'application $f : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_n[X]$ qui à tout polynôme P associe le reste de la division euclidienne de P par A est un projecteur. Donner son noyau et son image.
 2. On munit $\mathbb{R}_n[X]$ du produit scalaire : $\langle P, Q \rangle = \int_0^1 PQ$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que f soit un projecteur orthogonal.
-

Ex 138 : On considère le plan de \mathbb{R}^3 d'équation $x + 2y - 3z = 0$.

Trouver la matrice dans la base canonique de la projection orthogonale sur ce plan.

Ex 139 :

1. Rappeler le théorème spectral.
 2. On munit $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ du produit scalaire usuel. Soit $A \in S_n(\mathbb{R})$. Montrer que les sous-espaces propres de A sont deux à deux orthogonaux.
 3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et on suppose que $(A + A^T)$ est nilpotente. Montrer que A est antisymétrique.
-

Ex 140 : On pose $E = \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$. Pour $(f, g) \in E^2$, on pose $\langle f, g \rangle = \int_0^1 (fg + f'g')$.

1. Montrer que \langle, \rangle est un produit scalaire.
Soient $V = \{f \in E, f(0) = f(1) = 0\}$ et $W = \{f \in E, f'' = f\}$.
2. Montrer que V et W sont des sous-espaces vectoriels puis que $\{t \mapsto e^t, t \mapsto e^{-t}\}$ est une base de W .
3. Montrer que V et W sont orthogonaux.
4. Calculer $p_W(f)$ le projeté orthogonal de $f \in E$ sur W .
5. Montrer que V et W sont supplémentaires.

Ex 141 : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 = -A$.

1. Montrer que $\text{rg}(A)$ est pair.
 2. Que dire si $A = A^T$?
-

Ex 142 : Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. Trouver une base orthonormale de diagonalisation de A .

Ex 143 : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 + A^T = I_n$.

1. Trouver $P \in \mathbb{R}_4[X]$ tel que $P(A) = 0$. Que dire sur A et $\text{Sp}(A)$?
 2. On suppose, pour cette question seulement, que $0 \notin \text{Sp}(A)$. Montrer que $A - I_n \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ et que $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.
 3. On prend $n = 3$. Montrer que $\text{tr}(A) \neq 0$.
-

Ex 144 : Soit la matrice : $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

Pour quels réels a la suite $(a^n A^n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge-t-elle vers une limite non-nulle ?

Ex 145 : Soit E un espace de dimension finie.

Soit $\varphi \in \mathcal{L}(E)$.

1. Rappeler la définition de $\exp(\varphi)$ et montrer son existence.
 2. On suppose que $\varphi^2 = \text{Id}_E$. Exprimer $\exp(\varphi)$.
-

Ex 146 : Montrer la convergence des suites $(x_n), (y_n), (z_n)$ définies par leurs premiers termes respectifs x_0, y_0, z_0 et les relations, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{y_n}{4} + \frac{z_n}{4}, y_{n+1} = \frac{x_n}{4} + \frac{y_n}{2} + \frac{z_n}{4}, z_{n+1} = \frac{x_n}{4} + \frac{y_n}{4} + \frac{z_n}{2}.$$

Ex 147 : Étudier la convergence de $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^{2\alpha} + (-1)^n}}$

Ex 148 : Nature de la série $\sum \cos(\pi\sqrt{n^2 + n + 1})$?

Ex 149 : Nature de la série $\sum \cos\left(n^2\pi \ln\left(\frac{n-1}{n}\right)\right)$?

Ex 150 :

1. Rappeler le théorème spécial des séries alternées. Que peut-on dire du reste ?
 2. Étudier la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$, avec α dans \mathbb{R} .
 3. Comment peut-on donner une valeur à 10^{-3} près de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^3}$?
 4. Étudier la convergence de $\sum_{n \geq 1} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \right)$, avec α dans \mathbb{R}_+^* .
-

Ex 151 : On pose $u_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin(t)}{t} dt$, $v_n = (-1)^n u_n$, $w_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \left(\frac{\sin(t)}{t} \right)^2 dt$, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

1. Justifier l'existence de u_0 et w_0 .
 2. Déterminer les limites de (u_n) et de (w_n) .
 3. Nature de $\sum u_n$, $\sum v_n$ et $\sum w_n$?
-

Ex 152 : Soit $f : x \in \left[-1/3, +\infty\right[\mapsto \int_x^{3x} \frac{dt}{\sqrt{1+t^3}}$. Étudier f et donner son graphe.

Ex 153 : Soit $f : x \mapsto \int_0^{x^2} \frac{\ln(1+t)}{t} dt$.

1. Montrer que f est dérivable sur $]0, 1[$ et exprimer sa dérivée.
 2. Montrer que f est continue sur $[0, 1]$ et dérivable sur $[0, 1[$. Est-elle dérivable en 1 ? Pourquoi ?
 3. Donner un développement limité à l'ordre 2 de f en 0 .
-

Ex 154 : Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $\phi(x) = \int_0^x \frac{du}{3 + \cos^2 u}$. Calculer $\phi(x)$.

Ind. Utiliser le changement de variable $v = \tan u$.

Ex 155 : Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{n+x}} dx$.

1. Justifier que l'intégrale généralisée I_n est convergente.
 2. Justifier que la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone et en déduire qu'elle converge.
 3. Déterminer $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $(n^\alpha I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une limite non nulle.
 4. Préciser la nature des séries $\sum_{n \geq 0} I_n$ et $\sum_{n \geq 0} (-1)^n I_n$.
-

Ex 156 : On considère la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ de fonctions définies sur \mathbb{R} par $u_0 = \text{id}$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sin \circ u_n + u_n$.

1. Étudier la convergence simple de (u_n) .
 2. La convergence est-elle uniforme ?
-

Ex 157 : Soit $f : x \in \mathbb{R}^{+*} \mapsto \frac{\sin(x^3)}{x\sqrt{x}}$.

1. Montrer que f admet un prolongement \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R}^+ .
 2. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $f_n : x \in \mathbb{R}^{+*} \mapsto f\left(\frac{n}{x}\right) f(xn)$. Montrer que $\sum f_n$ converge normalement sur \mathbb{R}^{+*} .
-

Ex 158 : Soit $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{-nx}}{1+n^2}$.

1. Montrer que f est définie sur \mathbb{R}^+ et de classe C^∞ sur \mathbb{R}^{+*} .
 2. Montrer que : $\forall x \in [0, 1], 1 - e^{-x} \geq \left(1 - \frac{1}{e}\right)x$.
 3. La fonction f est-elle dérivable en 0 ? Quelle est sa limite en $+\infty$?
 4. Dresser le tableau de variation de f .
-

Ex 159 : Soit $\alpha \in]-1; 1[$; pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $w_n(x) = \frac{\alpha^n}{n} \cos nx$. Soit $W : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} w_n(x)$

1. Montrer que W est de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R} ; exprimer W' à l'aide des fonctions usuelles.
 2. Calculer $\int_{-\pi}^{\pi} \ln(1 - 2\alpha \cos(x) + \alpha^2) dx$.
-

Ex 160 : Pour $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$, et $x \in \mathbb{R}$, on pose $f_n(x) = \frac{xe^{-nx}}{\sqrt{\ln(n)}}$.

1. Déterminer le domaine de convergence simple D de

$$\sum_{n \geq 2} f_n(x).$$

On note f sa somme et $\forall n \geq 2, \forall x \in \mathbb{R}_+$,

$$R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x).$$

2. Montrer que $\forall n \geq 2, \forall x > 0$,

$$0 \leq R_n(x) \leq \frac{1}{\sqrt{\ln(n+1)}} \frac{x}{e^x - 1}$$

3. Montrer que la fonction $g : x \mapsto \begin{cases} \frac{x}{e^x - 1} & \text{si } x > 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ est bornée sur \mathbb{R}_+ .

4. Montrer que f est continue sur \mathbb{R}_+ et donner sa limite en $+\infty$.

5. Montrer que f est \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R}_+^* .

6. f est-elle dérivable en 0 ?

Ex 161 : Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{x}{e^{2x} - e^{-x}} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(3n+2)^2}$

Ex 162 : On pose $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(nt)}{1+n^4 t^3} dt$ pour $n \geq 1$

1. Montrer que I_n est bien définie.

2. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

3. Nature de la série $\sum I_n$?

Ex 163 : On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{2n}(x) dx$

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_{n+1} + I_n = \frac{1}{2n+1}$.

2. Donner un équivalent simple de I_n .

3. Nature et somme éventuelle de $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2n+1}$?

Ex 164 : Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} n^{(-1)^n} x^n$ et calculer sa somme.

Ex 165 : Soit la fonction f définie par : $f(x) = \frac{1}{(1+x)(2-x)}$.

1. f est-elle développable en série entière au voisinage de 0 ?

Si oui, expliciter ce développement et donner son domaine d'existence.

2. Donner le développement limité de f à l'ordre 3 au voisinage de 0.

Ex 166 : Calculer, pour $x \in \mathbb{R}$, $\phi(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} \cos(tx) dt$ par deux méthodes :

i. à l'aide d'un développement en série entière de la fonction cosinus ;

ii. à l'aide d'une équation différentielle d'ordre 1.

Ex 167 : On considère $f : t \mapsto \int_0^1 \frac{x^t}{\sqrt{1-x^2}} dx$

1. Donner l'ensemble de définition de f noté D .

2. Montrer que f est continue sur $[0; +\infty[$.

3. Trouver une relation entre $f(t)$ et $f(t-2)$ en supposant que t et $t-2$ sont dans D .

Ex 168 : Soient $I = \int_0^{+\infty} \frac{\tanh(3x) - \tanh(2x)}{x} dx$ et $F(t) = \int_0^{+\infty} \frac{\tanh(x) - \tanh(tx)}{x} dx$

1. Montrer que I est bien définie.
 2. Montrer que F est de classe \mathcal{C}^1 sur $[2, 3]$.
-

Ex 169 : Soit $F : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^t - e^{-2t}}{t} \cos(xt) dt$.

1. Donner le domaine de définition de F .
 2. Montrer que F est de classe \mathcal{C}^1
 3. Exprimer F à l'aide de fonctions usuelles.
-

Ex 170 : On considère $f : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos(tx)}{t^2} e^{-t} dt$.

1. Donner le domaine de définition de f .
 2. Montrer que f est de classe \mathcal{C}^2 sur \mathbb{R} .
 3. Exprimer f'' .
 4. En déduire des expressions de f' et f avec des fonctions usuelles.
-

Ex 171 : On pose $f : x \mapsto \int_0^{+\infty} e^{-xt} \sqrt{t} dt$.

1. Trouver une équation différentielle du premier ordre vérifiée par f .
 2. Expliciter f .
-

Ex 172 : Soit $I = \int_0^1 \frac{\text{Arctan}(t^2)}{t} dt$

1. Montrer que I est bien définie.
 2. Montrer que $I = -2 \int_0^1 \frac{t \ln(t)}{1+t^4} dt$
 3. Calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$.
-

Ex 173 : On recherche les fonctions continues $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant (1) :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) + \int_0^x (x-t)f(t)dt = 1+x.$$

1. Trouver toutes les solutions de (1) développables en série entière au voisinage de 0 .
2. Montrer que, si f vérifie (1), alors elle est de classe \mathcal{C}^2 et vérifie (E) : $y'' + y = 0$.
3. Résoudre (E).

4. Trouver toutes les solutions de (1).

Ex 174 : Soit (1) l'équation différentielle $xy' + y = e^x$.

1. Trouver les solutions de (1) développables en série entière au voisinage de 0 .
 2. Les solutions de (1) sur $]0, +\infty[$ sont-elles toutes développables en série entière au voisinage de 0 ?
 3. Résoudre (1) sur un intervalle I de \mathbb{R} . Discuter suivant I .
 4. On ajoute à l'équation (1) la condition $y(x_0) = y_0$ (avec $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$) pour obtenir un problème numéroté (2). Que dit le théorème de Cauchy à propos du problème (2) si on travaille sur $]0, +\infty[$? Résoudre (2).
 5. Représenter graphiquement la ou les solutions développables en série entière.
-

Ex 175 :

1. Énoncer le théorème de Cayley-Hamilton.
 2. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$. Déterminer χ_A .
 3. Calculer A^n .
 4. Résoudre le système différentiel : $\begin{cases} x' = x + y \\ y' = -2x + 4y \end{cases}$.
-

Ex 176 : Soit $A = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

1. La matrice A est-elle diagonalisable ?
2. Calculer les valeurs propres de A .
3. On pose l'application

$$W : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \\ t \mapsto W(t) \end{cases}$$

telle que $W' = AW$.

Exprimer W en fonction de t et de d'autres paramètres que l'on précisera.

Ex 177 : Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant la même loi géométrique de paramètre $p \in]0, 1]$. Soient $I = \min(X, Y)$, $M = \max(X, Y)$ et $D = M - I$.

1. Montrer que $P(X = Y) = \sum_{k=1}^{+\infty} P(X = k)^2$.
 2. Montrer que I et D sont indépendantes.
-

Ex 178 : Soit $n \in \mathbb{N}$ et X et Y deux variables aléatoires discrètes. On suppose que X suit une loi binomiale de paramètres n et p ; et que, pour tout $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, la loi de Y conditionnée à $X = i$

est la loi binomiale de paramètres $n - i$ et p .

Montrer que $Z = X + Y$ suit une loi binomiale et déterminer ses paramètres.

Ex 179 : Soit X une variable aléatoire suivant la loi binomiale de paramètres n et p . Calculer l'espérance de X de trois manières différentes :

1. directement à partir de la loi de X ;
 2. en utilisant la fonction génératrice de X ;
 3. sans calcul, en interprétant la loi de X .
-

Ex 180 : Soient I un intervalle de \mathbb{R} , $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et convexe. Soit X une variable aléatoire à valeurs dans I admettant une espérance. On suppose que $f(X)$ admet une espérance. Montrer que l'on a $f(\mathbf{E}(X)) \leq \mathbf{E}(f(X))$.

Ex 181 : Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes. On pose $S = X + Y$.

1. Donner G_S en fonction de G_X et de G_Y .
2. On suppose que $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ et $Y \sim \mathcal{B}(m, p)$. Loi de S ?
3. On suppose que $X \sim \mathcal{P}(\lambda_1)$ et $Y \sim \mathcal{P}(\lambda_2)$. Loi de S ?

ENSEA MP 2023

Ex 182 : Factoriser dans $\mathbb{R}[X]$: $P = X^6 + 1$.

Ex 183 : Factoriser dans \mathbb{C} les polynômes $X^2 + X + 1$ et $X^2 - X + 1$.
Montrer que $X^2 - X + 1$ divise $(X - 1)^{n+2} + X^{2n+1}$.

Ex 184 : $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Soient $n, k \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que : $A^k = I_n$.

1. Montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
 2. Donner un exemple d'une matrice M de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $M^4 = I_3$ et qui ne soit pas diagonalisable sur $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. Réduire cette matrice dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.
 3. Quelles sont les matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $A^k = I_n$ diagonalisables sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$?
-

Ex 185 : Déterminer les valeurs propres de la matrice $M = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \vdots \\ 1 & \cdots & \cdots & 1 \end{pmatrix}$.

Ex 186 : Soit $n \in \mathbb{N}$ et on note $\varphi_n : \begin{cases} \mathbb{R}_n[X] & \rightarrow \mathbb{R}_n[X] \\ P & \mapsto (X-1)^2 P' - nXP \end{cases}$

1. Montrer que φ_n est bien un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.
 2. Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de φ_n .
-

Ex 187 : Soit E un espace euclidien de dimension $d > 0$. Soient a et b deux vecteurs unitaires et linéairement indépendants de E .

Soit u l'endomorphisme de E défini par $u(x) = (a|x)a + (b|x)b$ pour tout x .

1. Montrer que u est un endomorphisme autoadjoint.
 2. Déterminer $\text{Ker}(u)$ et $\text{Im}(u)$.
 3. Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de u .
-

Ex 188 : Donner un développement limité à l'ordre 5 en 0 de $e^{\cos(x)}$.

Ex 189 : Pour tout $n \in \mathbb{N}$, soit $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+1)(2k+1)}$.

1. Montrer que la suite (S_n) converge.
 2. Montrer que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + o(1)$, où γ est une constante que l'on ne cherchera pas à exprimer.
 3. Calculer la limite de (S_n) .
-

Ex 190 : Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $a_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$.

1. Donner le rayon de convergence de $\sum_{n \geq 1} a_{n-1} x^n$.

On note f la somme de cette série entière

2. Donner l'expression de $f(x)$ pour x dans $] -1, 1[$.
3. f est-elle définie en -1 ? Que dire alors de f sur $] -1, 1[$?

4. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=0}^{n-1} a_k = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \int_0^1 t^k dt$.

5. Calculer $f(1)$.
-

Ex 191 : Résoudre l'équation différentielle :

$$t \frac{d\theta}{dt} - (1+t)\theta = \frac{t^2}{\text{ch}(t)}$$

Ex 192 : Étudier les extrema de la fonction :

$$f : \begin{cases}]0; +\infty[\times \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) & \longmapsto x(y^2 + \ln(x)^2) \end{cases}$$

Navale, Saint-Cyr MP 2023

Ex 193 : [St Cyr] Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme unitaire de degré 3 dont les racines z_1, z_2, z_3 sont les affixes de points M_1, M_2, M_3 d'un plan affine euclidien. Montrer que P' a une racine double si et seulement si le triangle $M_1M_2M_3$ est équilatéral.

Ex 194 : [St Cyr] Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $\alpha_n, \beta_n \in \mathbb{R}$ tels que $A^n = \alpha_n A + \beta_n A^2$.
 2. Programmer une fonction Python `puissance(n)` renvoyant A^n .
 3. Déterminer α_n et β_n grâce à cette fonction.
 4. Tracer $n \mapsto \frac{\alpha_n}{\beta_n}$. Conjecture ?
 5. Prouver cette conjecture.
-

Ex 195 : [St Cyr] Soit $\phi : \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$ vérifiant :

- i. $\forall A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}), \phi(AB) = \phi(A)\phi(B)$;
- ii. $\forall \lambda \in \mathbb{C}, \phi\left(\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = \lambda$.

Montrer que $\phi = \det$.

Ex 196 : [St Cyr] Soit $n \in \mathbb{N}$, avec $n \geq 3$. On note U l'application qui à un polygone P constitué de n points M_1, \dots, M_n du plan complexe associe le polygone :

$$\frac{M_1 + M_2}{2}, \dots, \frac{M_{n-1} + M_n}{2}, \frac{M_n + M_1}{2}.$$

1. Écrire une fonction Python calculant $U(P)$.
 2. L'application U est visiblement linéaire. Donner sa matrice dans la base canonique. C'est une matrice stochastique que l'on notera M .
 3. Montrer que les valeurs propres de M sont de module au plus égal à 1 .
 4. Montrer que 1 est la seule valeur propre de M de module 1 .
-

Ex 197 : [Navale] Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $\phi : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mapsto AM$.

1. Donner une condition nécessaire et suffisante portant sur A pour que ϕ soit diagonalisable.
2. Décrire les éléments propres de ϕ .

Ex 198 : [St Cyr] On munit \mathbb{R}^n de sa structure euclidienne canonique. Soit (e_1, \dots, e_n) une base orthonormée de \mathbb{R}^n et (f_1, \dots, f_n) une famille de vecteurs telle que :

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \|f_k - e_k\| < \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

1. Montrer que (f_1, \dots, f_n) est une base de \mathbb{R}^n .
 2. Montrer que le résultat précédent serait en défaut en remplaçant l'inégalité stricte par une inégalité large.
-

Ex 199 : [St Cyr] Soient $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien et x_1, \dots, x_n des éléments de E . On note $G = (\langle x_i, x_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq n}$.

1. Montrer que $G \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.
 2. Montrer l'existence d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $G = A^T A$.
 3. En déduire que le rang de G est égal à celui de la famille (x_1, \dots, x_n) .
-

Ex 200 : [Navale] Soit E un espace euclidien et $u \in \mathcal{L}(E)$:

1. Montrer que si $\text{Im } u = \text{Ker } u$, alors $u + u^*$ est inversible.
 2. Montrer la réciproque si $u \circ u = 0$.
-

Ex 201 : [Navale] On munit $E = \mathbb{R}_n[X]$ du produit scalaire défini par : $\forall P, Q \in \mathbb{R}_n[X], (P|Q) = \int_0^1 PQ$.

1. Montrer que l'application u définie sur E par : $u(P) = \int_0^1 (X+t)^n P(t) dt$ est un endomorphisme autoadjoint de E .
 2. En déduire qu'il existe une base orthonormée (P_0, \dots, P_n) formée de vecteurs propres de u . On note $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres associées.
 3. Montrer que : $\forall x, y \in \mathbb{R}^2, (x+y)^n = \sum_{k=0}^n \lambda_k P_k(x) P_k(y)$. En déduire $\text{tr}(u)$.
-

Ex 202 : [St Cyr] Soit $E = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$. On munit E du produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ défini par : $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$. Soit $K : [0, 1]^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et symétrique c'est-à-dire telle que $\forall (x, t) \in [0, 1]^2, K(x, t) = K(t, x)$. Soit u l'application qui à $f \in E$ associe la fonction $u(f) : x \in [0, 1] \mapsto \int_0^1 K(x, t)f(t)dt$.

On admet le théorème de Fubini :

$$\forall \phi \in \mathcal{C}^0([0, 1]^2, \mathbb{R}), \int_0^1 \left(\int_0^1 \phi(x, t) dt \right) dx = \int_0^1 \left(\int_0^1 \phi(x, t) dt \right) dt.$$

1. Montrer que u est un endomorphisme de E .
2. Montrer que u est autoadjoint.
3. Montrer que u est continu.

Ex 203 : [St Cyr] Pour $t \in \mathbb{R}$, on note $M_t = \begin{pmatrix} \text{ch}(t) & \text{sh}(t) \\ \text{sh}(t) & \text{ch}(t) \end{pmatrix}$.

1. Montrer que les matrices M_t sont diagonalisables et trouver une base de vecteurs propres indépendante de t .
2. Montrer que l'application $\theta : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ définie par $\theta(t) = M_t$ est injective. Montrer que $\theta(t + t') = \theta(t)\theta(t')$.
3. Soient $J = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $E = \mathbb{R}^2$, \mathfrak{b} sa base canonique, $f \in \mathcal{L}(E)$ et $q : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto x^2 - y^2$. Montrer que, si $q \circ f = q$, alors $M = \text{Mat}_{\mathfrak{b}}(f)$ vérifie (*) : $M^T J M = J$. Montrer que les matrices M_t , avec $t \in \mathbb{R}$, vérifient (*) et trouver toutes les matrices vérifiant (*).

Ex 204 : [Navale]

1. Rappeler l'algorithme de Gram-Schmidt.
2. On note $T_n^+(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ triangulaires supérieures, à coefficients diagonaux strictement positifs. Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe un unique couple $(O, T) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times T_n^+(\mathbb{R})$ tel que $A = OT$.

Ex 205 : [St Cyr] Soit F un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ non restreint à la fonction nulle. On note I l'ensemble des rapports $\frac{\|f\|_\infty}{\|f\|_2}$ quand f décrit F privé de la fonction nulle, où usuellement

$$\|f\|_\infty = \sup_{[0,1]} |f| \text{ et } \|f\|_2 = \sqrt{\int_0^1 f^2}.$$

1. Que dire de I si F est de dimension 1 ?
2. Dans le cas général, montrer que I est un intervalle inclus dans $[1, +\infty[$.
3. On suppose F de dimension finie. Montrer que I est fermé.

Ex 206 : [Navale] Montrez que toute suite réelle admet une sous suite monotone.

Ex 207 : [St Cyr] Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit l'équation $(E_n) : x^n + x - 1 = 0$.

1. Montrer que (E_n) a une solution unique dans $]0, +\infty[$. On la note x_n .
2. Montrer que la suite (x_n) est croissante et majorée.
3. (Python) écrire un programme qui renvoie une valeur approchée de x_n à ε près obtenue par dichotomie.
4. (Python) Afficher les 100 premières valeurs de x_n et conjecturer la limite de la suite.
5. Démontrer la conjecture.

Ex 208 : [St Cyr] Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $P_n = X^n + X^{n-1} + \dots + X - 1$.

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, P_n a une unique racine réelle positive que l'on notera a_n .
2. Écrire une fonction Python qui renvoie une valeur approchée de a_n .

- Afficher un graphe représentant les 20 premières valeurs de la suite (a_n) . Conjecturer la nature de (a_n) .
 - Montrer la convergence de (a_n) et déterminer sa limite.
-

Ex 209 : [Navale]

- Pour $m > 1$, montrer qu'il existe un unique $x_m \in]-1, -2[$ tel que $m \ln \left(1 + \frac{x_m}{m+1} \right) = x_m$.
 - Étudier la suite $(x_m)_{m>1}$,
-

Ex 210 : [St Cyr] Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^3)^n}$.

- Justifier l'existence de I_n pour $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $I_{n+1} = \left(1 - \frac{1}{3n} \right) I_n$.
 - Programmer sur Python la méthode des trapèzes pour calculer une valeur approchée de I_1 .
 - Programmer une fonction Python qui calcule les 20 premières sommes partielles des séries $\sum I_n^\alpha$ pour $\alpha = 1, 2, 3, 4$.
 - Soit $\sum x_n$ une série à termes strictement positifs et $\sum y_n$ une série absolument convergente. On suppose qu'il existe λ tel que $\frac{x_{n+1}}{x_n} = 1 - \frac{\lambda}{n} + y_n$.
 - Montrer que $\ln \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right) = -\frac{\lambda}{n} + z_n$, où z_n est le terme général d'une série absolument convergente.
 - Montrer l'existence d'une constante C telle que $\ln(x_n) = -\lambda \ln n + C + o(1)$ quand $n \rightarrow +\infty$ et en déduire un équivalent de x_n .
 - Étudier la nature de la série $\sum I_n^\alpha$ en fonction de α .
-

Ex 211 : [St Cyr] Pour un entier n , on note r_n le reste de la division euclidienne de n par 5.

- Montrer que la série de terme général $\frac{r_n}{n(n+1)}$ converge.
 - On note $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{r_k}{k(k+1)}$. Déterminer S_{5n} en fonction de termes de la suite (H_p) , où $H_p = \sum_{k=1}^p \frac{1}{k}$.
 - En déduire la valeur de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{r_n}{n(n+1)}$.
-

Ex 212 : [St Cyr] Soient $\alpha \in \mathbb{R}^{+*}$ et $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ une fonction deux fois dérivable et majorée. On suppose que $\forall t \in \mathbb{R}^+, f''(t) \geq \alpha^2 f(t)$.

- Montrer que f est convexe.

2. Montrer que f' est négative.
 3. Montrer que f admet une limite finie en $+\infty$, déterminer sa valeur.
 4. Montrer que f' admet une limite finie en $+\infty$, déterminer sa valeur.
 5. Montrer que $\alpha^2 f^2 - f'^2$ est négative.
 6. En déduire que $\forall t \in \mathbb{R}^+, f(t) \leq f(0)e^{-\alpha t}$.
-

Ex 213 : [St Cyr] Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et concave.

1. Montrer que $\forall x \in [0, 1], xf(x) \leq \int_0^x f(t)dt - x$.
 2. En déduire $\int_0^1 xf(x)dx \leq \frac{2}{3} \int_0^1 f(x)dx$.
-

Ex 214 : [St Cyr] On définit une suite de fonctions $f_n : I = [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ par $f_n(x) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{1+nx}}$.

1. Étudier la convergence simple de $\sum f_n$.
 2. La série converge-t-elle normalement sur I ? uniformément sur I ?
 3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x)$.
-

Ex 215 : [St Cyr] Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe \mathcal{C}^1 . On définit une suite de fonctions (f_n) sur $[0, 1]$ par $f_n(x) = f\left(x + \frac{x(1-x)}{n}\right)$ pour $n \geq 1$ et $f_0(x) = 0$.

1. Étudier la convergence simple et la convergence uniforme de (f_n) .
 2. Montrer que les résultats restent valides pour une fonction f seulement lipschitzienne.
-

Ex 216 : [Navale] Étudier la convergence simple et la convergence uniforme des séries de fonctions $\sum u_n$ et $\sum u'_n$ définies sur \mathbb{R}^+ par $u_n(x) = \frac{x}{(1+n^2x)^2}$.

Ex 217 : [St Cyr] Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}^+$, on pose $f_n(x) = \frac{x}{n(1+n^2x^2)}$.

1. Étudier la convergence simple de $\sum f_n$.
 2. Étudier la continuité de la somme $f = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n$.
 3. Donner un équivalent de f en 0^+ .
-

Ex 218 : [Navale] Soit la fonction G définie sur \mathbb{R} par $G(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt$

1. Exprimer $G(x)$ en fonction de $F : x \mapsto \int_0^x e^{-u^2} du$.

2. En déduire la valeur de $\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du$.

Ex 219 : [St Cyr] On note (E) l'équation différentielle $t^2 y'' - 2y = 3t^2$.

1. Déterminer les solutions de l'équation homogène associée à (E) de la forme $t \mapsto t^\alpha$ (avec $\alpha \in \mathbb{R}$) sur \mathbb{R}^{+*} . En déduire une base de l'espace des solutions de l'équation homogène sur \mathbb{R}^{+*} .

2. Résoudre (E) sur \mathbb{R}^{+*} .

Ex 220 : [Navale] On considère une suite $(X_n)_{n \geq 1}$ i.i.d. suivant la loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0, 1[$. On note $q = 1 - p$. On note $L_1 = \sup \{n \in \mathbb{N}^*, X_1 = X_2 = \dots = X_n\}$ la longueur de la première séquence et $L_2 = \sup \{n \in \mathbb{N}^*, X_{L_1+1} = \dots = X_{L_1+n}\}$ la longueur de la seconde séquence. Montrer que $\text{Cov}(L_1, L_2) = -\frac{(p-q)^2}{pq}$.

Ex 221 : [Navale] Soient X_1, \dots, X_n des variables aléatoires i.i.d. ayant une variance. On pose, pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $Y_i = X_1 + \dots + X_i$. On note $M = (\text{Cov}(Y_i, Y_j))_{1 \leq i, j \leq n}$.

1. Relier M à la matrice $A^T A$, où $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

2. Encadrer les valeurs propres de M .

Ex 222 : [St Cyr] On considère une répétition d'expériences de Bernoulli indépendantes et de même probabilité de succès $p \in]0, 1[$. Soient $r \in \mathbb{N}^*$ et X la variable aléatoire comptant le nombre de répétitions avant d'obtenir le r succès.

1. Écrire une fonction pascal (p, r) qui simule X et renvoie le nombre d'épreuves avant le r^{e} succès.
 2. Écrire une fonction moyenne (p, r, k) qui renvoie une valeur moyenne pour k répétitions de la fonction précédente.
 3. Calculer la loi de X .
 4. Calculer l'espérance de X .
-

Ex 223 : [St Cyr] On considère une urne contenant N_1 boules blanches et N_2 boules rouges. On tire simultanément dans l'urne n boules, avec $1 \leq n \leq N_1 + N_2$. On note X le nombre de boules blanches tirées.

1. Déterminer la loi de X ,

2. Retrouver l'identité de Vandermonde : $\sum_{k=0}^n \binom{N_1}{k} \binom{N_2}{n-k} = \binom{N_1 + N_2}{n}$.

3. (Python) Définir une fonction `Hypergeom(N_{1}, N_{2}, n)` qui reproduit l'expérience et renvoie une valeur de X .

4. Exprimer l'espérance de X en fonction de N_1, N_2 et n ,
5. (Python) Définir une fonction `Moyenne(N_{1}, N_{2}, n, k)` qui reproduit k expériences et renvoie la moyenne des valeurs de X obtenues.
6. On choisit $N_1 = 10, N_2 = 13, n = 5$, et $k = 100$. Comparer la moyenne empirique et l'espérance théorique.

Dauphine, ISUP MP 2023

Ex 224 : [Dauphine] Soient $P, Q \in \mathbb{R}[X]$ non nuls tels que $P = \prod_{i=1}^n (X^2 + a_i X + b_i)$ et

$Q = \prod_{i=1}^n (X^2 + c_i X + d_i)$, avec les $X^2 + a_i X + b_i$ et $X^2 + c_i X + d_i$ irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.

On suppose que $\frac{P(X)}{Q(X)} = \frac{P(0)}{Q(0)}$.

1. Montrer que P et Q ont les mêmes racines complexes.
 2. Montrer qu'il existe $\sigma \in S_n$ tel que : $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, c_i = a_{\sigma(i)}$ et $d_i = b_{\sigma(i)}$.
-

Ex 225 : [Dauphine]

1. Montrer que : $\forall x \in E, \|p(x)\| \leq \|x\|$.
 2. En déduire que toute valeur λ propre de $p \circ q$ vérifie : $|\lambda| \leq 1$.
 3. Montrer que : $\forall x \in E, (x|p(x)) = \|p(x)\|^2$. En déduire que toute valeur λ propre de $p \circ q$ vérifie : $\lambda \geq 0$.
 4. Soit $f = p \circ q \circ p$.
 - (a) Montrer que f est un endomorphisme autoadjoint, puis que $\text{Im}(p)$ est stable par f .
 - (b) Soient G et H des sous-espaces vectoriels de E . Montrer que $(G + H)^\perp = G^\perp \cap H^\perp$. En déduire $(\text{Im}(p) + \text{Ker}(q))^\perp$.
 - (c) Soit $x \in [\text{Ker}(q) + (\text{Ker}(p) \cap \text{Im}(q))]$. Déterminer $pq(x)$.
 - (d) Montrer que $p \circ q$ est diagonalisable.
-

Ex 226 : [ISUP] Soit f une application continue de $[-1, 1]$ dans \mathbb{R} .

On pose : $\forall n \in \mathbb{N}, U_n = \inf_{P \in \mathbb{R}_n[X]} \int_{-1}^1 (f(t) - P(t) - P(-t))^2 dt$.

1. Montrer que la suite (U_n) est bien définie.
 2. Déterminer la monotonie de la suite (U_n) .
-

Ex 227 : [Dauphine] Trouver la limite de la suite de terme général $\sum_{k=1}^n \tan\left(\frac{1}{k+n}\right)$.

Ex 228 : [Dauphine] Soit (x_n) une suite de réels strictement positifs qui tend vers 0 .

1. Montrer qu'il existe une infinité de n tels que $x_n = \min(x_0, \dots, x_n)$.
 2. Montrer qu'il existe une infinité de n tels que $x_n = \max\{x_k, k \geq n\}$.
-

Ex 229 : [Dauphine] Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $P_n = \sum_{k=0}^n \frac{X^k}{k!}$. Soit $R > 0$. Montrer qu'il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que, pour tout $n \geq N$, toutes les racines complexes de P_n sont de module supérieur ou égal à R .

Ex 230 : [ISUP] Soit X une variable aléatoire telle que $X(\Omega) \subset [a, b]$ avec $0 < a < b$.

1. Majorer la variance $V(X)$. Cette valeur peut-elle être atteinte ?
2. Dans quel cas $V(X)$ est-elle maximale ? Quelle est sa valeur ?

CCINP MP 2022

Ex 231 : Soit $a \in \mathbb{R}$. Pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on note $P_i = (X - a)^i$.

1. Montrer que (P_0, \dots, P_n) est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.
 2. Soit $f : P \mapsto (X - a)(P'(X) - P'(a)) - 2(P(X) - P(a))$. Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$. Trouver son noyau et son image.
-

Ex 232 : Soient E et F deux espaces de dimension finie et $u, v \in \mathcal{L}(E, F)$.
Montrer que $\dim(\text{Ker}(u + v)) \leq \dim(\text{Ker}(u) \cap \text{Ker}(v)) + \dim(\text{Im}(u) \cap \text{Im}(v))$

Ex 233 : Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $f, g \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que :

$$\text{rg}(f + g) = \text{rg } f + \text{rg } g \iff \begin{cases} \text{Im } f \cap \text{Im } g = \{0\} \\ \text{Ker } f + \text{Ker } g = E \end{cases} .$$

Ex 234 : Soit E un \mathbb{K} -espace vectoriel de dimension finie.

1. Soit p un projecteur (p linéaire et $p^2 = p$). Montrer que $\text{Ker } p \oplus \text{Im } p = E$ et que p est la projection sur $\text{Im } p$ de direction $\text{Ker } p$.
 2. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer qu'il existe $g \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f \circ g = 0$ et $f + g \in \text{GL}(E)$ si et seulement si $E = \text{Ker } f \oplus \text{Im } f$.
-

Ex 235 : On note f l'endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ défini par $f : M \mapsto aM + bM^T$ où a et b sont des réels.

1. Montrer que $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est somme directe de l'espace S des matrices symétriques et de l'espace A des matrices antisymétriques.
2. Exprimer f en fonction de p et q , avec p la projection sur S parallèlement à A et q la projection sur A parallèlement à S .
3. Exprimer f^2 en fonction de f et Id .

4. Donner une CNS sur a et b pour que f soit un automorphisme et exprimer f^{-1} en fonction de f et Id .
-

Ex 236 : Soient E un \mathbb{R} -espace vectoriel de dimension $n \geq 2$ et $f \in \mathcal{L}(E)$.

1. Donner un exemple d'endomorphisme pour lequel le noyau et l'image ne sont pas supplémentaires.
 2. Montrer que si f est diagonalisable, alors $\text{Im}(f)$ et $\text{Ker}(f)$ sont supplémentaires. Que dire de la réciproque ?
 3. (a) Montrer que la suite $(\dim \text{Ker}(f^k))_{k \in \mathbb{N}}$ est croissante.
(b) Montrer qu'il existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tel que : $\forall k > k_0, \text{Ker}(f^k) = \text{Ker}(f^{k_0})$.
(c) Montrer que $\text{Ker}(f^{k_0})$ et $\text{Im}(f^{k_0})$ sont supplémentaires dans E .
-

Ex 237 : Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel de dimension finie n et f un endomorphisme de E vérifiant : $f^2 = -\text{Id}_E$.

1. Montrer que f n'admet pas de valeur propre réelle et montrer que f est bijectif.
 2. En déduire que la dimension de E est paire.
 3. Soit u un vecteur non nul. Montrer que $\text{Vect}(u, f(u))$ est stable par f .
 4. On prend $n = 4$. Montrer l'existence de deux vecteurs u, v tels que $(u, f(u), v, f(v))$ soit une base de E .
 5. Généraliser ce résultat.
-

Ex 238 : $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Soient E un \mathbb{K} -espace vectoriel de dimension 3, $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que

$f^2 \neq 0$ et $f^3 = 0$. Montrer que dans une certaine base \mathcal{B} de E , on a $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Ex 239 : Soit $n \geq 2$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. A est-elle diagonalisable ?
 2. Cas $n = 2$: Calculer les éléments propres de A .
 3. Cas $n \neq 2$:
 - (a) Montrer que 1 est une valeur propre de A .
 - (b) Montrer que si λ est une valeur propre de A autre que 1, alors $(\lambda - 1)^2 = n - 1$.
Expliciter les éléments propres de A .
 - (c) Calculer le déterminant de A en fonction de n .
-

Ex 240 : Soient $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ tels que $a^2 + b^2 \neq 0$ et $M = \begin{pmatrix} a & -b & -c & -d \\ b & a & d & -c \\ c & -d & a & b \\ d & c & -b & a \end{pmatrix}$.

1. Calculer MM^T . En déduire $\det(M)$.
 2. Si $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \neq 0$, montrer que : $\text{rg}(M) = 4$.
Si $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 0$, montrer que : $\text{rg}(M) = 2$.
 3. On pose $w \in \mathbb{C}$ tel que : $w^2 = b^2 + c^2 + d^2$. Quelles sont les valeurs propres de M ? La matrice M est-elle diagonalisable?
-

Ex 241 : On note E l'ensemble $C^0(\mathbb{R}^+, \mathbb{R})$ et on définit l'application u telle que pour tout $f \in E$,
 $u(f)(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$ si $x > 0$ et $u(f)(0) = f(0)$.

1. (a) Montrer que pour tout $f \in E$, $u(f)$ est continue sur \mathbb{R}^+ et dérivable sur \mathbb{R}^{+*}
(b) Pour tout $f \in E$, déterminer $u(f)'$
 2. (a) Montrer que $u \in L(E)$
(b) Montrer que u est injective
(c) u est-elle surjective?
 3. Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres associés de u
-

Ex 242 : Soit $n > 1$. On considère la matrice de $\mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$ définie par $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & & & \\ \vdots & & (0) & \\ 1 & & & \end{pmatrix}$

1. Déterminer χ_A .
 2. A est-elle diagonalisable?
 3. Calculer $\det A$.
-

Ex 243 : Soient $U, V \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$. On pose $A = UV^T$ et $a = \text{tr}(A)$.

1. Que vaut le rang de A ?
 2. Calculer $V^T U$ et A^2 .
 3. La matrice A est-elle diagonalisable?
 4. On suppose $a \neq 0$. Déterminer les sous-espaces propres de A .
-

Ex 244 :

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ si et seulement si $ab > 0$ ou $a = b = 0$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}$ pair et $A = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & a_n \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & a_2 & & \vdots \\ a_1 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Déterminer un espace de dimension deux stable par A . Donner une condition nécessaire et suffisante sur (a_1, \dots, a_n) pour que A soit diagonalisable.

Ex 245 : Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On note

$$\begin{aligned} u : \mathbb{C}_n[X] &\longrightarrow \mathbb{C}[X] \\ P &\longmapsto (X - a)(X - b)P' - nXP \end{aligned}$$

1. Montrer que u est un endomorphisme de $\mathbb{C}_n[X]$.
 2. Prouver que u est diagonalisable et trouver ses sous-espaces propres.
-

Ex 246 : Soit $A \in GL_6(\mathbb{R})$ telle que $A^3 - 3A^2 + 2A = 0$, et $\text{tr}(A) = 8$.

1. Quelles sont les valeurs propres possibles de A ?
 2. A est-elle diagonalisable?
 3. Déterminer le polynôme caractéristique de A .
-

Ex 247 : Soit E un espace vectoriel de dimension finie n . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ admettant n valeurs propres distinctes.

1. Soit $v \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que $v \circ u = u \circ v$ si et seulement si u et v admettent une base commune de vecteurs propres.
 2. Soient \mathcal{B} une base de E et A la matrice de u dans \mathcal{B} . Discuter du nombre de solutions de l'équation $X^2 = A$ d'inconnue $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
-

Ex 248 : Soit E un \mathbb{C} -espace vectoriel de dimension finie et f un endomorphisme de E .

1. On suppose que f est diagonalisable.
Montrer que f^2 est diagonalisable et que $\text{Ker } f = \text{Ker } f^2$.
 2. On suppose que f^2 est diagonalisable et que f est inversible.
(a) On note $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres distinctes de f^2 .
Montrer que le polynôme $\prod_{i=1}^p (X^2 - \lambda_i)$ est un polynôme annulateur de f .
(b) En déduire que f est diagonalisable.
 3. On suppose que f^2 est diagonalisable et que $\text{Ker } f = \text{Ker } f^2$.
Montrer que f est diagonalisable.
 4. Montrer que si f^2 est diagonalisable, alors f n'est pas nécessairement diagonalisable.
-

Ex 249 : Soit E l'espace vectoriel des polynômes réels de degré inférieur ou égal à n et u l'endomorphisme de E qui à $P(X)$ associe $P(1 - X)$.

1. Calculer $u \circ u$. En déduire les valeurs propres de u . Que peut-on dire de u ?
 2. Soit f une fonction continue de \mathbb{R} dans \mathbb{R} .
Que peut-on dire sur le graphe de f si $f(1 - x) = -f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$?
 3. En déduire les espaces propres de u . Est-ce que u est diagonalisable?
-

Ex 250 : Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

On pose $B = \begin{pmatrix} A & A \\ 0_n & A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C})$.

1. Justifier que pour tout $P \in \mathbb{C}[X]$, $P(B) = \begin{pmatrix} P(A) & AP'(A) \\ 0_n & P(A) \end{pmatrix}$.
 2. (a) Énoncer des propriétés polynomiales de diagonalisation de matrices.
(b) On suppose que B est diagonalisable. Montrer que A est diagonalisable, puis montrer que $A = 0$.
 3. Trouver une CNS sur A pour avoir : A est diagonalisable si et seulement si B est diagonalisable.
-

Ex 251 : Soit E un espace euclidien, $p \in \mathbb{N}$ et $(e_i)_{1 \leq i \leq p}$ une famille de E telle que :
 $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\langle e_i, e_j \rangle < 0$.

1. Comparer $\lambda_i \lambda_j \langle e_i, e_j \rangle$ et $|\lambda_i| \cdot |\lambda_j| \langle e_i, e_j \rangle$.
 2. Comparer $\left\| \sum_{k=1}^{p-1} |\lambda_k| e_k \right\|^2$ et $\left\| \sum_{k=1}^{p-1} \lambda_k e_k \right\|^2$.
 3. Montrer que (e_1, \dots, e_{p-1}) est libre.
-

Ex 252 : Soit E un \mathbb{R} espace vectoriel de dimension $n \geq 2$. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .
On note $\mathcal{B}' = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ la base \mathcal{B} orthonormalisée selon le procédé d'orthonormalisation de Schmidt.

1. Rappeler le procédé de Schmidt ainsi que l'expression des ε_i en fonction des e_i .
 2. On note $\mathcal{M}_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(\text{Id}_E)$.
Prouver que $\det \mathcal{M}_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) = \prod_{i=1}^n (e_i | \varepsilon_i)$.
 3. Montrer que pour toute base \mathcal{B}'' orthonormale de E , on a :
 $|\det(\mathcal{M}_{\mathcal{B}''}(\mathcal{B}))| \leq \prod_{i=1}^n \|e_i\| \quad (*)$
 4. Prouver que : $(*)$ devient une égalité si et seulement si $\mathcal{M}_{\mathcal{B}''}(\mathcal{B})$ est diagonale .
-

Ex 253 : On note $E = \mathcal{C}^0([-1, 1], \mathbb{R})$ et φ définie sur E^2 par $\varphi(f, g) = \int_{-1}^1 fg$. On note \mathcal{P} le sous-espace vectoriel des fonctions paires et \mathcal{I} celui des fonctions impaires.

1. Montrez $\mathcal{P} \oplus \mathcal{I} = E$.
 2. Montrez que φ est un produit scalaire sur E .
 3. Montrez $\mathcal{P}^\perp = \mathcal{I}$.
 4. Exprimez \hat{f} l'image de $f \in E$ par la symétrie orthogonale par rapport à \mathcal{P} .
-

Ex 254 : Soit E un espace euclidien de dimension non nulle.

1. Montrer que si p est un projecteur orthogonal, alors p est un endomorphisme autoadjoint.
2. Soient p et q deux projecteurs orthogonaux.
 - (a) Montrer que $p \circ q \circ p$ est un endomorphisme autoadjoint.
 - (b) Montrer que $(\text{Ker } q + \text{Im } p)^\perp = \text{Im } q \cap \text{Ker } p$.
 - (c) Montrer que $p \circ q$ est diagonalisable.

Ex 255 : Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$. Pour $P = \sum_{i=0}^2 a_i X^i$ et $Q = \sum_{i=1}^2 b_i X^i$, on pose $(P|Q) = \sum_{i=1}^2 a_i b_i$. On admet que $(\cdot|\cdot)$ définit un produit scalaire sur E .
On pose $F = \{P \in E, P(1) = 0\}$.

1. F est-il un sous-espace vectoriel de E ? Si oui, donner une base de F .
2. Soit $P = X$. Déterminer $d(P, F)$ (on pourra chercher une base orthonormée de F).

Ex 256 : On note E l'ensemble des fonctions f continues sur $]0, 1[$ telles que $t \mapsto (tf(t))^2$ soit intégrable sur $]0, 1[$.

1. Montrer que $(f, g) \mapsto \int_0^1 t^2 f(t)g(t)dt$ définit un produit scalaire noté $\langle \cdot, \cdot \rangle$.
2. On pose $f_0 : t \mapsto 1, f_1 : t \mapsto t$ et $F = \text{vect}(f_0, f_1)$. Donner une base orthonormée de F .
3. Déterminer pour quels réels a, b l'intégrale $\int_0^1 t^2 (\ln(t) - at - b)^2 dt$ est minimale.

Ex 257 : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid M^T = -M\}$ l'ensemble des matrices antisymétriques.
On définit le produit scalaire : $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), (A|B) = \text{tr}(A^T B)$.

1. Montrer que $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ sont supplémentaires dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Montrer que $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{A}_n(\mathbb{R})^\perp$.
3. On note $M = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer la distance de M à $\mathcal{S}_3(\mathbb{R})$.
4. Soit $H = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \text{tr}(M) = 0\}$.
 - (a) Montrer que H est un espace vectoriel de dimension à déterminer.
 - (b) On note J la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont 1. Calculer la distance de J à H .

Ex 258 : Pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $(A|B) = \text{tr}(A^T B)$.

1. Montrer que $(\cdot|\cdot)$ définit un produit scalaire.
2. Trouver une base orthonormée pour ce produit scalaire.
3. Montrer que : $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), |\text{tr}(A)| \leq \sqrt{n} \|A\|$.
4. Soient $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $G = \text{Vect}(I_n)$. Déterminer G^\perp et $d(M, G)$.

Ex 259 : Soit E un espace euclidien, F un sous-espace vectoriel de E et p le projecteur orthogonal sur F .

1. (a) Montrer que $F = \{x \in E, \|p(x)\| = \|x\|\}$.
 (b) Montrer que : $\forall x \in E, \|p(x)\| \leq \|x\|$.
 (c) Montrer que : $\forall x, y \in E, (x|p(y)) = (p(x)|y)$. Que signifie ce résultat?

2. On considère p_F et p_G deux projecteurs orthogonaux sur deux sous-espaces vectoriels F et G respectivement. On suppose que H est un sous-espace vectoriel tel que $p_F \circ p_G$ est le projecteur orthogonal sur H .

(a) Montrer que $F \cap G = H$.

(b) Montrer que $p_G \circ p_F = p_F \circ p_G$.

(c) On suppose réciproquement que F et G sont des sous-espaces vectoriels de E tels que $p_F \circ p_G = p_G \circ p_F$.
Montrer qu'il existe H sous-espace vectoriel de E tel que $p_H = p_F \circ p_G$.

Ex 260 :

1. Montrer que pour toutes matrices A et B de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

En déduire que deux matrices semblables ont la même trace.

2. Soit p un projecteur orthogonal de rang r , montrer que $\text{tr } p = r$.

3. Montrer que pour tout vecteur x , $\langle x, p(x) \rangle = \langle p(x), p(x) \rangle$.

Ex 261 : Soit E un espace euclidien et F le sous-espace vectoriel de E engendré par u , où $u \in E$. Soit \mathcal{B} une base orthonormale de E . Soit p la projection orthogonale sur F .

1. (a) Soit $x \in E$, montrer que $p(x) = \frac{\langle x, u \rangle}{\|u\|^2} u$.

(b) Montrer que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(p) = \frac{UU^T}{U^T U}$ où $U = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$.

2. Soit $A = UU^T$.

(a) Montrer que A est diagonalisable.

(b) Déterminer les sous-espaces propres de A .

3. En posant $M = I_n - UU^T$ et par observation de la matrice, déterminer des caractéristiques sur M .

Ex 262 : Soit E un espace euclidien et $u \in \mathcal{L}(E)$.

1. On suppose que u possède deux valeurs propres réelles non nulles de signes opposés. Montrer qu'il existe $z \in E \setminus \{0\}$ tel que $u(z)$ et z soient orthogonaux.

2. On suppose u autoadjoint de trace nulle. Montrer qu'il existe $z \in E \setminus \{0\}$ tel que $u(z)$ et z soient orthogonaux.

3. On suppose que u est simplement de trace nulle, montrer que la conclusion précédente demeure. On pourra introduire la matrice A canoniquement associée à u et l'endomorphisme v canoniquement associé à $B = A + A^T$.

Ex 263 : Soit $U_n = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Sans calculer aucun déterminant, déterminer les valeurs propres de U_n et leur multiplicité.

2. Soit $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ la base canonique de \mathbb{R}^n .

On pose : $\forall i \in \llbracket 2, n \rrbracket, f_i = \frac{1}{i-1} \sum_{k=1}^{i-1} e_k - e_i$.

Montrer que $(f_i)_{2 \leq i \leq n}$ est une base orthogonale de l'espace propre associé à 0 de U_n .

3. (a) Déterminer une base orthonormale de cet espace propre.

(b) Donner la formule de diagonalisation de U_n .

Ex 264 : Soient (E, \langle, \rangle) un espace euclidien et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que : $\forall x \in E, \langle f(x), y \rangle = -\langle x, f(y) \rangle$. Un tel endomorphisme est dit antisymétrique.

1. Que dire de f^2 ? Montrer que : $\forall x \in E, \langle f(x), x \rangle = 0$ et $\langle f^2(x), x \rangle \leq 0$.

2. Soit \mathcal{B} une base orthonormée de E . Que peut-on dire de $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$?

3. Déterminer une relation entre $\det(A)$ et $\det(A^T)$. Montrer que si f est bijective, alors la dimension de E est paire.

4. Montrer que f^2 est diagonalisable et que son spectre est inclus dans \mathbb{R}_- .

Ex 265 : Une matrice $A = [a_{i,j}]_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite stochastique si tous ses coefficients sont positifs et : $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sum_{j=1}^n a_{i,j} = 1$.

1. Montrer que 1 est valeur propre de A .

2. On considère la norme infinie $\|\cdot\|_{\infty}$ standard sur \mathbb{C}^n . Montrer que : $\forall X \in \mathbb{C}^n, \|AX\|_{\infty} \leq \|X\|_{\infty}$.

3. En déduire que pour toute valeur propre complexe λ de A , on a : $|\lambda| \leq 1$.

4. Montrer que l'ensemble des matrices stochastiques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est convexe et stable par produit matriciel.

Ex 266 : Soient $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et F un sous-espace vectoriel de E .

1. Montrer que \overline{F} est un sous-espace vectoriel de E .

2. On suppose qu'il existe $r \in \mathbb{R}_+^*$ et $x_0 \in E$ tels que $B(x_0, r) \subset F$. Montrer que : $\forall y \in E, \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}^*, \alpha x_0 + \beta y \in B(x_0, r)$. En déduire que $F = E$.

3. On suppose ici que $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On note \mathcal{N} l'ensemble des matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que \mathcal{N} est un fermé de E . Montrer que $\text{vect}(\mathcal{N})$ est d'intérieur vide (on pourra considérer I_n), puis que \mathcal{N} est aussi d'intérieur vide.

Ex 267 : Soit E un espace vectoriel normé.

1. Montrer que E est connexe par arcs.

2. Soit F un autre espace vectoriel normé, et $f : E \rightarrow F$ une fonction continue. Montrer que $f(A)$ est connexe par arcs pour tout connexe par arcs A de E .

3. Montrer que \mathbb{C}^* est connexe par arcs. En déduire qu'il n'existe pas de bijection continue de \mathbb{C} dans \mathbb{R} .

4. Soit U une partie de E . Montrer que la fonction $\mathbf{1}_U$ est continue sur E si U est à la fois ouvert et fermé dans E . En déduire les parties de E qui sont à la fois ouvertes et fermées dans E .

Ex 268 : Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Montrer que si P est scindé, alors P' est scindé aussi. Pour cela :

1. Énoncer le théorème de Rolle.
 2. Si a est une racine d'ordre k de P , quel est son ordre dans P' ?
 3. Montrer le résultat voulu.
-

Ex 269 : Soient $\alpha > 0, u_1 > 0$, puis : $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} = \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^\alpha} \sum_{k=1}^n u_k$ et on note $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$.

1. Justifier l'existence de $\ln(S_{n+1})$ pour tout n de \mathbb{N} , et l'exprimer à l'aide de $\ln(S_n)$.
 2. Donner un développement asymptotique à deux termes de $\ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n^\alpha}\right)$.
 3. En déduire que la série $\sum u_n$ converge si $\alpha > 1/2$.
 4. Pour $\alpha \leq 1/2$, déterminer la limite de $(\ln(S_{n+1}))_{n \in \mathbb{N}}$; conclure sur la nature de la série $\sum u_n$.
-

Ex 270 : Soit $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 1$ et : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sin(u_n)$. Pour $k \in \mathbb{Z}$, déterminer la nature de la série $\sum (u_n)^k$.

Ex 271 : Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^4)^n}$.

1. Montrer que I_n existe pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
 2. Montrer que (I_n) converge et déterminer sa limite.
 3. (a) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, trouver une relation de récurrence entre I_n et I_{n+1} .
(b) Trouver d'une autre manière la limite de (I_n) .
-

Ex 272 :

1. Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer que $\int_1^{+\infty} \frac{e^{it}}{t^\alpha} dt$ converge.
 2. En déduire la nature de $\int_1^{+\infty} \sin(t^2) dt$.
 3. Montrer que $\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{t} \sin(t)}{t + \cos(t)} dt$ converge.
-

Ex 273 :

1. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n dt = \int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1}(t) dt$.
2. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n dt = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$.

3. On pose $I_p = \int_0^{\pi/2} \sin^p(t) dt$ et $u_p = (p+1)I_p I_{p+1}$, pour $p \in \mathbb{N}$. Montrer que la suite $(u_p)_{p \in \mathbb{N}}$ est constante et que $I_p \sim \sqrt{\frac{\pi}{2p}}$.
4. Calculer $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$.
-

Ex 274 :

- Donner le développement en série de Taylor de l'exponentielle sur $[0; 1]$.
 - On pose $I_n = \int_0^1 (1-t)^n e^t dt$. Montrer que la suite $(I_n)_n$ converge et qu'elle est de limite nulle.
 - Donner un équivalent de I_n en partant d'une intégration par parties
 - (a) Exprimer $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ en fonction de I_n
 (b) Montrer la convergence de la suite $u_n = n \sin(2\pi n! e)$
-

Ex 275 : Soit $I = \int_0^{+\infty} \frac{t \sin t}{t^2 + 1} dt$.

- Montrer que I existe.
 - On considère : $\forall x \in \mathbb{R}, J(x) = \int_0^x \frac{t |\sin t|}{t^2 + 1} dt$.
 Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, J(n\pi) = \sum_{k=0}^{n-1} \int_0^\pi (u + k\pi) \frac{\sin u}{(u + k\pi)^2 + 1} du$.
 - I est-elle absolument convergente ?
-

Ex 276 : On définit pour tout $t > 0, f(t) = \frac{\ln t}{(1+t)^2}$.

- Montrer que f est intégrable sur $]0, 1]$, puis sur $[1, +\infty[$.
 - Calculer $\int_0^1 f(t) dt$ et $\int_1^{+\infty} f(t) dt$.
-

Ex 277 : Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $f_n : x \mapsto n \cos^n(x) \sin(x)$.

- Montrer que (f_n) converge simplement sur $[0, \pi/2]$.
 - (f_n) converge-t-elle uniformément sur $[0, \pi/2]$? (on pourra considérer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\pi/2} f_n$).
 - Soient $0 < a < b$. (f_n) converge-t-elle uniformément sur $[a, \pi/2]$? Et sur $[a, b] \subset [0, \pi/2]$?
 - Soit $g \in \mathcal{C}^0([0, \pi/2], \mathbb{R})$. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\pi/2} f_n(t) g(t) dt = g(0)$.
-

Ex 278 : Soit $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-x^2 n^2}$, pour $x \in \mathbb{R}$.

1. Quel est l'ensemble de définition de S ?
 2. Montrer la continuité de S sur celui-ci (on pourra travailler sur un segment).
 3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} S(x)$.
 4. (a) Calculer $\int_0^{+\infty} e^{-x^2 t^2} dt$, pour x dans \mathbb{R}_+^* (on rappelle que $\int_0^{+\infty} e^{-t^2/2} dt = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$).
(b) Donner un équivalent de S en 0.
-

Ex 279 : Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $f_n : x \mapsto \frac{e^{-x}}{(1+x)^n}$ et $J_n = \int_0^{+\infty} f_n$.

1. Justifier l'existence de J_n et déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n$.
 2. Calculer f_n' . Trouver une relation entre J_n et J_{n+1} . En déduire un équivalent de J_n .
 3. Donner le rayon de convergence de la série entière $\sum J_n x^n$.
 4. Exprimer sa somme sous forme d'intégrale.
-

Ex 280 : Pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n(x) = (-1)^n \frac{e^{-nx}}{n}$. On note f la somme de cette série de fonctions.

1. Montrer que f est définie sur \mathbb{R}_+ .
 2. Montrer la convergence uniforme de $\sum u_n$ sur \mathbb{R}_+ et en déduire que f est continue sur \mathbb{R}_+ .
 3. Y a-t-il convergence normale sur \mathbb{R}_+ ?
 4. Montrer que f est de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R}_+^* et en déduire, pour $x > 0$, une expression explicite de $f'(x)$.
 5. Déterminer f puis en déduire la valeur de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$.
-

Ex 281 : On pose $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x}$ pour tout $x > 0$.

1. Justifier l'existence et le caractère \mathcal{C}^1 de S , puis donner une expression de $S'(x)$.
 2. En déduire la monotonie de S .
 3. Montrer que $S(x+1) + S(x) = \frac{1}{x}$ pour tout $x > 0$ et en déduire un équivalent simple de S en 0^+ .
-

Ex 282 : Soient $p, n \in \mathbb{N}$ et on pose $S_n = \int_0^{+\infty} \frac{x^{p+1}}{e^x - 1} e^{-nx} dx$.

1. Montrer que S_n existe.
2. Soient $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}^*$ et $T_{a,b} = \int_0^{+\infty} x^a e^{-bx} dx$. Montrer que $T_{a,b}$ existe et en donner une expression (on montrera que $\int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt = n!$).

3. Montrer que $S_0 = (p+1)! \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^{p+2}} + S_n$.
 4. En déduire que (S_n) converge.
 5. Montrer que $(p+1)! \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^{p+2}} = \int_0^{+\infty} \frac{x^{p+1}}{e^x - 1} dx$.
-

Ex 283 : Pour $p, q \in \mathbb{N}$, on pose $I_{p,q} = \int_0^1 x^p (\ln(x))^q dx$.

1. (a) Étudier la convergence de cette intégrale.
(b) Calculer cette intégrale.
 2. Calculer $\int_0^1 \exp(x \ln(x)) dx$.
-

Ex 284 :

1. Montrer que la fonction $x \mapsto \frac{\ln^2(x)}{1+x^2}$ est intégrable sur $]0, 1]$.
 2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction $x \mapsto x^{2n} \ln^2(x)$ est intégrable sur $]0, 1]$ et calculer son intégrale.
 3. On note $I = \int_0^1 \frac{\ln^2(x)}{1+x^2} dx$. Écrire I comme somme d'une série.
 4. Comment calculer I à 10^{-N} près ? Donner le résultat pour $N = 3$.
-

Ex 285 : Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $a_n = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} dt$.

1. Quel est le rayon de convergence R de la série entière $\sum a_n x^n$?
 2. Calculer la somme de cette série.
-

Ex 286 : Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $a_n = \int_0^1 \frac{1}{(2+t^2)^{n+1}} dt$.

1. Montrer le rayon de convergence R de la série entière $\sum a_n x^n$ vaut au moins 2.
 2. Soit $S_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$. Pour $x \in]-2, 2[$, montrer que la suite $(S_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ converge et calculer sa limite.
 3. En déduire la somme de la série entière $\sum a_n x^n$ et montrer que $R = 2$.
-

Ex 287 : Calculer $\int_0^1 \frac{\ln(1+u)}{u} du$, sachant que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Ex 288 : Donner les rayons de convergence et calculer les sommes des séries entières $\sum nx^n$, $\sum 2nx^{2n}$ et $\sum n^{(-1)^n} x^n$.

Ex 289 :

1. Soit $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \ln n x^n$.

Pour quels x la quantité $f(x)$ est-elle définie? On note I le domaine de définition de f .

2. Soit $g(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$ avec $a_1 = -1$ et : $\forall n \geq 2, a_n = -\ln(1 - \frac{1}{n}) - \frac{1}{n}$.

Pour quels x la quantité $g(x)$ est-elle définie? On note J le domaine de définition de g .

3. (a) Montrer que $g(x) = (1-x)f(x) + \ln(1-x)$.

(b) Montrer que $f(x) \sim -\frac{\ln(1-x)}{1-x}$ quand $x \rightarrow 1^-$.

(c) Déterminer un équivalent de f en $(-1)^+$.

Ex 290 : On considère la suite définie par $u_0 = 3$ et : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u_k u_{n-k}$.

1. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq 4^n n!$.

2. Soit $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{n!} x^n$. Montrer que f est définie sur un intervalle à préciser. Montrer que f est solution de $y' = y^2$.

3. Déterminer f .

4. En déduire explicitement l'expression de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Ex 291 : Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et on pose $f_n : x \mapsto \frac{e^{i2^n x}}{n^n}$. Soit $S : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$.

1. Montrer que S est de classe \mathcal{C}^∞ sur \mathbb{R} .

2. (a) Quel est le rayon de convergence de la série entière $\sum_{k \geq 0} \frac{2^{k^2}}{k! k^k} x^k$.

(b) Quel est le rayon de convergence de la série de Taylor de S en 0?

3. Rappeler la formule de Taylor-Lagrange avec reste intégrale.

Montrer que : $\forall z \in \mathbb{C}, e^z = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k}{k!}$.

Ex 292 :

1. Calculer $I_{2n} = \int_0^\pi \sin^{2n}(x) dx$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2. Montrer que $\frac{1}{\sqrt{1-u}} = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{4^n} \binom{2n}{n} u^n$ pour tout $u \in]-1, 1[$.

3. On pose $f(x) = \int_0^\pi \frac{1}{\sqrt{1-x^2 \sin^2 t}} dt$.

Justifier que f est développable en série entière pour $x \in]-1, 1[$, et exprimer ce développement.

Ex 293 :

1. Montrer que pour tout $u \in \mathbb{R}$, $|\operatorname{Arctan} u| \leq |u|$.

2. On pose $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{Arctan}(xt)}{t(1+t^2)} dt$.

- (a) Domaine de définition de F ?
 - (b) Domaine de continuité de F ?
 - (c) Domaine de dérivabilité de F ?
 - (d) Déterminer F' .
 - (e) En déduire F .
-

Ex 294 : Soit $F : t \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-(u^2+i)t^2}}{u^2+i} du$. On admet que $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

- 1. Montrer que F est définie et continue sur \mathbb{R} .
 - 2. Pour $t \in \mathbb{R}_+^*$, déterminer $\int_0^{+\infty} e^{-t^2 u^2} du$.
 - 3. Montrer que F est de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R}_+^* et : $\forall t \in \mathbb{R}_+^*$, $F'(t) = -\sqrt{\pi} e^{-it^2}$.
En déduire que F est dérivable en 0 et que F est de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R} .
 - 4. Déterminer $\lim_{t \rightarrow +\infty} F(t)$.
 - 5. Montrer que $F(0) = \sqrt{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-it^2} dt$.
 - 6. En déduire les valeurs de $\int_0^{+\infty} \cos(t^2) dt$ et $\int_0^{+\infty} \sin(t^2) dt$.
-

Ex 295 : Soit $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$.

- 1. Montrer que Γ est bien définie sur $]0, +\infty[$.
 - 2. Montrer que Γ est de classe \mathcal{C}^1 sur $]0, +\infty[$ et donner Γ' .
 - 3. Montrer que : $\forall x \in]1, +\infty[$, $\forall \lambda \in]-1, 1[$ $\int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1} e^{-t}}{1 - \lambda e^{-t}} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\lambda^n \Gamma(x)}{(n+1)^x}$.
-

Ex 296 : On pose $F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt} \frac{\sin(t)}{t} dt$.

- 1. Montrer que F est définie sur \mathbb{R}_+^* .
- 2. Montrer que F est dérivable sur \mathbb{R}_+^* .
- 3. Calculer F' sur \mathbb{R}_+^* .
- 4. Calculer F sur \mathbb{R}_+^* .

Ex 297 : On admet que $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. Soit $x \in \mathbb{R}$. On pose $z(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{(-1+ix)t}}{\sqrt{t}} dt$ quand l'intégrale existe.

1. Justifier l'existence de $z(0)$ et montrer que $z(0) = \sqrt{\pi}$.
 2. Montrer que z est de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R} .
 3. Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, z'(x) = -\frac{1}{2(x+i)}z(x)$.
 4. Soit $x \in \mathbb{R}$. Déterminer la partie réelle et imaginaire de $-\frac{1}{2(x+i)}$. En déduire $z(x)$.
-

Ex 298 : On considère l'équation différentielle : $4xy'' + 2y' - y = 0$ (E). Trouver l'unique solution développable en série entière à l'origine respectant la condition $y(0) = 1$.

Ex 299 : Soit le système suivant :
$$\begin{cases} x' = z + \cos t \\ y' = y + e^{3t} \\ z' = x + \sin t \end{cases} .$$

1. Résoudre.
 2. Trouver la solution telle que x et z soient bornées sur \mathbb{R}_+ et que $x(0) = z(0)$.
-

Ex 300 : Soit l'équation différentielle (*) : $t^2y'' + 4ty' + 2y = 0$.

1. Déterminer les solutions de (*) de la forme $t \mapsto t^r$ sur \mathbb{R}_+^* .
 2. Écrire (*) sous forme d'un système différentiel linéaire.
 3. Soit l'équation différentielle (**): $t^2y'' + 4ty' + 2y = e^t$. À l'aide de la méthode de la variation des constantes, donner les solutions de (**) sur \mathbb{R}_+^* .
 4. On propose une autre méthode de résolution. Vérifier qu'il existe une solution particulière de (**) de la forme $y : t \mapsto \frac{z(t)}{t}$, avec z une fonction de classe \mathcal{C}^2 sur \mathbb{R}_+^* .
En déduire l'ensemble des solutions de (**) sur \mathbb{R}_+^* .
-

Ex 301 : Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) & \longmapsto \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ & 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

1. Prouver que $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$.
2. On pose $\vec{u}_\theta = (\cos \theta, \sin \theta)$ avec $\theta \in]-\pi, \pi]$. Trouver les θ tels que la dérivée partielle de f en $(0, 0)$ selon \vec{u}_θ existe.
3. Existent-ils des dérivées partielles de f en $(0, 0)$?
4. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ avec $(x, y) \neq (0, 0)$.
5. Est-ce qu'ils existent des dérivées partielles d'ordre 2 de f sur \mathbb{R}^2 ?

Ex 302 : $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x > 0 \text{ et } y > 0\}$

Soit $\Phi : \Omega \rightarrow \Omega$

$$(x, y) \mapsto \left(xy, \frac{x}{y}\right)$$

1. Montrer que Φ est bijective et déterminer Φ^{-1} .

2. On pose $(u, v) = \Phi(x, y)$ et $f(x, y) = F(u, v)$.

Exprimer $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial^2 x}$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial^2 y}$ en fonction des dérivées partielles de F .

3. Résoudre $x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) - 2f(x, y) + 2 = 0$

4. Résoudre $x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} - y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial^2 y} = 0$.

Ex 303 : On a la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ telle que $f(x, y) = x((\ln(x))^2 + y^2)$ et Σ la surface représentative de f dans un repère orthonormé.

1. Déterminer les points critiques de f .

f admet-elle un extremum global ?

2. Soit (a, b) un point critique de f , déterminer l'équation du plan tangent à Σ en $(a, b, f(a, b))$

3. Exprimer l'équation du plan tangent en $(1, 1, 1)$

4. Exprimer la différentielle de f en $(1, 1)$ puis g telle que $g(x, y) = (f(x, y), f(x, y))$

Ex 304 : Soient X, Y deux variables aléatoires indépendantes suivant la loi géométrique de paramètre $p \in]0, 1[$. On pose $U = \min(X, Y)$ et $V = \max(X, Y)$.

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, donner $P(X \leq n)$ et $P(X \geq n)$.

2. Donner $P(U = n)$ et $P(V = n)$.

3. Que peut-on dire des événements $(X = n) \cap (Y = n)$ et $(U = n) \cap (V = n)$? Les variables aléatoires U et V sont-elles indépendantes ?

4. Donner l'espérance de U et de V .

Ex 305 : Soient A_1, A_2 et A_3 trois personnes venant dans cet ordre déposer une lettre à la poste dans laquelle il y a deux guichets. A_3 doit donc attendre que A_1 et A_2 aient fini. Soient X_1, X_2 et X_3 les temps d'attente respectifs au guichet des visiteurs et elles suivant toutes une loi géométrique de paramètre p .

Soit Y le temps d'attente de A_3 avant d'accéder à un guichet.

Soit Z le temps total passé par A_3 (temps d'attente pour accéder à un guichet attendre le guichet et temps passé au guichet).

1. Déterminer la loi de Y (calculer $P(Y > k)$ d'abord).

2. Écrire Z en fonction de Y et X_3 puis déterminer la loi de Z .

3. Temps moyen passé par A_3 à la poste.

Ex 306 : Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $a_0 \in \mathbb{R}_+^*$, $(a_1, \dots, a_{n-1}) \in (\mathbb{R}_+)^{n-1}$, $P = X^n - \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$.

1. Montrer que dans \mathbb{R}_+^* , P admet un unique zéro, noté ρ .
 2. Montrer que tout zéro de P est de module inférieur ou égal à ρ .
 3. Montrer que : $\rho \leq \max \left(1, \sum_{k=0}^{n-1} a_k \right)$.
 4. Montrer que : $\rho < 1 + \max_{0 \leq k \leq n-1} a_k$.
-

Ex 307 : Quels sont les polynômes complexes P tels que $P(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$ (en notant \mathbb{U} le cercle unité) ?

Ex 308 : Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB = 0$.

1. A-t-on nécessairement $BA = 0$?
 2. Montrer que : $\forall p \in \mathbb{N}^*$, $tr((A+B)^p) = tr(A^p) + tr(B^p)$.
 3. Déterminer une relation entre $rg(A)$ et $rg(B)$.
-

Ex 309 : Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec $M^2 + M + I_n = 0$.

1. Montrer que n est pair.
 2. Déterminer $tr(M)$, $rg(M)$ et $\det(M)$.
 3. Donner un exemple pour $n = 2$, puis déterminer toutes les solutions.
-

Ex 310 : Soit D l'opérateur de dérivation dans $\mathbb{R}_n[X]$, $n \geq 1$.

1. Trouver son polynôme caractéristique.
 2. Montrer qu'il n'existe pas d'application f telle que $f^2 = D$.
-

Ex 311 : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 + I_n = 0$. Montrer que $tr(A)$ est un entier.

Ex 312 : Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ telle que A^2 est diagonalisable à valeurs propres strictement positives. Montrer que A est diagonalisable.

Ex 313 : Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & \dots & \dots & 1 \\ \vdots & \ddots & (0) & \\ \vdots & & \ddots & \\ 1 & (0) & & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec $n \geq 3$.

valeurs propres et vecteurs propres.

Ex 314 : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $B = \begin{pmatrix} A & 0 \\ A & A \end{pmatrix}$.

1. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Donner une expression de $P(B)$.
 2. Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que B soit diagonalisable.
-

Ex 315 : Soient $M, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $N^n = NM = 0$. On suppose de plus que M est trigonalisable sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $M + N$ est trigonalisable sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Ex 316 : Soit $A \in S_n(\mathbb{R})$ ayant des valeurs propres positives. Soit $U \in O_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\text{tr}(AU) \leq \text{tr}(A)$.

Ex 317 : Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction k -lipschitzienne, avec $k \in [0, 1[$.

1. Montrer que f admet un unique point fixe.
 2. Montrer que cela est faux lorsque l'on suppose seulement que :
 $\forall x, y \in \mathbb{R}, x \neq y \Rightarrow |f(x) - f(y)| < |x - y|$.
-

Ex 318 : On pose $a_n = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^n}$.

1. Montrer que la suite (a_n) converge et donner sa limite.
 2. Donner un développement asymptotique à deux termes de a_n .
-

Ex 319 : On pose $u_n = \int_n^\infty \frac{e^{-t}}{t} dt$.

1. Pour quels $n \in \mathbb{N}$ u_n est-elle correctement définie ?
 2. Nature de $\sum u_n$?
-

Ex 320 : On pose : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} t^n}{\sqrt{t}} dt$.

1. Montrer que u_n est bien définie.
 2. Calculer u_n .
-

Ex 321 : Soient $a \in \mathbb{R}_+^*$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. Nature de la série $\sum \frac{n^\alpha}{a(1+a)\dots(1+a^n)}$.

Ex 322 : Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $u_n = \frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{\sqrt{n(n+1)}}$. Nature de la série $\sum u_n$ (on pourra sommer par paquet).

Ex 323 : Soit $f : t \mapsto \frac{\ln(t)}{1+t^2}$. Montrer que f est intégrable sur \mathbb{R}_+^* et calculer $\int_0^1 f(t)dt$.

Ex 324 : Pour $(n, x) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{R}_+$, on pose $f_n(x) = \frac{ne^{-x} + x^3}{n+x}$.

1. Étudier les convergences simple et uniforme de la suite (f_n) sur \mathbb{R}_+ et sur $[0, 1]$.
 2. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(x)dx$.
-

Ex 325 :

1. Montrer que la fonction $g : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-n+n^2ix}$ est bien définie et de classe \mathcal{C}^∞ sur \mathbb{R} .
 2. Montrer que g n'est pas DSE au voisinage de 0.
-

Ex 326 : Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{e^t - 1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$.

Ex 327 : On pose $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} x^{n^2}$.

1. Donner le domaine de définition de f .
 2. Donner un équivalent de f en 1, sachant que $\int_0^{+\infty} \frac{\exp(-v)}{\sqrt{v}} dv = \sqrt{\pi}$.
-

Ex 328 : Soit la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{(n!)^2}$ et f sa somme.

1. Rayon de convergence de cette série ?
 2. Lien entre f et $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} e^{2\sqrt{x}\sin(t)} dt$?
-

Ex 329 : On pose $f : z \in \mathbb{U}_n \rightarrow z^2 \in \mathbb{U}_n$ où \mathbb{U}_n est le groupe des racines n -ièmes de l'unité.

1. Pour quels $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction f est-elle bijective ?
2. Pour quels $n \in \mathbb{N}^*$ $f \circ f = Id$?

Ex 330 : Soit n un entier naturel supérieur à 2. On définit une probabilité uniforme sur l'ensemble $\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$.

Pour un entier p divisant n , on introduit l'événement $D_p = \{1 \leq k \leq n, p \text{ divise } k\}$.

1. Calculer $P(D_p)$.
2. Soit $n = p_1^{\alpha_1} \times \dots \times p_r^{\alpha_r}$ la décomposition de n en facteurs premiers. Les événements D_{p_1}, \dots, D_{p_r} sont-ils mutuellement indépendants ?
3. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et φ l'indicatrice d'Euler (le nombre d'éléments de Ω premiers avec n). Montrer que
$$\frac{\varphi(n)}{n} = \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

Ex 331 : Soit $(X_k)_{k \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées selon une loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0, 1[$.

Pour $r \in \mathbb{N}^*$, on considère la variable aléatoire $T_r = \min(\{n \in \mathbb{N}^* \mid X_1 + \dots + X_n = r\} \cup \{+\infty\})$.

1. Reconnaître la loi de T_1 .
2. Calculer $P(T_r = n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
3. Montrer que l'événement $(T_r = +\infty)$ est négligeable.

IMT 2 MP 2022

Ex 332 : On pose pour $n \in \mathbb{N}$ le polynôme $P_n = (X^2 - X + 1)^n - X^{2n} - X^n + 1$.

1. Déterminer n tel que $X^3 - X^2 + X - 1$ divise P_n .
2. Dans les cas où P_n n'est pas divisé, calculer le reste de la division euclidienne

Ex 333 : Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un morphisme de corps.

1. Déterminer f sur \mathbb{Z} , puis sur \mathbb{Q} .
2. Soit $x \in \mathbb{R}_+$. Montrer que $f(x) \in \mathbb{R}_+$.
3. Étudier la monotonie de f .
4. Déterminer entièrement f .

Ex 334 : Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

1. Calculer A^n , pour $n \in \mathbb{N}$.
2. A est-elle inversible ? Si oui, donner A^n , pour $n \in \mathbb{Z}$.

Ex 335 : Soit E un \mathbb{K} -espace vectoriel non réduit à $\{0\}$. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent d'ordre p .

1. f est-elle injective ? Surjective ?
2. On suppose que $\dim(E) = n$ et $p = n$.
 - (a) Montrer qu'il existe $x_0 \in E$ tel que $\mathcal{B} = (x_0, f(x_0), \dots, f^{n-1}(x_0))$ soit une base de E .

(b) Quelle est la matrice de f dans cette base \mathcal{B} ? On appelle A cette matrice.

(c) A est-elle diagonalisable?

3. $E = \mathbb{K}_{n-1}[X]$. Donner un exemple de f dans $\mathcal{L}(E)$ nilpotent d'ordre n , et d'une base telle que la matrice de f dans cette base soit la matrice A .
4. (a) Pour $t \in \mathbb{R}$, calculer $\exp(t(I_n + A))$.

(b) Résoudre :
$$\begin{cases} X'(t) = X(t) + AX(t) \\ X(0) = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix} \end{cases} .$$

Ex 336 :

- Donner la définition de la somme directe de n espaces vectoriels ($n \geq 2$).
- Soit f un endomorphisme, λ, μ deux valeurs propres distinctes. Démontrer que E_λ, E_μ sont en somme directe. Que dire si le nombre de sous espaces propres augmente?
- Soit E un espace muni d'une structure euclidienne. Démontrer qu'une partie et son orthogonal sont en somme directe.
- Soit f un endomorphisme et A sa matrice associée, dans une base \mathcal{B} de E , avec $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. Que dire des sous-espaces stables en observant la matrice?

Ex 337 : Soit $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

- Soit F l'ensemble des $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont X est un vecteur propre. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$; quelle est sa dimension?
- Même question avec X quelconque.

Ex 338 : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à coefficients dans $[0, 1]$, telle que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\sum_{j=1}^n a_{i,j} = 1$.

- Montrer que 1 est valeur propre de A .
- Soit λ une valeur propre de A . Montrer que $|\lambda| \leq 1$ et que pour $\omega > 0$, $|\lambda - \omega| \leq 1 - \omega$.

Ex 339 : Soit a_1, \dots, a_n des réels non tous nuls. On pose : $A = \begin{pmatrix} 0 & a_1 & \cdots & a_n \\ a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que A est diagonalisable.
 2. Quel est le rang de A ? Que peut-on en déduire sur son spectre?
 3. Calculer A^2 . En déduire le spectre et le polynôme caractéristique de A .
-

Ex 340 : Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ -3 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Résoudre $M^2 = A$, où $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.
 2. Résoudre $M^2 = A$, où $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.
-

Ex 341 : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 = A$.

1. Montrer que A est diagonalisable.
 2. On suppose que $\text{rg } A = \text{Tr } A$. Montrer que A est la matrice d'un projecteur.
-

Ex 342 : Soit l'application $u : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$.

$$P \mapsto X^n \times P\left(\frac{1}{X}\right)$$

1. Montrer que l'application u est un endomorphisme.
 2. Montrer que u est diagonalisable et exprimer son polynôme minimal.
 3. Déterminer une base de vecteurs propres de u .
-

Ex 343 : Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel de dimension finie et $(u, v) \in (\mathcal{L}(E))^2$. Montrer que si $\lambda \in \mathbb{R}$ est valeur propre de $u \circ v$, alors λ est valeur propre de $v \circ u$.

Ex 344 : Pour $n \geq 2$, on pose $E = \mathbb{R}_n[X]$ et l'on définit φ qui à $P \in E$ associe $\varphi(P) = (X^2 + X)P(1) + (X^2 - X)P(-1)$.

1. Montrer que φ est un endomorphisme de E . Déterminer l'image et le noyau de φ .
 2. Déterminer les éléments propres de φ . Est-il diagonalisable?
-

Ex 345 : On pose E l'espace des fonctions continues de $[0, 1]$ à valeurs réelles. On pose $\phi : f \rightarrow F$ avec $F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt$ pour x différent de 0 et $F(0) = f(0)$

1. Montrer que ϕ est un endomorphisme de E
 2. Déterminer les valeurs propres et vecteurs propres de ϕ .
-

Ex 346 : Soit E un espace vectoriel de dimension n , muni du produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$, et $a \in E$ un vecteur normé.

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $f_\alpha : x \mapsto x + \alpha \langle a, x \rangle a$, endomorphisme de E .

Montrer que : $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, f_\alpha \circ f_\beta = f_{\alpha+\beta+\alpha\beta}$.

1. Déterminer les α tels que f_α soit bijectif.
 2. Trouver les valeurs propres de f_α .
-

Ex 347 : Dans tout l'exercice, on considère A une matrice antisymétrique.

1. Montrer que : $\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), X^\top AX = 0$.
 2. Qu'en déduire des valeurs propres réelles de A ? À quelle condition A est-elle diagonalisable sur \mathbb{R} ?
 3. On pose : $M = A + I_n$, montrer que M est inversible, est-elle diagonalisable?
 4. Montrer que $K = M^{-1}M^\top$ est orthogonale.
 5. Soit B une matrice symétrique réelle dont les valeurs propres sont strictement positives, montrer que $A + B$ est inversible.
-

Ex 348 : Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $XX^\top X = -I_n$.

Ex 349 : Soit E un espace euclidien de dimension $n \geq 2$. Soit (a, b) une famille libre de E et $f : x \mapsto (a|x)a + (b|x)b$ définie sur E .

1. Montrer que f est un endomorphisme autoadjoint de E .
 2. Trouver les éléments propres de f .
-

Ex 350 : On pose pour tout l'exercice $E = \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$.

1. Donner les normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ sur E .
 2. Montrer que $\|\cdot\|_1$ est une norme.
 3. Montrer que si $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ converge au sens de $\|\cdot\|_\infty$, alors elle converge au sens de $\|\cdot\|_1$.
 4. Les normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont-elles équivalentes?
-

Ex 351 : Exprimer $\sin 3x$ comme polynôme de $\sin x$. En déduire que $\sin\left(\frac{\pi}{18}\right)$ est irrationnel.

Ex 352 : On pose la suite $(u_n)_n$ telle que
$$\begin{cases} u_0 > 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n} \end{cases} .$$

1. Étudier la suite $(u_n)_n$.
 2. Déterminer un équivalent simple de $(u_n)_n$.
-

Ex 353 :

1. Montrer que pour n dans \mathbb{N}^* , il existe un unique $x \in \mathbb{R}_+$ tel que : $\cos x = nx$.
2. On note $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite ainsi trouvée. Montrer une éventuelle monotonie et une éventuelle limite de cette suite.

Ex 354 : On pose pour $n, p \in \mathbb{N}^*$, $S_p(n) = \sum_{i=1}^{n-1} i^p$.

1. Calculer $S_1(n)$ et $S_2(n)$ et en donner un équivalent quand n tend vers $+\infty$.
 2. Donner un équivalent de $S_p(n)$ quand n tend vers $+\infty$, pour p quelconque fixé.
-

Ex 355 : Montrer la convergence et calculer la somme de la série $\sum \ln \left(\frac{(2n+1)n}{(2n-1)(n+1)} \right)$

Ex 356 :

1. Si f est continue sur $[a, b]$, que représente $S_n(f) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f \left(a + k \frac{b-a}{n} \right)$?

Illustrer graphiquement et énoncer le théorème relatif à $S_n(f)$.

2. Trouver un équivalent en $+\infty$ de $\sum_{k=0}^{n-1} \frac{k^2}{n^2(n^3 + k^3)^{1/3}}$.
-

Ex 357 : Déterminer la nature de $\sum u_n$, avec $u_n = \frac{(-1)^n}{n^{3/4} + \sin(n)}$.

Ex 358 : Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $f_n : x \mapsto \min \left(n, \frac{x^2}{n} \right)$, définie sur \mathbb{R} . Étudier la convergence simple et la convergence uniforme de la suite (f_n) sur des ensembles à préciser.

Ex 359 :

1. Définition de la convergence uniforme de (f_n) vers f sur I .
 2. Démontrer le théorème de la continuité pour la convergence uniforme (on remarquera que : $f(x) - f(a) = f(x) - f_n(x) + f_n(x) - f_n(a) + f_n(a) - f(a)$).
 3. Soit $n \in \mathbb{N}$ et on pose $f_n : x \mapsto \frac{1-x^n}{1+x^n}$ définie sur \mathbb{R}_+ . Étudier la convergence simple, puis uniforme de (f_n) .
-

Ex 360 : On pose : $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{-nx}}{1+n^2}$.

1. Donner le domaine de définition de f .
2. Montrer que f est continue sur son domaine.
3. Montrer que f est de classe \mathcal{C}^∞ sur \mathbb{R}_+ .
4. Donner le tableau de variation de f .
5. Donner la limite de f en $+\infty$.

Ex 361 : Pour $x \in [0, 1]$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $g_n(x) = \int_0^x g_{n-1}(1-t)dt$, avec $g_0 = 1$.

1. Montrer que la suite (g_n) est bien définie sur $[0, 1]$.
 2. Montrer que la suite (g_n) est bornée et que : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\|g_n\|_\infty \leq \frac{1}{2}\|g_{n-1}\|_\infty$.
 3. Montrer que la série $\sum g_n$ converge uniformément sur $[0, 1]$.
 4. Identifier la somme $S = \sum_{n=0}^{+\infty} g_n$.
-

Ex 362 : Soit $n \in \mathbb{N}$, on pose $f_n : x \mapsto x^n(1 - \sqrt{x})$.

1. Calculer $\int_0^1 f_n(x) dx$.
 2. En déduire la valeur de $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)(2n+3)}$.
-

Ex 363 : Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $f_n : t \mapsto \frac{n}{\sqrt{t}} \ln\left(1 + \frac{1}{nt}\right)$ et $I_n = \int_0^1 f_n$.

1. Montrer que l'intégrale I_n converge.
 2. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.
-

Ex 364 : Pour $x \in [0, +\infty[$, on pose $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)$.

Montrer que f est définie, continue et de classe \mathcal{C}^1 sur $[0, +\infty[$.

Ex 365 : Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\tan(t))^n dt$.

1. Déterminer la limite de la suite (a_n) .
 2. Déterminer, pour $n \in \mathbb{N}$, une relation entre a_{n+2} et a_n .
 3. On considère $f(x) \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. Déterminer le domaine de définition de f .
 4. Calculer f .
-

Ex 366 : Soit $(a_n)_n$ une suite complexe telle que la série entière $\sum a_n x^n$ a pour rayon R_1 . Montrer que la série entière $\sum a_n^2 x^n$ a pour rayon de convergence $R_2 = R_1^2$.

Ex 367 :

1. Pour $x \in \mathbb{R}$, montrer que $u_x : t \mapsto \frac{e^{-t} - e^{-2t}}{t} \cos(xt)$ est intégrable sur \mathbb{R}_+^* . On posera $f(x) = \int_0^{+\infty} u_x$.
 2. Montrer que f est de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R} .
 3. Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = \frac{x}{4+x^2} - \frac{x}{1+x^2}$.
 4. Montrer l'existence de $K = \int_0^1 \frac{e^{-t} - 1}{t} dt$. En déduire $\lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^{2a} \frac{e^{-t}}{t} dt$.
 5. Calculer $f(x)$.
-

Ex 368 : On définit $f : x \mapsto \int_0^{+\infty} \sqrt{t} e^{-xt} dt$ quand l'intégrale existe. Montrer que f est solution d'une équation différentielle du premier ordre sur un intervalle à préciser. Résoudre celle-ci.

Ex 369 : Soit $f : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{x+t} dt$ si l'intégrale converge.

1. Quel est l'ensemble de définition de f ?
 2. Montrer que f est continue sur \mathbb{R}_+^* .
 3. Montrer que f est de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R}_+^* et exprimer $f'(x)$ sous forme d'intégrale.
 4. Déterminer les limites de f en 0^+ et $+\infty$.
 5. Déterminer un équivalent de f en 0^+ .
-

Ex 370 : Soit $(E) : y'' + 2y' + y = \frac{1}{\sqrt{x}}$. Montrer que les solutions de E ont une limite finie en 0^+ .

Ex 371 :

1. Soit X suivant une loi géométrique. Rappeler de quelle loi il s'agit, donner un exemple concret d'utilisation (justifier).
 2. Rappeler la définition d'une fonction génératrice, puis donner celle de X .
 3. Rappeler comment on obtient l'espérance et la variance à l'aide de la fonction génératrice et faire le calcul pour X .
-

Ex 372 : Soit X une variable aléatoire suivant une loi géométrique de paramètre $p \in]0, 1[$.

1. Que vaut $P(X \geq k)$, pour $k \in \mathbb{N}^*$?
2. Yves et Zak disposent chacun d'une pièce ayant la probabilité p de tomber sur pile. Yves lance la pièce jusqu'à l'obtention de pile, puis Zak fait de même. Quelle est la probabilité qu'il faille deux fois plus de lancers à Zak d'obtenir pile que Yves n'en a eu besoin ?

Ex 373 : On note $S_n(\mathbb{K})$ et $A_n(\mathbb{K})$ les sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ constitués respectivement des matrices symétriques et antisymétriques.

1. Quelle est la dimension de $S_n(\mathbb{K})$?
 2. Montrer que $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = A_n(\mathbb{K}) \oplus S_n(\mathbb{K})$.
 3. On pose $\varphi : M \mapsto M^T$. Déterminer $\det(\varphi)$.
-

Ex 374 : Soit \mathbb{E} un \mathbb{K} -espace vectoriel de dimension $n \geq 2$ et u un endomorphisme n'ayant que \mathbb{E} et $\{0\}$ pour seuls espaces stables.

1. Montrer que u ne possède pas de valeur propre.
 2. En déduire $\mathbb{K} \neq \mathbb{C}$.
 3. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{E} \setminus \{0\}$, la famille $(x, u(x), u^2(x), \dots, u^{n-1}(x))$ est une base de \mathbb{E} .
 4. Comment est la matrice de u dans cette base ?
-

Ex 375 : Trouver l'ensemble des matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonalisables sur \mathbb{R} telles que : $A^3 + A = 2I_n$.

Ex 376 : On pose $E = \mathbb{R}[X]$ et on définit $f \in \mathcal{L}(E)$ par : $\forall P \in E, f(P) = (X - 3)(X + 1)P' - XP$. Donner les valeurs propres et vecteurs propres de f .

Ex 377 : Pour $P \in \mathbb{R}_n[X]$, on pose $f(P) = \sum_{i=0}^n \left(\int_0^1 t^i P(t) dt \right) X^i$.

1. Montrer que $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_n[X])$.
 2. Soit $P \in \text{Ker}(f)$. Montrer que : $\forall Q \in \mathbb{R}_n[X], \int_0^1 P(t)Q(t)dt = 0$. En déduire que $\text{Ker}(f) = \{0\}$.
 3. Quelle est la matrice de f dans la base canonique ? Est-elle inversible ? diagonalisable ?
 4. En fonction de n , déterminer un développement asymptotique à deux termes de $\text{tr}(f)$.
-

Ex 378 : Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note (E_n) l'équation : $(E_n) : \sum_{k=1}^n x^k = 1$

1. Montrer pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ qu'il existe une unique solution x_n de (E_n) sur \mathbb{R}_+ et que $x_n \in [\frac{1}{2}, 1]$.
 2. Montrer la convergence de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.
 3. Déterminer $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
-

Ex 379 : Soit $f : x \mapsto e^{-x^2}$.

1. Montrer que pour tout n de \mathbb{N} , on a : $\forall x \in \mathbb{R}$, $f^{(n)}(x) = P_n(x)e^{-x^2}$, avec P_n un polynôme réel donc on précisera le degré et le coefficient dominant.

2. Pour $m, n \in \mathbb{N}$, on pose $I_{m,n} = \int_{-\infty}^{+\infty} P_m(t)P_n(t)e^{-t^2} dt$. Calculer $I_{m,n}$, sachant que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}.$$

Ex 380 : Soit $h \in \mathcal{C}^0([0, \pi/2], \mathbb{R})$ et $f_n : x \mapsto h(x) \sin^n(x)$, pour $n \in \mathbb{N}$.

1. Étude de la convergence simple de (f_n) .
2. Étude de la convergence uniforme de (f_n) .

Ex 381 : Soit $u_n = \int_0^1 \frac{t^n - t^{2n}}{1 - t} dt$.

1. Montrer l'existence de u_n pour $n \in \mathbb{N}$.
2. Montrer que (u_n) converge et calculer sa limite

Ex 382 : Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \int_0^{1/n} \frac{dt}{(1+t^2)(1+n^2t^2)}$.

1. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} nu_n$.
2. Calculer le rayon de convergence R de $\sum u_n x^n$.
3. Étudier la limite de la somme en R et $-R$.

Ex 383 : Soit F la fonction définie par $F(x) = \int_0^{+\infty} \cos(xt^2)e^{-t} dt$.

1. Montrer que F est définie sur \mathbb{R} .
2. Montrer que $F \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
3. Donner pour tout $k \in \mathbb{N}$, $F^{(k)}(0)$ puis donner, si possible, le développement en série entière de F .